


in Korošciatyn; *Galium cruciata* in Przewłoka; *Hieracium polonicum* mihi in Korošciatyn und Przewłoka; *Helleborus purpurascens* in Czechów und Przewłoka; *Inula Helenium* in Czechów (am Bachufer in Gesellschaft mit *Carduus crispus* und *Senecio fluviatilis*); *Lilium Martagon* in Korošciatyn und Przewłoka; *Marrubium vulgare* in Przewłoka; *Ononis hircina* in Czechów; *Potentilla recta* L. (non. Zimmet.) in Korošciatyn und Przewłoka; *Pot. commutata* mihi in Korošciatyn (ganz identisch mit der Pflanze von Hołosko bei Lemberg); *Phlomis tuberosa* in Przewłoka; *Rumex confertus* Willd. in Monasterzyska, Jezierzany, Czechów, Bertniki und Buczac; *Ranunculus Stevenii* Andr. überall verbreitet; *Stachys germanica* in Czechów; *Salvia glutinosa* in Przewłoka; *Scabiosa ochroleuca* in Korošciatyn und Przewłoka; *Thymus montanus* in Korošciatyn, Czechów, Bertniki und Przewłoka; *Thymus Marschallianus* in Czechów, Jezierzany und Przewłoka; *Teucrium Chamaedrys* in Czechów und Przewłoka; *Viburnum Lantana* in Czechów und Przewłoka; *Xanthium spinosum* in Jezierzany und Przewłoka (fehlt indessen in einigen Ortschaften dieser Gegend, z. B. in Dubienko, gänzlich).

Lemberg, im December 1886.



Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Schluss.)

- Laserpitium latifolium* L. Selten. Woišice bei Kl. Wrška, Kůželau. Machowé Wiesen und Wielický Wald bei Jawornik, Neu Lhota, Miloňow nächst Gr. Karlowitz.
- *pruthenicum* L. Hůrka Wd. bei Ung. Brod, Prakschitz.
- Caucalis daucoides* L. Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Kl. Wrška, Ung. Brod, Bystřitz, Ordiejowhof.
- Scandix pecten Veneris* L. Um Ung. Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk!
- Cerefolium nitidum* Celak. Celak. Prodr. p. 586. Jawořina!
- Chaerophyllum bulbosum* L. Häufig bei Stražnitz (Fasangarten, Žerotín, Štamfaty etc.), Radiejau, Knézub, Welka, Kl. Wrška.
- *temulum* L. Von Rohatetz bis Stražnitz, Hrozná Lhota, Lippau, Welká, Althammer.
- *aromaticum* L. Machowé Wiesen, und gr. Jawořina bei Jawornik (Makowsky), Ung. Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Hradischow, Zdieschow, Hallenkau, Kičera černanská, Jaworníky bis zum Gipfel, häufig bei Gr. Karlowitz, Miloňow, Wysoká, Wiesen bei der Salajka, Althammer, Ostrawitz, Butosonka, Malenowitz, Friedland (Metylowská Hůrka), Pržno, Krasná, Morawka, Lomna;

- bei Teschen (Kolbenheyer)! Zabřeg etc.: Boguschowitz, Końska, Mähr. Ostrau, Jägerndorf, Würbenthal, Ludwigsthal, Sternberg.
- Chaer. hirsutum* L. Rozsoši bei Příkaz, Provaznythal bei Hallenkau, Gr. Karlowitz, Hluboka nächst Ob. Bečwa, Peretoňky, Polana, Smrk, Skalka bei Ostrawitz, Grunik Wd., am Fusse der Lysá hora, Moráwka häufig bei Slawiča, Lomna, Schlossberg bei Würbenthal, Karlsbrunn; im Gesenke sehr häufig und fast in allen Bergschluchten hochgelegener Berge (Oborny)!
- Meum mutellina* Gärtn. Am Fusse des Schlossberges bei Würbenthal! nahe von menschlichen Wohnungen, kl. Heide, Gr. Vater, Knoblochgraben, Bärenkamm.
- Hedera helix* L. Kobela bei Kůželau, Klokočnik und Stružné bei Jawornik, Philippsthal, Hůrka Wd. und Kralow bei Ung. Brod, Vapenky bei Val. Klobouk, Jawornikgebirge über 800 M. Verbreitet im Teschner Gebiete (Kolbenheyer), Zabřeg Wald, Końska.
- Ribes grossularia* L. Jawořina (Holuby); Jawornik, Neu Lhota, na Kotarech.
- *petraeum* Wolf. Knoblochgrund (v. Uechtritz)!, massenhaft auf den Abhängen des Gr. Vaters und Bärenkammes.
- Chrysplenium alternifolium* L. Jawornik, Val. Klobouk, Pultschin, Hallenkau, Gr. Karlowitz; Karlsbrunn (v. Niessl)!
- Sedum maximum* Suter. Ob. Fl. 861. Stražnitz, Jawornik, Val. Klobouk, Gr. Karlowitz, Ostrawitz; Friedland und sonst in jenen Gegenden häufig (Oborny), Jägerndorf, Goldenstein, Sternberg.
- *boloniense* Loisl. Ob. Fl. p. 864. Stražnitz, Welka, Ung. Brod, Příkaz; häufig im Thale der Ostrawitz und in Schlesien (Oborny).
- Sempervivum tectorum* L. Stražnitz, Welká, Jawornik.
- Agrimonia eupatoria* L. Welka, Kl. Wrbka [Bukowina nächst Wrbowetz], Kůželau, Neu Lhota, Philippsthal, Strany, Lysá hora bei Ung. Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Zdiechow, Hallenkau, Gr. Karlowitz, Miloňow, Friedland, Teschen, Mähr. Ostrau, Hruschau, Heřmanitz.
- Sanquisorba officinalis* L. Von Stražnitz bis zum Gipfel der Jawořina, von Strany bis Ung. Brod, Hawřitz, Suchá Loza, Banow, Val. Klobouk, Zdiechow, Mähr. Ostrau, Hruschau, Jägerndorf Weiskirch, Hausdorf.
- Alchemilla vulgaris* L. f. *glabra* DC. Gr. Vater, Knoblochgraben, Thal der rauschenden Tees.
- Geum rivale* L. Maximiliankathal nächst Huti-Hammer, Althammer, Morawka, Slawiča (längs des Slawičbaches), Würbenthal, Karlsbrunn, Demмбаude, Gr. Vater, Knoblochgraben, Schlicksenwald bei Goldenstein.
- Potentilla tormentilla* Schrank. Häufig in der Stražnitzer, Ung. Broder, Val. Klobouker, Teschner und Jägerndorfer Gegend. Uhu-stein, Heidenbrünnel.
- *aurea* L. Zwischen Peterstein und Altvater, am Wege von der

Schäferei zum Wilden Stein, Schweizerei, Gr. Vater, Knoblochgraben, Bärenkamm.

Potentilla canescens Bess. Auf einem Raine nächst des Fleischerwaldes bei Jägerndorf (für die Schellenburg schon Sintenis).

Spiraea salicifolia L. Verwildert bei Morawka.

— *aruncus* L. Gr. Karlowitz (Tišnawa, Wd. u Ondrů etc.), Schlicksenwald bei Goldenstein.

— *ulmaria* L. a) *genuina*. Gemein, Gesenke: Bärenkamm. b) *discolor* Čelak. Val. Klobouk, Zdiechow, Teschen, Knoblochgraben, Schweizerei.

— *filipendula* L. Welká, Wošice bei Kl. Wrbka, Kůželau, Dlouhé und Mabowé Wiesen bei Jawornik, Blumenthal (Jelenowa), Stransko bei Strany, Chrast bei Bojkowitz, Horka Wd. bei Val. Klobouk, Příkaz Pultschin, Zdiechow, Huslenkathal, Hallenkau (Provaznythal etc.) Jaworniky, Gr. Karlowitz.

Cytisus capitatus Jacq. Weinberge bei Stražnitz, Radiejau, Kněždub, Wošice und Podorlí bei Kl. Wrbka, Kobela bei Kůželau, Welká, häufig bei Jawornik (Strmečnik-, Dlouhé- und Machowé-Wiesen, Wielický-Wd.), Philippsthal. Neu Lhota na Kotarech, Chrástka, Lysá hora u. Wd. b. d. reichen Linde bei Ung. Brod, Prakschitz, Weinberge bei Hawřitz, Wolenow, Suchá Loza; Teschen (v. Uechtritz)!, Jägerndorf (Burgberg, Schluchten bei den Ziegelhütten, Fleischerwald und Mösning), Eichberg bei Weiskirch.

— *nigricans* L. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Welká, Kůželau, Jawornik (Strmečnik etc.). Chrástka und Wd. b. d. reichen Linde bei Ung. Brod, Prakschitz, Bojkowitz, Val. Klobouk; Mösning und Burgberg bei Jägerndorf (v. Uechtritz sen.)!, Eichberg bei Weiskirch.

Genista tinctoria L. Gemein im b. G.

— *germanica* L. Stransko Wd. bei Strany, Lysá hora bei Ung. Brod, Prakschitz, Skáli und Horka Wd. bei Val. Klobouk, Hajek bei Příkaz, häufig bei Jägerndorf (Burgberg, Schluchten bei den Ziegelhütten, Mösning etc.), Eichberg bei Weiskirch.

Ononis spinosa L. Rohatetz, Petrow, Stražnitz, Radiejau, Kněždub, Hroznáž, Lhota, Louka, Welká, Wošice bei Kl. Wrbka, Kůželau, Strany, Ob. Niemtschy, Ung. Brod, Bojkowitz.

Melilotus albus Desr. Friedland, Pržno, Teschen, Beguschowitz, Mähr. Ostrau, Hruschau.

Trifolium montanum L. Von Rohatetz bis Stražnitz und von da an bis Welká, Kl. Wrbka, Kůželau, Jawornik, Gipfel der Jawořina, Strany, Ung. Broder Gegend, von Val. Klobouk bis Gr. Karlowitz, Miloňow, Ostrawitz, Friedland, Metylowitz, Krásná, Jägerndorf (Burgberg etc.).

— *fragiferum* L. Stražnitz, Welká, Jawornik, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz.

— *alpestre* L. Rohatetz, Stražnitz, Radiejau, Welká, Philippsthal, Strany, Ung. Brod, Prakschitz, Hawřitz, Suchá Loza.

— *rubens* L. Kněždub, Wošice bei Kl. Wrbka, Kůželau, Dlouhé-

und Machowé Wiesen und Wielický Wd. bei Jaworník, Jamy Wiesen bei Neu Lhota, Horka bei Val. Klobouk.

Trif. medium L. Stražnitz, Kněždub, Hrozná Lhota, Welká, Jaworník, Ung. Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Teschen, Würbenthal.

— *ochroleucum* Huds. Val. Klobouk, Kralowec Wd. bei Potesch, Rozsoši bei Příkaz, Zdiechow, Hallenkau, Jaworníky bis auf die Gipfel, Gr. Karlowitz.

Anthyllis vulneraria L. Žerotín bei Stražnitz, Kněždub, Welká. Wošice bei Kl. Wrbka, Kobela bei Kůželau, Jaworník (Dlouhé- und Machowé Wd. etc.), Philippsthal, Jelenowá bei Strany, Ung. Brod, Hawřitz, Ordiejowhof, häufig bei Val. Klobouk (Wd. nad Poteci, Dubowec, Vapenky etc.), Příkaz, Zdiechow, Hallenkau, Gipfel der Jaworníky bis zum Jaworník nad Minaříkem.

Dorycnium pentaphyllum Scop. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Kněždub, Louka, Welká, Wošice und Podorlí bei Kl. Wrbka, Kobela bei Kůželau, Strmečnik bei Jaworník, Philippsthal, Neu Lhota, Jaworína, Jelenowá und Stransko bei Lysá hora und Wd. b. d. reichen Linde bei Ung. Brod, Prakschitz, Hawřitz, Wolenow, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz, Banow, Chrast und Obora bei Bojkowitz, nicht mehr bei Val. Klobouk.

Tetragonolobus siliquosus Roth. Stražnitz, Dlouhé Wiesen und Bach unterm Stanowisko bei Jaworník.

Astragalus cicer L. Stražnitz, Radiejau, Kněždub, Welká, Wošice bei Kl. Wrbka, Kůželau, Machowé und Doliny Wiesen bei Jaworník, Ung. Brod, Hawřitz.

— *glycyphyllus* L. Von Stražnitz bis Welká, Kůželau, Jaworník, Philippsthal, Ung. Brod, Ordiejowhof, Bojkowitz, häufig bei Val. Klobouk, Příkaz, Zdiechow, Hallenkau, Kičera černánska, Friedland, Metylowitz, Teschen, Końska, Boguschowitz, häufig bei Jägerndorf, Weiskirch, Würbenthal, Goldenstein.

Vicia faba L. Cultivirt bei Stražnitz, Ung. Brod, Jablunkau, Teschen, Boguschowitz.

— *dumetorum* L. Kl. Wrbka, Welká, Kůželau, Jaworník, Ung. Brod, Ordiejowhof, Bystřitz, Teschen, Końska.

— *pisiformis* L. Ung. Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Potesch, Rozsoši bei Příkaz.

— *silvatica* L. Ung. Brod, Bojkowitz, Jelenowská bei Val. Klobouk, Posušiska Wd. bei Zdiechow (Exemplare sehr welk, daher dieser Standort nicht ganz sicher), Pathenwald bei Goldenstein.

— *cracca* L. Gemein in höherer Lage: Wysoká.

— *villosa* Rth. Rohatetz, Petrow, Wolenow, Stražnitz, Radiejau.

— *hirsuta* Koch. Häufig, in höherer Lage auf der Jaworína.

Lathyrus silvestris L. Strany, Bojkowitz, Doubrawa und Vapenky bei Val. Klobouk. Friedland, Metylowská Hůrka.


— *latifolius* L. Weinberge bei Stražnitz, Radiejau, Welká, Wošice bei Kl. Wrbka, Kobela u. a. O. bei Kůželau, Philippsthal, Dlouhé und Machowé Wiesen, Wielický und Wd. na Ma-

chowých nächst Jawornik, Jelenowá bei Blumenthal, Strany, Ung. Brod (Kralow etc.), Suchà Loza.

Lath. tuberosus L. Von Rohatetz bis Stražnitz und von da bis Welká, Ung. Broder Gebiet.

— *vernus* Bernh. Gemein in Stražnitze, Welkaer, Ung. Broder und Teschner Gebiet.

— *niger* Bernh. Stražnitz, Hrozná Lhota, Welká, Jawornik, Lysá hora u. a. O. bei Ung. Brod, Prakschitz, Chrast bei Bojkowitz, Horka bei Val. Klobouk, Zabřeg bei Teschen, Końska, Kopce Wd. bei Boguschowitz, Burgberg bei Jägerndorf.



Spätflora des Jahres 1886.

Von Carl Jetter.

Das prachtvolle heurige Herbstwetter musste naturgemäss auch auf die Vegetation von grossem, belebendem Einflusse sein und wirklich gaben uns zahlreiche Mittheilungen in öffentlichen Blättern Kunde von dem erfolgten zweimaligen Blühen vorherrschend krautartiger Gewächse.

Es sei mir gestattet, in der Kürze eine Zusammenstellung der gesammelten Notizen zu bringen, lediglich zu dem Zwecke, um einen Ueberblick über die Spätherbstflora zu gewinnen. So wurden am 31. October auf dem Hocheck im Triestingthale ein Sträusschen reifer Erdbeeren gepflückt, ja sogar in der sonst so rauhen Gegend des Riesengebirges, aus Neu-Rettendorf bei Königinhof gelangte die gleiche Nachricht in die Oeffentlichkeit. Die Abhänge des Leopoldsberges bei Wien waren am 1. November mit Blüthen von Distel- und Habichtskräutern geschmückt und ein Hartriegelstrauch, an welchem noch die schönen rothen heurigen Früchte hingen, hatte zahlreiche von den nächstjährigen Blütenknospen so weit entwickelt, dass ein Aufbrechen derselben in noch wenigen warmen Tagen zu gewärtigen war. Aus Saalfelden im Pinzgau wurde unterm 9. November geschrieben, dass die Thallehnen, die sonst um diese Jahreszeit oft schon schneebedeckt sind, sich allenthalben mit einem zweiten Blütenflor bekleiden und folgende Auslese blühender Kräuter namhaft gemacht; Schafgarbe, Lattich, Rothklee, Löwenzahn, Campanula, kleine Genziane, weisse Brennessel, Schierling, Stiefmütterchen, Mausehrchen, Storchschnabel und Brombeere. In Hof bei Lassing wurden am selben Tage in einer Höhe von 2000 Fuss überraschend grosse, völlig ausgereifte Erdbeeren gesammelt. Am 12. November wurde von einem Jäger aus dem kaiserlichen Forste in Unter-Weissenbach am Attersee ein Alpenrosenzweig mit Blüthen und Knospen gebracht und in Bad Gastein wurden Erdbeerenblüthen und reife Früchte gefunden. Am 13. November drang dieselbe Kunde aus Leoben zu uns und am 14. November blühten an den südlichen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. 18-22](#)