


Gleichwohl ist letztere auch jetzt nicht schutzlos der Kälte preisgegeben, da sie noch von einer anderen schützenden Hülle umgeben ist. Am 17. November ist diese Magnolienart völlig entblättert.

Am 20. November hängen nur mehr einige wenige, meist schon vertrocknete Blätter an *Paulownia* und *Catalpa*. Auch *Spiraea prunifolia* ist jetzt blattlos. *Ficus Carica* hat das zackige Laub verloren und an den aschgrauen Zweigen sitzt nur mehr die reife Frucht. In den letzten Tagen des Monats entblätterten sich vollständig *Populus pyramidalis*, *Betula*, *Larix*, *Ailanthus*, *Mimosa*, *Gleditschia*, *Robinia*, *Tecoma* etc. etc.

Das Tagesmedium schwankte in diesem Monate zwischen 3° C. und 9° C., das Minimum zwischen +4° C. und -3° C. Die grösste Sonnenwärme betrug noch am 30. Nov. 40° C. Regentage waren nur zu verzeichnen.



Beitrag zur Flora von Bosnien und der Hercegovina.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

Moenchia mantica Bartl. Banjaluka, Maglaj (Hofmann), um Sarajevo hie und da (Beck), Radojčić, Zenica, Kosevo.

Malachium aquaticum Fr. Banjaluka (Hofmann), Visoko.

Cerastium triviale L. Tashić, Zabljak, Dobož.

— *silvaticum* W. Kit. Krupa.

Gypsophila muralis L. Verbreitet im b. G. Bos. u. H.

Tunica Saxifraga Scop. Banjaluka (Hofmann), hie und da bei Sarajevo etc. (Beck), Krupa, Dobož, Maglaj, Stavnjathal bei Sulješćica, Hresa nächst Sarajevo, Konjica.

Kohlruschia prolifera Kunth. Banjaluka (Hofmann), Kozini, Hašani, Star. majdan, Sasina, Bronzeni Majdan, Borkovci, Maslovare, Dobož, Konjica, Jablanica, Mostar, Bilek.

Dianthus monspessulanus L. Revoltela bei Triest.

— *strictus* Smith. Um Konjica und bis auf die Prenj pl. aufsteigend (Beck), Stavnjathal bei Sulješćica, Vareš.

— *integer* Vis., teste Borbás. Vrbač u. a. O. bei Konjica.

— *deltoides* L. Brankovac nächst Banjaluka, Kreša und Vućia luka, Var. *serpyllifolius* Borb. herb. et in litt. ad Haussknecht vere 1886. Österr. botan. Zeitschr. 1888, pag. 51. Castellberg in Jaice (Conrath), Vareš und Glog nächst Sarajevo.

— *armeria* L. Banjaluka (Hofmann), Hašani, Kozini, Modra, W. Strmonoga u. a. O. bei Lipnik, Sasina, Stratinska, Bronzeni majdan, Wald Barakovač bei Vrbanja, Obojdnik, Maslovare, Pribinić, Buletić, Tashić, Matužići, Maglaj, Domanović.

— *papillosus* Vis. et Pančić, teste Borbás. Konjica, Pod Veleš und Hum bei Mostar, Gnoince, Vrëlo Bune.

Dianthus Armeriastrum Wolfn. = *D. corymbosus* Boiss. Fl. or. Podbrdje.

- *barbatus* L. (Virak in Bos.) Banjaluka (Hofmann), Krupa, Pučnik, Zalin, Türk. Dubovik, Hašani, Kozini, Modra, Lipnik (flore albo), Star. Majdan, Sasina, Stratinska, Vrbanja.
- *carthusianorum* L. Um Sarajevo nicht selten (Beck), Taslić.
- *liburnicus* Bartl., teste Borbás. Pod Veleš bei Mostar, Stolac, Ljubinja, Neumakula, Begović kula, Trebinje, Mula bei Cattaro.
- *croaticus* Borb. Um Banjaluka häufig, z. B. Rakovačthal, Vrbanja (Conrath), um Sarajevo häufiger als vorhergehende Art, auf dem Vratlo etc. (Beck), Krupa, Zalin, Türk. Dubovik, Hašani, Modra, Lipnik, W. Barakovač bei Vrbanja, Varoš, Pribinić (f. *asperium squamarum*!), Stenjok, Črni vrh bei Tešanj, Žepče, Visoko, Hreša und Glog nächst Sarajevo.
- *Knapii* Aschers. et Kanitz. Gliva (Vandas) und Nedevice nächst Trebinje (Pantocsek) Mosko teste Borbás, Bilek.
- *viridescens* Viss. Trebović bei Sarajevo.
- *dalmaticus* Čelak. = *D. ciliatus* Guss. b) *cymosus* Viss. Gliva bei Trebinje (Vandas), Hum u. a. O. bei Mostar, Grbeši, Drieno, Carina; Ragusa, Mula nächst Cattaro.
- *racemosus* Viss. Rehb. fl. g. 5047. Cattaro, Dobrota.
- *ciliatus* Guss. c) *Brocchianus* Viss. Ragusa.

Saponaria officinalis L. Banjaluka (Hofmann). Im Sarajevsko polje, im Zujevina- und Narenthathale etc. (Beck), Novi, Türk. Dubovik, Sanski most, Sasina, Magier, Vrbanja, Čelinač, Stenjok, Matužići, Dobož, Zenica, Stavnjathal bei Sulješćica, Vareš, Tarčin, Ljubinja.

— *vaccaria* L. Banjaluka, Maglaj (Hofmann), Visoko, Zbilje.

Cucubalus baccifer L. Banjaluka (Hofmann), Sissek, Modra, Lipnik, Dobož, Visoko, Sarajevo.

Silene armeria L. Vrbanja (Conrath). In der Tešanicaschlucht (Blau, Beck), B. Orlovik u. a. O. bei Žepče.

— *Sendtneri* Boiss. Auf dem Trebović bei Sarajevo.

— *gallica* L. Banjaluka (Hofmann), Zalin, Zaspä, Türk. Dubovik.

— *Gallinyi* Heuff. Bilek i. d. H.

— *inflata* Sm. Banjaluka, Sarajevo (Hofmann), Mostar, häufig (Struschka)¹⁾, Krupa, Dobož, Maglaj, Zenica, Visoko, Igman, Ostrožac, Jablanica, Sjenice, Blagaj, Ljubinja, Ragusa, Cattaro, Mula.

Melandryum silvestre Röhl. a) *villosum* Čelak. Banjaluka, Zenica, Žepče (Hofmann), Krupa, Vareš, Glog nächst Sarajevo, Vučiča luka.

¹⁾ „Die Umgebung Mostars.“ Von Her. Struschka. Programm des k. k. Staatsgymnasiums in Kremsier. Diese Abhandlung konnte ich mir erst später verschaffen; sollten einige der von mir angeführten Standorte schon in der citirten Abhandlung vorkommen, so gebührt Herrn Prof. Struschka das Prioritätsrecht.

- Lychnis coronaria* Desrouss. Häufig um Sarajevo etc. (Blau). Im Zujevinathale, auf dem Ivansattel, bei Tarčin etc. (Beck), bei Obalj, Ulok (Vandas), häufig bei Konjica, Ostrožac, Jablanica, Mostar, Domanović, Stolac, Ljubinje, Bilek.
- Kitabelia vitifolia* W. Brankovac nächst Banjaluka, Taslić, Doboj.
- Malva rotundifolia* Huds. Banjaluka (Hofmann), Maglaj, Sarajevo.
- *silvestris* L. Banjaluka (Hofmann), Krupa, Lipnik, Brdari, Vrbanja, Pribinić, Visoko.
- *moschata* L. Banjaluka (Hofmann). Krupa, Zalin, Zaspá, Türk. Dubovik, Modra, Lipnik, Brdari, Sasina, Stratinska, Bistrica, Borja pl., Pribinić, Visoko, Trebović, Hreša, Glog u. a. O. bei Sarajevo, Arnautova šuma bei Vučia luka.
- Lavatera thuringiaca* L. Banjaluka (Hofmann). Im Zujevinathale (Blau), in der Sutjeskaschlucht bei Suha häufig (Beck), bei Obalj, Ulok etc. (Vandas), Podbrdje, Tešanj, Žabljak, Makljenovac, Sarajevo, Vrbač bei Konjica, Pod Veleš u. a. O. bei Mostar.
- Athaea officinalis* L. Banjaluka (Hofmann), Zalin, Brankovac, Plitska, Matužići, Doboj, Domanović.
- *hirsuta* L. Banjaluka (Hofmann), Trebinje etc. (Pantocsek), Ragusa (Fl. croat.), Zalin, Zaspá, Modra, Stratinska, Čelinač, Podbrdje, Plitska, Obodnjik, Maslovare, Pribinić, Buletić, Taslić, Žabljak, Kraševo, Makljenovac, Doboj, Mostar, Bilek.
- Androsaemum officinale* All. Am Ponir bei Banjaluka (Conrath), Borja pl. und im W. Bržljak bei Liplje.
- Hypericum perforatum* L. Häufig im g. b. G.
- *quadrangulum* L. Krupa, Türk. Dubovik, Maslovare, Rujevica, Sarajevo, Glog, Vučia luka.
- *tetrapterum* Fries. Banjaluka (Hofmann), zwischen Krbljina und Kalinovik (Vandas), Krupa, Hašani, Kozini, Star. majdan, Jurići, Maglaj, Ilidže, Vrbač bei Konjica.
- *hirsutum* L. Banjaluka (Hofmann), Otoka, häufig bei Krupa, Pučenik, Kozini, häufig bei Lipnik, Star. majdan, W. Šikara bei Bistrica, Brankovac, Vrbanja, Borja pl., Kraše vo. Doboj, Visoko, W. Krstac bei Zbilje, Trebović, Dovlići und Miljačkathal bei Sarajevo, Igman, Ivan pl., Vrbač bei Konjica.
- *montanum* L. Banjaluka (Hofmann). Um Konjica (Beck), so am Vrbač etc., Beheremaginica pl., Stratinska, W. Barakovač bei Vrbanja, Borja pl., Miljačkathal bei Sarajevo.
- Oxalis acetosella* L. Allenthalben im b. G.
- Erodium cicutarium* L'Herit. Häufig im b. G.
- Geranium Robertianum* L. Gemein im b. G.
- *dissectum* L. Banjaluka (Hofmann), um Sarajevo hie und da (Beck), Otoka, häufig um Krupa, Zalin, Türk. Dubovik, Sasina, W. Šikola bei Maglaj, Visoko, Vareš, Kovačić.
- *sanguineum* L. Maglaj (Hofmann), Türk. Dubovik, W. Klačnica bei Sasina, W. Bročnik bei Ljubinje, Neumakula, Begović kula, Grbeši, Panik.


- Geranium palustre* L. Banjaluka (Hofmann), bei Kupina nächst Sarajevo, bei Pale (Beck), Gaj bei Visoko, Sarajevo, Kovačić, Ilidže, Vrëlo Bosne.
- *phaeum* L. Verbreitet im b. G. selbst noch in höheren Lagen, so am Trebović etc., andere Standorte vide B. Fl. pag. 84.
 - *pusillum* L. Visoko, Zbilje, Trebović u. a. O. bei Sarajevo.
- Linum catharticum* A. Banjaluka (Hofmann), Krupa, Doboј, Vareš, Sarajevo, Hreša, Vracač bei Konjica.
- *usitatissimum* L. Nicht selten gebaut. Verwildert bei Türk. Dubovik, Sasina, Pribinić, Zbilje und Sarajevo.
 - *tenuifolium* L. Hie und da um Sarajevo, Grabovica etc. (Blau), Zalin, Türk. Dubovik, Hašani, Modra, Lipnik, Zbilje.
 - *flavum* L. Maglaj (Hofmann), bei Mrkovic etc. (Beck), Zalin, Visoko, Abhänge des Trebović bei Sarajevo.
- Polygala vulgaris* L. Verbreitet im b. G.
- *oxyptera* Reichb. Trebović etc. (Beck), Vučia luka.
- Rhus cotinus* L. Banjaluka (Hofmann), überall um Konjica etc. (Beck), häufig bei Mostar (Struschka), Gliva bei Trebinje (Pantocsek), wird fleissig eingesammelt und als Färbemittel benützt. Zenica, Čelin bei Visoko, Miljačkathal, Trebović u. a. O. bei Sarajevo, Jablanica, Sjenice, Poželje, Stolac, Ljubinja, Panik, Bilek.
- Ruta divaricata* Ten. Trebinje etc. (Pantocsek), häufig bei Mostar (Struschka), so am Hum, Pod Veleš etc., Ljubinja, W. Plana dola bei Neumakula, Grbeši, Panik, Bilek.
- Dictamnus albus* L. Maglaj (Hofmann), bei Ilidže im Sarajevsko polje (Blau), Stjena Usonoviča bei Zenica, B. Čelin bei Visoko, Zbilje
- Opuntia amyclaea* Ten. Zwischen Ragusa und Gravosa (Fl. croat.). Insel Lakroma.
- Acer campestre* L. Verbreitet in tieferen Lagen des b. G.
- *monsessulanum* L. Hie und da um Sarajevo, im Sarajevsko polje (Beck), Rudjin do bei Arslan-Agić (Vandas), Visoko, Jablanica, Mostar, Ljubinja, Neumakula.
 - *tataricum* L. Banjaluka, Maglaj (Hofmann), Krupa, Vrbanja, Pribinić, Doboј, Žepče, Zenica, Visoko, Zbilje.
- Staphylea pinnata* L. Banjaluka (Hofmann), bei Starigrad an der Miljačka, in der Sutjeskasklucht (Beck), Gaj bei Visoko.
- Evonymus europaeus* L. Häufig im b. G.
- Vitis vinifera* L. Häufig verwildert. Gebant bei Doboј, Mostar, Stolac, Bilek u. a. O.
- Paliurus australis* Gärtn. (Drača in H.) Zwischen Jablanica und Grabovica, Vrëlo Bune (Blau), Trebinje (Pantocsek, Vandas), häufig bei Mostar (Struschka), so am Hum, Pod Velež u. a. O., Poželje, Gnoince, Blagaj, Buna, Žitomyšlič, Opličić, Aladinić, Stolac, Ljubinja, Grbeši, Gorica, Mosko, Panik, Bilek, Drieno.
- Rhamnus cathartica* L. und *Frangula alnus* Mill. Verbreitet im b. G. Bos. u. H.

- Rhamnus fallax* Boiss. = *R. carniolica* A. Kern. Krupa, Visoko, Vareš.
 — *alpinus* L. Nach Fiala bei Vučja luka.
 — *alaternus* L. Insel Lakroma.
- Pistacia Lentiscus* L. Carina (Pantocsek), Blagaj, Drieno in H.
 — *Terebinthus* L. B. Gliva und Drača bei Trebinje (Pantocsek), Mosko in H., Sebenico.
- Peplis portula* L. Maglaj.
- Lythrum salicaria* L. Banjaluka (Hofmann), im Sarajevsko polje, im Zujevinathale (Beck), zwischen Kalinovik und Krbljina (Vandas), Krupa, Zalin, Sasina, Magjer, Vrbanja, Čelinač, Ružić, Pribinić, Taslić, Matužići, Doboj, Žepče, Celebie, Dretlej, Domanović.
 — *virgatum* L. Wald bei Odra nächst Sissek.
- Epilobium angustifolium* L. Banjaluka etc. (Hofmann), häufig bei Sarajevo, Vučja luka, Ostrožac, Jablanica.
 — *hirsutum* L. Banjaluka (Hofmann), Lipnik, Bronzeni majdan, Jurići, Plitska, Kosevo.
 — *parviflorum* Schreb. Banjaluka (Hofmann). Um Konjica, im Sande der Tešanica (Beck), Krupa, Zalin, Star. majdan, Zenica, Visoko, Ilidže.
 — *montanum* L. Verbreitet bis in die höheren Voralpen, in den Schluchten der Suha gora gegen den Sutjeska (Beck), Stratinska. Borja pl., W. Bržljak bei Liplje, Glog nächst Sarajevo, Vučja luka, Vrbač bei Konjica.
 — *collinum* Gmel. W. Barakovač bei Vrbanja, Borja pl., Pribinić.
 — *adnatum* Grsb. W. Odra bei Odra, Sissek in Slav.
 — *Lamyi* Schulz., Barakovač bei Vrbanja teste Borbás.
 — *trigonum* Schrank. Vučja luka.
- Circaea lutetiana* L. Banjaluka (Hofmann). Auf dem Ivansattel bei Tarčin etc. (Beck), auf dem Rogojsattel bei Trnovo (Vandas), Krupa, Türk. Dubovik, Kozini, Stratinska, W. Šikara bei Bistrica. Brankovac, W. Barakovac bei Vrbanja, Ovšecko, Varoš, Borja pl., W. Bržljak bei Liplje, Pribinić, Doboj, Vrbač bei Konjica.
- Myriophyllum spicatum* L. Banjaluka (Hofmann), Vrbanja.
- Trapa nutans* L. Sela bei Sissek in Slav.
- Sanicula europaea* L. Banjaluka, Maglaj, Žepče (Hofmann), Otoka, Krupa, Kozini, Lipnik, Podvidača, W. Šikara bei Bistrica, Borja pl., Visoko, Veleš W. bei Vareš, Trebović bei Sarajevo, Ivan pl., Vrbač bei Konjica.
- Eryngium campestre* L. Banjaluka (Hofmann), um Sarajevo (Hofmann, Beck), Krupa, Zalin, Žabljak, Makljenovac, Kosevo, Hreša, Konjica, Domanović, Aladinić, Stolac, Ljubinja, Grbeši, Trebinje.
 — *amethystinum* L. Banjaluka (Hofmann), um Sarajevo (Hofmann, Beck), im Sarajevsko polje etc. (Beck), Mostar (Struschka), bei Obalj, Ulok (Vandas), Krupa, Pučenik, Zalin, Türk. Dubovik, Hašani, Kozini, Lipnik, Maglaj, Radojčić, B. Orlovik bei

- Žepče, Zenica, Visoko, Lješević, Vrbovik, Sulješćica, häufig bei Konjica, Celebje, Ostrožac Sjenice, Gnojnice, Buna, Žitomyslić, Čaplina, Aladinić, Stolac, Zegulj karaula, Ljubinja, B. Javorak, Neumakula, Begović kula, Grbeši, Mosko, Bilek, Drieno.
- Astrantia major* L. Auf den Abhängen des Trebović gegen Sarajevo etc. (Beck), Glog nächst Sarajevo, Vučja luka.
- Sium latifolium* L. Sela bei Sissek, Krupa.
- Aegopodium podagraria* L. Um Sarajevo nicht selten etc. (Beck). Krupa.
- Bupleurum aristatum* Bartl. Stjena, Usunovića bei Zenica, Visoko, Zbilje, auf steinigem Abhängen um Sarajevo, Falatiši, Glog, Pod Veleš bei Mostar, Stolac, Zegulj karaula, Ljubinja.
- *exaltatum* M. Bieb. Trebović bei Sarajevo etc. (Beck), Pod Veleš bei Mostar.
- *affine* Sadl. Konjica, Neumakula.
- Oenanthe media* Grieseb. Banjaluka (Hofmann), Sarajevo, im Sarajevsko polje (Beck), Zalin, Brdari, Čelinać, Buletić, Doboj, Žepče, Kovačić.
- *fistulosa* L. Krupa.
- Aethusa cynapium* L. Banjaluka (Hofmann), Žepče.
- Anethum graveolens* L. Verwildert am Pod Veleš bei Mostar.
- Pustynaca sativa* L. Banjaluka (Hofmann), Bronzeni majdan, Vrbanja, Dabovci, Kukavica, Tešanj, Kraševo, Matužici, Maglaj, Žepče, Visoko, Kovačić, Domanović.
- Heraclium sphondylium* L. Banjaluka (Hofmann), auf dem Igman, der Hranicava (Beck), Krupa, Zalin, Lipnik, Dobovci, Žabljak, Doboj, Maglaj, Zenica, Kovačić, Vučja luka, Vrbač bei Konjica.
- Peucedanum cervaria* Lapeyr. Banjaluka (Hofmann), am Hange der Bjelašnica gegen die Krupa (Beck), Trebinje in einer f. *simplificata* (Vandas). Krupa, Zalin, Zaspas, Sasina, Stratinska, Tešanj, Žabljak, Zenica, Visoko, Zbilje, Sarajevo.
- *oreoselinum* Mönch. Banjaluka (Hofmann), Črni vrh bei Tešanj, Žabljak, Maglaj, Konjica (in einer abweichenden schmalblättrigen Form).
- *austriacum* Koch. An buschigen Stellen auf dem Trebović, in der Sutjeskaschlucht (Beck), Kosevo.
- Crithmum maritimum* L. Häufig in g. D. und auch noch bei Triest.
- Selinum carvifolia* L. Vrbanja, Plitska, Borja pl., Pribinić, Buletić, Doboj.
- Orlaya grandiflora* Hoffm. Banjaluka (Hofmann), überall um Sarajevo, um Konjica etc. (Beck), am rechten Narenta-Ufer bei Mostar (Struschka), häufig bei Krupa, Pučenik, Türk. Dubovik, Sasina, Maglaj, Zenica, Pod Veleš, Hum u. a. O. bei Mostar, Ljubinja (für Trebinje!) und Bilek! schon Pantocsek), Begović kula, Grbeši, Gorica bei Trebinje, Mosko, Panik.
- Daucus carota* L. Banjaluka, Sarajevo (Hofmann), häufig um Mostar (Struschka), Lipnik, Sanski most, Vrbanja, Plitska, Konjica.

- Torilis anthriscus* Gmel. Banjaluka (Hofmann); Krupa, Türk. Dubovic, Domanović.
- Anthriscus silvestris* Hoffm. Häufig im b. G. Bos. u. H.
- Chaerophyllum aromaticum* L. Hie und da um Sarajevo, um Konjica etc. Beck), Zenica, Visoko, Zbilje, Trebovic und Miljačkathal bei Sarajevo, Kovačić, Ilidže, Ivan pl.
- *bulbosum* L. Banjaluka (Hofmann), um Sarajevo.
- *coloratum* L. Grabovica (Blau), B. Gliva nächst Trebinje (Pantocsek), Sjenice, Mostar, Trebinje, Bilek.
- *hirsutum* L. Vranjska šuma bei Krupa, Vučia luka.
- Smyrniium perfoliatum* Mill. Um Sarajevo (Hofmann, Beck), in der Nähe des ehemaligen Nordlagers bei Mostar (Struschka), Trebinje und Bilek (Pantocsek), Pod Veleš, Hum u. a. O. bei Mostar, Stolac, Ljubinja, Panik, Drieno in H. Ragusa.
- Hedera helix* L. Gemein im g. b. G., blühend bei Sarajevo und bei Miramare bei Triest.
- Cornus mas* L. Banjaluka (Hofmann), um Sarajevo nicht häufig (Hofmann, Beck), auf dem Igman, bei Udbar und Konjica verbreitet (Beck), Mostar, in der Nähe des ehemaligen Nordlagers (Struschka), Krupa, Vrbanja, Visoko, Jablanica.
- *sanguinea* L. Verbreitet im g. b. G.
- Saxifraga rotundifolia* L. Sehr verbreitet, namentlich an den Gehängen der Gebirge häufig, zumeist in der var. *glandulosa* Griseb. (Beck), Banjaluka, Sarajevo (Hofmann), Visoko, Stavnjathal bei Sulješćica, Vareš, Dubošćica, Igman.
- *tridactylides* L. Vareš, Stavnjathal bei Sulješćica.
- Sedum maximum* Hoffm. — *S. latifolium* Bertol. Grad in Doboj, W. Stogić bei Vareš, Ivan pl., Mosko.
- *album* L. Auf felsigen Stellen des Trebović bei Sarajevo (Beck), Paschin B. und Glog nächst Sarajevo, Vučia luka, Faletiši, Stupi u. a. O. bei Kosevo, Stolac.
- *boloniense* Ehr. Abhänge des Trebović und bei Kovačić.

(Fortsetzung folgt.)



Alte Parallelen zu neuen Angaben.¹⁾

Von Dr. A. Kornhuber.

Dr. M. Kronfeld's „neu festgestellte Thatsachen“ in seinem „offenen Brief“ an mich S. 5 und 6.

1. Die Mistel wird nicht nur | Zu 1. Nobbe (Ueber die Mistel
durch Vögel, sondern auch auto- | etc. Tharander Jb. 34. Bd. S. 17)

¹⁾ Mit Diesem betrachten wir den Gegenstand als abgeschlossen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [039](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von Bosnien und der Hercegovina. 22-28](#)