

- Rubus lamprophyllus* Gremli. Bergwälder in Güns.
- *chamaeceltis* A. Kern. Bergwälder in Güns.
 - *polyacanthus* Gremli. Bergwälder in Güns.
 - *erythrostachys* Sabr. Bergwälder in Güns.
 - Bayeri* Focke var. *gracilescens* Progel. Bergwälder in Güns.
 - *Kufalvianus* Borb. Waldränder in Güns.
 - *trichomorus* Borb. et Waibl. n. spec. *Corylifrondiu*m. Schößling liegend rund, kahl, stark bereift, mit zerstreuten schwachen Stacheln, Stachelchen und wenig Stieldrüsen besetzt. Blätter 3 zählig, die Blättchen beiderseits grün, oben zerstreut, unten mehr behaart; das Endblättchen herzeförmig, kurz, bespitzt, die seitlichen kurz gestielt. Rispe kurz, ihre Axen angedrückt, behaart, mit spärlichen Stacheln und zahlreichen, theilweise langen Stieldrüsen versehen. Blüthen mittelgross; die graugrünen, Stachelchen und Stieldrüsen führenden, zugespitzten Kelchzipfel nach dem Verblühen aufgerichtet; die Petalen länglich, vorn tief ausgerandet, 10 Mm. lang, gelblichweiss; Staubgefässe die Griffel überragend; der Fruchtknoten dicht behaart.
 - Hecke in Lebenbrunn bei Bernstein.
 - *caesius* L. var. *sciaphilus* Borb. Wegränder in Güns.
 - — var. *Vrabelyanus* A. Kern. Buschige Orte in Güns.

Potentilla pseudo-serpentina m. (*P. serpentina* Borb. \times *glandulifera* Kraš.). Dem Habitus nach der *P. glandulifera* Kraš. näher stehend, wird sie von dieser geschieden durch tiefer geschnittene und zahlreichere Zähne an den Blättchen (3—6 an jeder Seite), ferner durch starke, sessile, den Drüsenkopfchen der Rosen analoge Drüsen an Blättern und Stengeltheilen, wie sie besonders der *P. serpentina* Borb. zukommen. Von allen Formen der *P. serpentina* Borb. wird sie durch die, an den oberen Stengeltheilen vorhandenen, Drüsenhaare leicht unterschieden. — Wächst in Rödlschlag bei Bernstein 700 M. s. m. auf Serpentin.

Litteratur-Uebersicht.¹⁾

August 1893.

Buchwald S. von. Der Karst und die Karstaufforstung. Eine Studie
Triest (Dase). 8°. 15 S. — Mk. 0'60

¹⁾ Die „Litteratur-Uebersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirekt beziehen, ferner auf selbstständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höchst ersucht.

Die Red.

- Hansgirg A. Physiologische und phycophytologische Untersuchungen. Prag (Taussig). 4°. 286 S. 3 Taf. — Mk. 16·80.
- Palla E. Beitrag zur Kenntniss des Baues des Cyanophyceen-Protoplasts. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. XI. S. 394—395.) 8°.
- Wiesbaur L. Wo wächst echter Ackerehrenpreis? (*Veronica agrestis* L.). (Mitth. d. Section f. Naturk. d. Oe. Tour.-Club. 1893, Nr. 6.) 16°. 8 S.
- Wypiel M. Ueber den Einfluss einiger Chloride, Fluoride und Bromide auf Algen. (XXIV. Jahresbericht d. Realgymnas. in Waidhofen a. Th.) 8°. 34 S. —
- Buchenau F. Ueber den Aufbau des Palmjetschilfes (*Prionium serratum* Drège) aus dem Caplande. Eine morphologisch-anatomische Studie. (Bibliotheca botanica XXVII.) 4°. 26 S. 3 Taf. Stuttgart (Naegele). — Mk. 24.
- Klebahn Dr. H. Zur Kritik einiger Algengattungen. (Jahrb. für wissenschaftl. Botan. XXV. Heft 2. S. 278—321.) 1 Taf.
- Köhne E. Just's botanischer Jahresbericht. Jahrg. XIX. 1891. Abth. I. Heft 1. Berlin (Borntraeger). 8°. 240 S. — Mk. 8.
- Kuntze O. Revisio generum plantarum secundum leges nomenclaturae internationales cum enumeratione plantarum exoticarum. Pars III. Leipzig (Felix in Comm.). 8°. p. 157—322.
- Magnus P. Ueber die auf Compositen auftretenden Puccinien mit Teleutosporen vom Typus der *P. Hieracii* nebst einigen An- deutungen über den Zusammenhang ihrer specifischen Entwicklung mit ihrer verticalen Verbreitung. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. XI. S. 453—464.) 1 Taf.
- Moll I. W. Observations on karyokinesis in Spirogyra. Amsterdam (I. Müller). Gr. 8°. 36 p. 2 Taf.
- Oudemans C. A. I. A. Revision des champignons tant supérieur qu'inférieur trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-bas. I. Amsterdam (I. Müller). Gr. 8°. 638 p.
- Prantl K. Ueber das System der Monocotyledonen, insbesondere die Gruppe der Farinosae. (Sitzungsber. der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur. Botan. Sect. 1892. S. 38.)
- Sachs I. Physiologische Notizen VII. Ueber Wachstumsperioden und Bildungsreize. (Flora 1893. IV. Heft.) 8°. 36 S.
- Schenck H. Ueber den Einfluss von Torsionen und Biegungen auf das Dickenwachsthum einiger Lianenstämmen. (Flora 1893.) 8°. 14 S. 2 Taf.
- — Ueber Jugendformen von Gymnospermen, speciell von *Larix*

Europaea. (Sitzungsber. d. niederrh. Gesellsch. d. Natur- und Heilkunde in Bonn 1893, S. 27—38.) 4. Abb.

Underwood L. M. Index Hepaticarum. I. Bibliography. (Mem. of the Torrey botanical Club, Vol. IV. Nr. 1.) 8°. 91 p.

Wisselingh C. van. Over de Kurkklamet en het Suberine. Amsterdam (I. Müller). Gr. 8°. 51 p. 2 Tab.

Flora von Oesterreich-Ungarn.

West-, Nord- und Mittel-Ungarn.¹⁾

Referent: Dr. Vincenz v. Borbás (Budapest).

**Sympyrum Ullepicii* Wetst., Rothkloster (11).

Smilacina soboliferum Sims, bei Zaskov (10).

Bupleurum coloratum Schur, Drechselhäuschen, Rother Lehm, Blattnitza (Borb. 1890, 1892). — *B. tenuissimum* L. und *B. affine* Sadl., Neusiedler See (2). — **Chaerophyllum aromaticum* L. var. *cinerascens* Borb. foliolis subtus conspicue cano-pubescentibus, Petrozsény (Borb. 1872). — *Cerefolium nitidum* (Wahlenb.), Uj-Tátrafüred (Borb. 1890). — *Foeniculum capillaceum* Gilib., verwildert bei Kis-Maros (6). — *Eryngium campestre* L., Ober-Podgoria, 500 M. s. m. (21). — *Oenanthe aquatica* L. und *Sium latifolium* L. var. *heterophyllea* Borb., Rákos bei Budapest (6). — *Peucedanum officinale* L., Podersdorf am Neusiedler See (2). — *Turgenia latifolia* (L.), Parndorf (2).

Thalictrum simplex L., Poprád-Felka (19).

Th. aquilegifolium L., Rendek (21). — *Ranunculus sceleratus* L., Vörösvágás, 700 M. s. m. (21). — *Aquilegia nigricans* Baumg., an mehreren Orten bei den Herkulesbädern (15). — **Aconitum Schurii* Beck (*A. paniculatum* et *A. toxicum* Schur), Öcsém teteje, Frumoasze, Bucsecs, Stefilestyé (1). — *Aconitum Cammarum* Jacq. et *A. Hosteanum* Schur, Liptó-Ujvár (Borb. 1890). — *Delphinium orientale* Gay, Szeged, Pilis, Monor, Farkas-völgy und Szépárok bei Ofen, Fegyvernek (Ref.). — *D. Consolida* L. var. *adenopodium* Borb., Békás-Megyer (Borb. 1890).

Helianthemum rupifragum Kern, Sivibrada (19).

Reseda Phyteuma L. Alsó-Pahok (14); Keszhely (Borb.). — *R. luteola* L., bei Arács (Ref.).

Corydalis pumila Rehb., Wolfsthal (2). — *C. capnoides* L., Rothkloster (Ullep. in 11).

¹⁾ Vergl. Oesterr. botan. Zeitschr. 1893, S. 66.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift](#) = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 043

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Litteratur-Uebersicht. 357-359