©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at

1prozentige Chlorkalklösung tödlich. Man nimmt an, daß der Befallsgipfel in den Sommermonaten liegt, da der Parasit wärmeliebend ist. Es wurde allerdings beobachtet, daß einzelne erwachsene Würmer auch im Wirtsfisch überwintern können.

Prof. Dr. H. Mann

Peter Schickl, Mondsee

Englische Knotenkunde

Fliege oder Haken an Vorfach

DER DOMHOF-KNOTEN



Knotenstärke 75 %

DER TWO-CIRCLE TURLE



Knotenstärke 86 %

DER TWO-TURN TURLE



Knotenstärke 83 %

Vorfach an Schnur

DER TWO-LOOPS



Knotensrärke 85 %

Springer an Schnur

DER BLOOD-LOOP-DROPPER



Knotenstärke 80%

Wirbel an Schnur

DER FOUR-TURN-HALF-BLOOD



Knotenstärke 85%

Verbindung zweier Schnüre

DER DOUBLE-THREE-FOLD BLOOD



Knotenstärke 80 %

Schlaufe in Schnur

DER BLOOD-BIGHT



Knotenstärke 85 %

Schlaufe in Schnur

DER DOUBLE-OVERHAND-LOOP



Knotenstärke 74 %

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichs Fischerei

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Schickl Peter

Artikel/Article: Englische Knotenkunde 137