

Versuch einer Avifauna von Helmstedt und Umgebung.

Von F. Menzel, stud. forest.

Das Beobachtungsgebiet umfasst Helmstedt (111 m. hoch) im Umkreise von 2—3 Stunden. Die Beobachtungen wurden theils auf den Feldfluren von Helmstedt und der umliegenden Dörfer, theils in den Forstrevieren „Helmstedt“ und „Marienthal“ gesammelt. Grössere Excursionen erstreckten sich bis in den „Elm“, ein 291 m. hohes Waldgebirge. Die bedeutendsten Erhebungen sind ausser dem „Elm“ der 191 m. hohe „Donn“ bei Süpplingenburg, der „Elz“ mit dem 194 m. hohen „Schieren“ bei Frellstedt im Westen und der „Lappwald“ (205 m. hoch) im Osten des Beobachtungsgebietes. Die Waldungen bestehen zumeist aus herrlichen Buchenwäldern, (der Donn, Elz, Schieren fast ausschliesslich aus diesen); nur im „Lappwalde“ finden sich auch ausgedehnte Nadelholzbestände. Im „Elz“, „Schieren“ und „Donn“ stehen noch viele hohle Bäume, weshalb die Dohle und die Hohltaube zu den häufigen Brutvögeln zählen. Grössere Gewässer fehlen im Beobachtungsgebiete; ausser 4 kleinen Teichen bei Helmstedt, liegen an der Grenze einige grössere bei Süpplingenburg und Marienthal. Eine kleine Bruchniederung befindet sich bei Emmerstedt.

HELMSTEDT, im Februar 1890.

1. *Falco peregrinus*, *Tunst.* Durchzugsvogel. Den 9. Februar 1888 wurde ein Wanderfalke bei Süpplingenburg in einem Teller-eisen gefangen.

2. *Falco subbuteo*, *L.* Sommervogel.

3. *Falco tinnunculus*, *L.* Häufiger Brutvogel; horstet in allen umliegenden Feldhölzern; einzelne Exemplare auch im Winter angetroffen.

4. *Falco aesalon*, *Tunst.* Durchzugsvogel.

5. *Astur palumbarius*, *L.* Standvogel im ganzen Gebiete.

6. *Accipiter nisus*, *L.* Häufiger Standvogel. Horst fast immer auf Nadelholzbäumen; ich fand jedoch am 15. Juni 1887 ein Gelege von 4 Eiern mitten im Buchenwalde auf einer hohen Buche in einem alten *C. corone*-Horste.

7. *Aquila fulva*, *M. und W.* Sehr seltene Erscheinung; wurde vom Förster Hieronymi in Querenhorst vor einigen Jahren erlegt.

8. *Aquila nœvia*, Wolf. Früher Brutvogel; ein Gelege, welches im „Elz“ ausgenommen worden war, befand sich in der Sammlung des verstorbenen Bergmeisters Ribbentrop hier.

9. *Haliaëtus albicilla*, L. Sehr seltener Gast; wurde im Winter 1886 öfter bei der Abdeckerhütte am Kuhteiche beobachtet.

10. *Pandion haliaëtos*, L. In den Jahren 1884, 1885 und 1886 im ganzen Sommer beobachtet; als aber im Herbste des letzteren ein ♀ bei dem nahen Dorfe Weferlingen geschossen wurde, verschwand der Adler aus der hiesigen Gegend. Höchst wahrscheinlich hat er im Gebiete auch gebrütet.

11. *Pernis apivorus*, L. Ziemlich häufiger Brutvogel. Horstend wurde er beobachtet im Lappwalde (I. Forstort: „gr. Wald“, II. „kl. Wald“, III. „Gehren“, IV. „Betschenberg“, V. „Marienbornerholz“, VI. „Magdeburger Berg“), im Elz, Donn und Elm.

12. *Buteo vulgaris*, Leach. Häufiger Sommervogel, vereinzelt auch im Winter.

13. *Archibuteo lagopus*, Brünn. Regelmässiger Wintervogel. Den 11. Jänner 1888 wurde ein Exemplar erlegt, welches eine *Alcedo ispida* in den Fängen hatte.

14. *Milvus regalis*, auct. Immer seltener werdender Sommervogel.

15. *Circus æruginosus*, L. Sommervogel; brütet auf den Süpplingenburger und Marienthaler Teichen.

16. *Circus cyaneus*, L. Sehr seltener Brutvogel; horstete vor einigen Jahren in hiesiger Feldmark und beim Dorfe Esbeck. Im April 1887 wurde ein prächtiges ♂ bei Helmstedt geschossen.

17. *Nyctea nivea*, Thunb. Sehr seltene Erscheinung; wurde den 28. März 1886 von meinem Freunde C. Willecke kurz nach Eintritt von Thauwetter im Felde beobachtet.

18. *Athene noctua*, Retz. Häufiger Standvogel. Innerhalb 8 Tagen fand ich in einer Baumhöhlung, aus welcher ich bei jeder Besichtigung einen Steinkauz herausjagte, 1 *Motacilla alba*, 1 *Alauda arvensis*, 1 *A. cristata*, 1 *Passer montanus* und 2 gewöhnliche Feldmäuse.

19. *Syrnium aluco*, L. Häufiger Standvogel.

20. *Strix flammea*, L. Häufiger Standvogel.

21. *Otus vulgaris*, Flemm. Häufiger Brutvogel; 1885 fand ich schon am 16. März einen Horst mit 4 kleinen Jungen.

22. *Otus brachyotus*, Bechst. Regelmässiger Durchzugsvogel.

23. *Caprimulgus europæus*, L. Sommervogel.

24. *Cypselus apus*, Ill. Häufiger Sommervogel.

25. *Hirundo riparia*, L. Brutet häufig in den umliegenden Sandbrüchen.

26. *Hirundo urbica*, L. } Häufige Sommervögel.

27. *Hirundo rustica*, L. }

28. *Picus viridis*, L. Häufiger Standvogel.

29. *Picus canus*, Gm. Seltener Standvogel; erst einmal, am 24. Mai 1887, ein Nest mit 6 Eiern gefunden; am 8. October 1887 erhielt ich ein ♂; am 18. März 1888 und 3. März 1889 beim Präparator Hühne hier je ein ♂ gesehen; 23. September 1888 schoss mein Freund Vorreyer ein schönes ♂

30. *Picus martius*, L. Seltener Brutvogel; brütend beobachtet im Lappwalde (und zwar in den Forstorten: „Burgberg“, „Nordenwald“ und „Gehren“); im Donn fand ich einmal den frischen Schädel eines Schwarzspechtes, also auch wohl dort Brutvogel; das Paar im „Burgberg“ hatte am 18. Mai 1886 5 ziemlich flügge Junge.

31. *Picus maior*, L. } Seltene Standvögel.

32. *Picus medius*, L. }

33. *Picus minor*, L. Sehr seltener Brutvogel; 13. Mai 1886 Nest mit 6 flüggen Jungen im „Elz“; 18. Februar 1887 erhielt ich ein ♀, welches hier in einem Garten geschossen, und besitze ich ein ♂, welches ebenfalls dort erlegt worden war.

34. *Jynx torquilla*, L. Häufiger Sommervogel.

35. *Cuculus canorus*, L. Häufiger Sommervogel.

36. *Coracias garrula*, L. Sehr seltener Sommervogel. Im „Elz“ wurde am 19. Mai 1886 ein Paar beobachtet.

37. *Alcedo ispida*, L. Als Durchzugsvogel öfter beobachtet; brütend nur an der Aller bei Walbeck.

38. *Upupa epops*, L. Brutet kaum noch im Gebiete; auch früher ziemlich selten. Ein verendetes Exemplar fand ich unter einer Eiche, in welcher sich mehrere Brutlöcher der Dohle befanden.

39. *Certhia familiaris*, L. }

40. *Sitta caesia*, M. }

41. *Parus maior*, L. }

Häufige Standvögel.

42. *Parus ater*, L. }

43. *Parus palustris*, L. }

44. *Parus cristatus*, L. }

Standvögel.

45. *Parus caeruleus*, L. Häufiger Standvogel.

46. *Mecistura caudata*, L. Häufiger Brutvogel.
47. *Regulus cristatus*, Vieill. Häufiger Strichvogel.
48. *Regulus ignicapillus*, Br. Seltener Sommervogel.
49. *Muscicapa atricapilla*, L. Sommervogel.
50. *Butalis grisola*, L. Häufiger Sommervogel.
51. *Bombycilla garrula*, L. Sehr seltene Wintererscheinung.
52. *Lanius excubitor*, L. Seltener Wintervogel.
53. *Lanius rufus*, Briss. Selbst noch nicht beobachtet; doch wurde er bei Harbke zur Brutzeit geschossen.
54. *Lanius collurio*, L. Sehr häufiger Sommervogel.
55. *Pica caudata*, Boie. In der nächsten Umgebung sehr seltener Brutvogel, häufig dagegen bei Walbeck.
56. *Garrulus glandarius*, L. Sehr häufiger Standvogel.
57. *Nucifraga caryocatactes*, L. Häufiger Durchzugsvogel im Herbste 1885 und 1888; sämtliche Exemplare, die ich erhielt, gehörten der var. *leptorhynchus*, R. Bl. an.
58. *Corvus monedula*, L. Häufiger Sommervogel.
59. *Corvus frugilegus*, L. 3 Colonien im Gebiete; I. bei Weferlingen, II. im Schieren (circa 300 Paar), III. im Elm (80—100 Paar).
60. *Corvus corax*, L. Brütete noch vor wenigen Jahren in den Forsten bei Harbke.
61. *Corvus corone*, L. Sehr häufiger Standvogel.
62. *Corvus cornix*, L. Häufiger Durchzugsvogel, sehr seltener Brutvogel; 15. Mai 1888 im „Elz“ ein Horst mit 4 hochbebrüteten Eiern.
63. *Oriolus galbula*, L. } Sehr häufige Sommervögel.
64. *Sturnus vulgaris*, L. }
65. *Turdus merula*, L. Häufiger Stand- und Strichvogel.
66. *Turdus torquatus*, L. Seltener Durchzugsvogel. 1888 wurden im Dohnenstege 2 ♂♂ gefangen.
67. *Turdus viscivorus*, L. Durchzugsvogel, seltener Brutvogel.
68. *Turdus pilaris*, L. } Durchzugsvogel,
69. *Turdus iliacus*, L. } doch mit jedem Jahre seltener werdend.
70. *Turdus musicus*, L. }
71. *Saxicola oenanthe*, L. } Häufige Sommervögel.
72. *Pratincola rubetra*, L. }
73. *Ruticilla phœnicura*, L. Sommervogel.
74. *Ruticilla tithys*, L. }
75. *Accentor modularis*, L. } Häufige Sommervögel.

76. *Lusciola luscinia*, L. Sommervogel, bei Helmstedt noch recht häufig.

77. *Erythacus rubeculus*, L. Häufiger Sommervogel.

78. *Sylvia hortensis*, Bechst. Sommervogel.

79. *Sylvia atricapilla*, L. Sommervogel; wird oft im Dohnensteg gefangen.

80. *Sylvia cinerea*, Lath.

81. *Sylvia curruca*, L.

82. *Phylloperosteus rufus*, Lath.

} Häufige Sommervögel.

83. *Phylloperosteus trochilus*, L.

84. *Phylloperosteus sibilatrix*, Bechst.

} Sommervögel.

85. *Hypolais salicaria*, Bp. Sommervogel.

86. *Calamoherpe turdina*, Glog. Bei Marienthal und Süpplingenburg brütend beobachtet.

87. *Calamoherpe arundinacea*, L. Sommervogel an fast allen Teichen.

88. *Calamoherpe palustris*, Bechst. Bei Süpplingenburg brütend beobachtet; ein einzelnes Pärchen brütete in einem Stachelbeerenbusche an einem der hiesigen Teiche.

89. *Troglodytes parvulus*, Koch. Häufiger Standvogel.

90. *Cinclus aquaticus*, L. Sehr seltene Erscheinung; vor einigen Jahren (1884) wurde ein Exemplar am Elm bei Schöningen geschossen, welches sich in meiner Sammlung befindet.

91. *Motacilla alba*, L. Häufiger Sommervogel.

92. *Motacilla sulphurea*, Bechst. Brutvogel; einige bleiben im Winter hier.

93. *Budytes flavus* L.

94. *Anthus pratensis*, L.

} Sommervögel.

95. *Anthus arboreus*, Bechst.

96. *Alauda arvensis*, L.

} Häufige Sommervögel.

97. *Alauda cristata*, L. Häufiger Standvogel.

98. *Emberiza miliaria*, L. Häufiger Sommervogel.

99. *Emberiza citrinella*, L. Sehr häufiger Standvogel.

100. *Emberiza schæniclus*, L. Häufiger Sommervogel bei Marienthal und Süpplingenburg.

101. *Plectrophanes nivalis*, L. Wintervogel, selten.

102. *Fringilla cœlebs*, L. Häufiger Sommervogel, ♂♂ auch im Winter.

103. *Fringilla montifringilla*, L. Alljährlicher Wintervogel.

104. *Ligurinus chloris*, L. Häufiger Strichvogel.
105. *Acanthis cannabina*, L. Sehr häufiger Strichvogel.
106. *Linaria alnorum*, Br. Fast in jedem Winter.
107. *Carduelis elegans*, Steph. Häufiger Strichvogel.
108. *Chrysomitris spinus*, L. Seltener Brutvogel; zur Zugzeit häufig.
109. *Pyrrhula europæa*, Vieill. Sehr seltener Brutvogel; brütend im Walbecker Moore beobachtet.
110. *Pyrrhula maior*, Chr. L. Br. Wintervogel.
111. *Coccothraustes vulgaris*, Pall. Sommervogel.
112. *Passer domesticus*, L. Sehr häufiger Standvogel.
113. *Passer montanus*, L. Häufiger Standvogel.
114. *Loxia curvirostra*, L. Seltener Durchzugsvogel. Den 17. April 1886 sah ich einen Schwarm von circa 30 Stück im Lappwalde.
115. *Columba palumbus*, L. Häufiger Sommervogel.
116. *Columba ænas*, L. Sommervogel; häufig im „Elz“, „Schieren“ und „Donn“.
117. *Turtur communis*, Selby. Sommervogel.
118. *Tetrao tetrix*, L. Sehr selten; im „Donn“ wurde (1884) ein ♀ geschossen; im Drömlinge Brutvogel.
119. *Phasianus colchicus*, L. Von den beiden Fasanerien bei Harbke und im Donn aus im ganzen Gebiete verbreitet; Nester fand ich schon im „grössen Walde“ (Lappwald) und im „Elz“.
120. *Perdix cinerea*, Lath. Häufiger Standvogel.
121. *Coturnix communis*, Bonn. Sommervogel, immer seltener werdend.
122. *Otis tarda*, L. Sehr selten; nur einmal wurde ein Exemplar ♂ bei Helmstedt erlegt.
123. *Otis tetrax*, L. Sehr seltene Erscheinung. Bei Schöningen wurde ein ♂ vor einigen Jahren erlegt.
124. *Charadrius pluvialis*, L. Durchzugsvogel; 1885 wurde ein Exemplar im Emmerstedter Bruche geschossen.
125. *Aegialites minor*, M. und W. Durchzugsvogel, wurde schon öfter erlegt.
126. *Vanellus cristatus*, L. Sommer- und Durchzugsvogel.
127. *Grus communis*, Bechst. Durchzugsvogel.
128. *Ciconia alba*, Schöff. Sommervogel; brütet in Helmstedt selbst nicht mehr, aber noch in einigen benachbarten Dörfern.

129. *Ardea cinerea*, L. Durchzugsvogel; brütete noch 1887 im Gebiete, Colonien befanden sich im „Schieren“ und im „Donn“; jetzt vollständig vertrieben.
130. *Rallus aquaticus*, L. Seltener Durchzugsvogel.
131. *Crex pratensis*, Bechst. } Sommervögel.
132. *Ortygometra porzana*, L. }
133. *Gallinula chloropus*, L. Häufiger Sommervogel.
134. *Fulica atra*, L. Häufiger Sommervogel bei Süplingen-
burg und Marienthal.
135. *Numenius arquatus*, L. Im Herbst 1886 wurde ein Exemplar erlegt.
136. *Scolopax rusticula*, L. Durchzugsvogel, seltener Brutvogel. Vor einigen Jahren wurde ein Nest mit 4 Eiern gefunden.
137. *Gallinago scolopazina*, Bp. Durchzugs- und Brutvogel bei Emmerstedt.
138. *Totanus calidris*, L. Durchzugsvogel.
139. *Anser cinereus*, M. Durchzugsvogel.
140. *Anas boscas*, L. Brutvogel und Durchzugsvogel.
141. *Anas querquedula*, L. Brütet bei Marienthal.
142. *Anas crecca*, L. Durchzugsvogel.
143. *Rhynchaspis clypeata*, L. Wurde bei Marienthal erlegt.
144. *Fuligula ferina*, Steph. Im Herbst 1885 wurden 2 Stück bei Süplingenburg geschossen.
145. *Colymbus rubricollis*, Gm. Seltener Durchzugsvogel.
146. *Colymbus auritus*, L. Seltener Durchzugsvogel.
147. *Colymbus minor*, Gm. Häufiger Brutvogel auf allen Teichen.
148. *Larus ridibundus*, L. Seltener Durchzugsvogel. Den 19. Juli 1886 einen Schwarm von circa 20 Stück gesehen.

Ornithologische Mittheilungen aus den Niederlanden.

Von J. P. van Wickevoort-Crommelin.

Nucifraga caryocatactes, L. Der *Tannenheher* hat sich in 1888 wieder an verschiedenen Orten der Niederlande gezeigt. Für meine Sammlung bekam ich zwei dünnschnäblige ♂, die am 28. September in einem Birkenwäldchen in den Dünen unweit des Nordseebades Zandvoort geschossen wurden, und ein am 31. October in einem

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): M Menzel Fritz

Artikel/Article: [Versuch einer Avifauna von Helmstedt und Umgebung. 88-94](#)