

129. *Ardea cinerea*, L. Durchzugsvogel; brütete noch 1887 im Gebiete, Colonien befanden sich im „Schieren“ und im „Donn“; jetzt vollständig vertrieben.

130. *Rallus aquaticus*, L. Seltener Durchzugsvogel.

131. *Crex pratensis*, Bechst. } Sommervögel.

132. *Ortygometra porzana*, L. }

133. *Gallinula chloropus*, L. Häufiger Sommervogel.

134. *Fulica atra*, L. Häufiger Sommervogel bei Süpplingenburg und Marienthal.

135. *Numenius arquatus*, L. Im Herbst 1886 wurde ein Exemplar erlegt.

136. *Scolopax rusticula*, L. Durchzugsvogel, seltener Brutvogel. Vor einigen Jahren wurde ein Nest mit 4 Eiern gefunden.

137. *Gallinago scolopazina*, Bp. Durchzugs- und Brutvogel bei Emmerstedt.

138. *Totanus calidris*, L. Durchzugsvogel.

139. *Anser cinereus*, M. Durchzugsvogel.

140. *Anas boscas*, L. Brutvogel und Durchzugsvogel.

141. *Anas querquedula*, L. Brütet bei Marienthal.

142. *Anas crecca*, L. Durchzugsvogel.

143. *Rhynchaspis clypeata*, L. Wurde bei Marienthal erlegt.

144. *Fuligula ferina*, Steph. Im Herbst 1885 wurden 2 Stück bei Süpplingenburg geschossen.

145. *Colymbus rubricollis*, Gm. Seltener Durchzugsvogel.

146. *Colymbus auritus*, L. Seltener Durchzugsvogel.

147. *Colymbus minor*, Gm. Häufiger Brutvogel auf allen Teichen.

148. *Larus ridibundus*, L. Seltener Durchzugsvogel. Den 19. Juli 1886 einen Schwarm von circa 20 Stück gesehen.

## Ornithologische Mittheilungen aus den Niederlanden.

Von J. P. van Wickevoort-Crommelin.

**Nucifraga caryocatactes**, L. Der *Tannenheher* hat sich in 1888 wieder an verschiedenen Orten der Niederlande gezeigt. Für meine Sammlung bekam ich zwei dünnschnäblige ♂, die am 28. September in einem Birkenwäldchen in den Dünen unweit des Nordseebades Zandvoort geschossen wurden, und ein am 31. October in einem

Walde der östlichen Provinz Gelderland erlegtes ♀. Die übrigen Individuen meiner Sammlung, welche in früheren Jahren in den Niederlanden erlegt worden sind, gehören alle gleichfalls zur dünn-schnäbligen sibirischen Rasse (*var. leptorhyncha*, R. Bl.).

**Picus major**, L. Der in den meisten Ländern Europa's so allgemeine Buntspecht besucht unsere Küsten-Provinz Holland öfters, aber nur auf dem Herbstzuge. Vom Anfang September an war er den ganzen Herbst 1889 ausserordentlich zahlreich. Einzelne Exemplare, unter welchen sehr alte, blieben den Winter hindurch bis Mitte Januar und selbst noch Ende Februar.

**Muscicapa albicollis**, Temm. Ein ♀ von dieser für die Niederlande höchst seltenen Art wurde anfangs September 1889 in Holland gefangen und befindet sich im Reichsmuseum zu Leiden.

**Muscicapa parva**, Bechst. Das Erscheinen dieser interessanten Fliegenfängerart in den Niederlanden wurde zum erstenmal am 23. September 1888 durch den Fang eines Weibchens in einem an den Buchenwald nördlich vom Haag grenzenden Garten constatirt. Ueber dieses Exemplar, das einzige, so viel ich weiss, welches in den Niederlanden erlegt worden ist und die Sammlung der Hrn. H. W. und G. M. de Graaf zu Leiden ziert, berichtete der erstere in der Zeitschrift des Niederländischen Zoologischen Vereins. (Ser. 2, Th. II. S. 158).

**Anthus aquaticus**, Bechst. Vereinzelte Individuen des Wasserpiepers verirren sich bisweilen auf dem Herbstzuge bis an die Meeresküste von Holland und erscheinen in den grossen Flügen des Strandpiepers (*Anthus obscurus*, Temm., *A. rupestris*, Nilss). Ein ♀ meiner Sammlung wurde am 25. October 1862 in der Provinz Süd-Holland gefangen; ein anderes am 10. October 1820 in der Umgegend von Leiden erlegtes Weibchen befindet sich in dem Museum von H. E. Dresser in London.

**Loxia bifasciata**, Chr. L. Br. Zwei ♂♂ von dieser seltenen Art, jetzt in meiner Sammlung, wurden am 17. September 1889 in einem Lärchenwäldchen der mit Nadelholz bewachsenen Dünengegend in der Nähe des Dorfes Bløemendaal, nördlich von Haarlem, aus einem kleinen Fluge von zehn Kreuzschnäbeln geschossen, welche sich seit Juni daselbst aufhielten, nachher aber nicht mehr gesehen wurden.

**Columba oenas**, L. Diese Taubenart wurde bisher in den Niederlanden bloss hie und da auf dem Zuge beobachtet und nur in der

östlichen Provinz Gelderland, der angrenzenden Provinz Utrecht und vielleicht in deren unmittelbarer Nähe nistend gefunden. 1889 wurde ihr Brüten zum erstenmale an einem waldigen Orte der westlichen Provinz Süd-Holland, in der Nähe des Dorfes Hillegom constatirt. Das Elternpaar und die beiden schon befiederten, aber noch nicht ausgeflogenen Jungen (gleichfalls ♂ und ♀) wurden im Juni gefangen und befinden sich in meiner Sammlung.

**Syrhaptus paradoxus**, *Pall.* Grosse Flüge von diesen Wandervögeln haben sich auch 1888 wieder auf den niederländischen Meeresdünen (schon Mitte Mai) niedergelassen. Einzelne Paare begannen, wie 1863 in den Dünen bei dem Nordseebade Zandvoort zu brüten, doch wurden die Gelege, die aus 3 Eiern bestanden, von Menschen oder Thieren geplündert. Einige Ketten liessen sich daselbst noch den ganzen Herbst und Winter über bis April 1889 sehen. Auf anderen mehr nördlich gelegenen Meeresdünen haben sich Steppenhühner nur bis Ende August und stets in Schwärmen aufgehalten, dort aber nicht gebrütet, obwohl man sie schützte. Auch auf der Nordseeinsel Texel sind mehre Flüge gesehen und ebenso Eier gefunden worden.

HAARLEM, März 1890.

---

## Ornithologisches aus Seitenstetten (Niederösterr.) 1889.

Von Rud. Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

---

**Galerida cristata**, *L.* Die Haubenlerche, welche hier in früheren Jahren fast gar nicht bemerkt wurde, trat in diesem Herbst und Winter in ganz auffallender Zahl auf. Sie zeigte sich vom 20. October an in grösseren und kleineren Flügen auf den Feldern und trieb sich hier bis gegen Weihnachten herum. Als der Schnee gewichen war, zeigten sich nur einzelne, später bei erneuertem Schneefalle ein Schwarm von circa 30 Stück. Im nicht ferne gelegenen St. Valentin ist sie häufiger Nistvogel.

**Loxia curvirostra**, *L.* und **L. bifasciata**, *Chr. L. Br.* Auch der Fichtenkreuzschnabel erschien im Herbst häufiger als sonst, wenngleich auch nicht in den Massen, welche ich während der Sommer- und Weihnachtsferien in Hallein antraf. Sie kamen in kleinen Flügen von 4—7 St. in den Conventgarten.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Wickevoort-Crommelin Johann Pieter van

Artikel/Article: [Ornithologische Mittheilungen aus den Niederlanden. 94-96](#)