

Das Sonnabend den 2. August d. J. Abends zwischen Eisleben und Könnern niedergehende **schwere Regenwetter tödtete tausende von Singvögeln und Sperlingen.** Erhebungen in der dortigen Gegend würden erstaunliche Zahlen zu Tage bringen. Als Beleg sei hier erwähnt, daß unter 4 Schwarzpappeln, welche bei Hof Domnitz (Saalkreis) einem Eiskeller Schutz und Schatten gewähren, am Morgen des 3. August 314 Sperlinge aufgelesen werden konnten, welche vom starken Regenguße niedergeschlagen und getödtet waren. Es sollen fast nur Junge gewesen sein, die sich diese Bäume als Obdach gewählt hatten, weil ihnen ein Weizenfeld, welches dicht dabei war, am Tage reichlich Nahrung gewährte; — oder sollten die älteren Sperlinge widerstandsfähiger gegen das Unwetter gewesen sein? Glaubhafter ist es, bei der angedeuteten Sachlage, daß die Alten vorsichtiger gewesen sind in der Wahl ihres Ruheplätzchens, und es haben dieselben gewiß noch zum großen Theil gebrütet.

Schwuitsch. Dr. Titus Knauer.

Litterarisches.

„**Studien über einige südamerikanische Vögel nebst Beschreibung neuer Arten**“ ist eine sehr verdienstvolle Arbeit betitelt, welche die Herren Hans von Berlepsch und Paul Leverkühn in Heft I, Jahrgang VI der Ornithologie veröffentlicht haben. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Material, welches von Dr. Behn 1845—1847 auf der Weltreise der „Galathea“ und auf einer Landreise durch Südamerika gesammelt und im Universitätsmuseum zu Kiel aufbewahrt worden war. Dort lag es bisher nur wenig berücksichtigt und harrete unter vorzüglicher Conservirung vielfach der Bearbeitung, obgleich Herr Leverkühn schon 1889 in *Cab. Journ. f. Ornithol.* S. 101 aus diesem Vorrath vier neue Arten resp. Abarten beschrieben hatte. Die beiden Herren Verfasser haben 35 Species südamerikanischer Vögel dem genauen Studium unterzogen, von denen fünf, was besonders hervorzuheben, in bunter Abbildung beigegeben sind. 11 neue Arten resp. Abarten werden aufgeführt: *Merula subalaris*, Lev. aus der brasilianischen Provinz Goyaz; *Troglodytes furvus* (Gm.) *rex*, Berl. et Lev.; *Cnipolegus orenocensis*, Berl. aus Angostura; *Myiarchus Pelzelni*, Berl. aus Goyaz; *M. tyrannulus* (St. Müll.) *chlorepiscius*, Berl. et Lev. aus Mattogrosso; *Synallaxis Cabanisi*, Berl. et Lev. aus Peru; *S. heterocerca*, Berl. et Lev. aus Argentinisch-Cordova; *Homorus Galathea*, Lev. aus Angostura; *Myrmotherula Behni*, Berl. et Lev. aus der Gegend von S. Fé de Bogota; *Grallaria imperator* (Laf.) *intercedens*, Berl. et Lev. aus Bahia (?) und *Chloroenas plumbea* (Vieil.) *Bogotensis*, Berl. et Lev. ebendaher.

R. Th. Liebe.

Anzeigen.

Beste reine, frisch gesammelte thür. **Waldameiseneier** à Liter 85 \mathcal{L} ,
I. staubfreie 1890^{er} gedörrte " " " " à Liter 75 \mathcal{L} .
 und $\frac{1}{2}$ Kilo 1 \mathcal{M} . 75 \mathcal{L} .

empfehle in bekannter schöner Waare.

Querfurt i. Thür.

D. Zoepelmann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Liebe Karl Theodor

Artikel/Article: [Litterarisches. 348](#)