download www.biologiezentrum.at

Ornithologischer Informationsdienst

Herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Ref. Faunistik, c/o Naturhistorisches Museum, Postfach 417, A-1014 Wien.

Zusammengestellt von Dipl.Ing.Peter Prokop.

Nur für den persönlichen Gebrauch, gilt nicht als Veröffentlichung.

Folgende Mitarbeiter stellten ihre Beobachtungen zur Verfügung:

Almer, E.	EAl	Pichler, R.	RPi
Baar, W.	WBa	Präsent, I.	IPr
Bamberger, Ch.	CBa	Präsent, S.	SPr
Bauer, K.Dr.	KBa	Prokop, Dipl.Ing.P.	PPr
Bichl, W.	WBi	Reid, J.	JRe
Billek, A.	ABi	Rischer, F.	FRi
Blum, V. OSR.	VBl	Rogers, M.	MRo
Blumenschein, J.	JBl	Rokitansky MR.Dr.G.	GRo
Czikeli, H.	HCz	Rumpf, W.	WRu
Degen, F.	FDe	Samwald, F.	FSa
Diwald, M.	MDi	Schmitz, O.	OSch
Duda, Dr.E.	EDu	Schneider, H.	HSch
Ernst, Dr.H.	HEr	Schneider, P.	PSch
Erlinger, G.	GEr	Schobesberger, G.	GSch
Fendrich, W.	WFe	Schwab, E.	ESch
Freund, Dr.H.	HFe	Spitzenberger-Weiß, Dr.F.	FSp
Frey, Dr.H.	HFr	Stadelmann, F.	FSt
Ganso, M.	MGa	Stani, W.	WSt
Gruber, Dr.J.	JGr	Staudinger, M.	MSt
Grull, A.	AGr	Steiner, Doz.Dr.H.	HSt
Haar, H.	HHa	Steininger, E.	ESt
Hable, Prof.E.	EHa	Stocker, R.	RSt
Hemerka, S.	SHe	Thaler, Ing.A.	ATh
Kilzer, R.	RKi	Titz, E.	ETi
Köck, J.	JKö	Triebl, R.	RTr
Kraus, E.	EKr	Wagner, S.	SWA
Lauermann, H-J.	HLa	Wagner, W.	WWg
Lehmann, W.	WLe	Walter, Dr.H.	HWa
Leisler, Dr.B.	BLe	Walter, Dipl.Ing.W.	WWa
Lindenthaler, A.	ALi	Weber, OSR. W.	WWe
Loicht, Dkfm.G.	GLo	Weissert, Dipl.Ing. B.	BWe
Mayer, A.	AMa	Wendelberger, R.	RWe
Myrbach-Rheinfeld,Dr.H.	HMR	With, J.	JWi
Myrbach-Rheinfeld, E.	EMR	Wolff, Dr.P.	PWo
Pammer, H.	HPa	Woschitz, M.	MWo
Parker, R.	RPa	Wruß, W.	WWr
Pauler, Dipl.Ing.K.	KPa	Zmölnig, J.	JZm
Petz, E.	EPe		

Wir danken folgenden ausländischen Beobachtern für ihre Exkursionsberichte:
D. Kurth, J.Wittenberg, R.Schütt (alle BRD).

www.biologiezentrum.at







Der Witterungsverlauf im Berichtszeitraum

März:

Bis zum 13. weiterhin frühlingshaft, danach Übergang zu spätwinterlichem Wetter mit Schneefällen bis ins Flachland. Zum 3o.-31.März die größten Schneehöhen des Jahres. Insgesamt hatte der Monat normale Temperaturverhältnisse, war aber extrem niederschlagsreich, v.a. in Kärnten und Osttirol.

April:

Insgesamt kühl. Wechselhaftes Wetter, in den Berggebieten sehr niederschlagsreich, im Flachland zu trocken. Die Höhen um 7oo m werden zu Monatsmitte, um 1ooo m erst zu Monatsende schneefrei. Vegetationsentwicklung auch im Flachland um mehrere Tage verzögert (Buchenlaub nach dem 1o., Kirschblüte nach dem 2o.).

Mai:

Ständiger Wechsel zwischen trockenen und warmen bzw. kühlen und niederschlagsreichen Abschnitten. Rasche Vegetationsentwicklung in den Niederungen (um 5oo m Apfelblüte zur Monatsmitte, Heuschnitt zu Monatsende). Höhen zw. 15oo u. 2ooo m erst nach dem 15. schneefrei, zu Monatsende nochmals kurzlebige Neuschneedecke bis auf 15oo m herab.

download www.biologiezentrum.at





Juni:

Insgesamt zu kühl und niederschlagsreich, trotz der vielen Regentage kaum Verzögerung in der Vegetationsentwicklung. Schneefälle zu Monatsbeginn bis auf ca.1ooo m herab, zu Monatsende bis zur Waldgrenze. Zahlreiche heftige Gewitter, oft von Hagelschlag begleitet.





Juli:

Insgesamt normale Temperaturverhältnisse, etwas zu feucht. Regnerische Perioden - vor allem zu Monatsbeginn - wechseln mit schwüler heißer Witterung ab. Anfang des Monats zahlreiche Überschwemmungen (Donaupegel Wien/ Reichsbrücke 8o6 cm). Verzögerter Ablauf der Heu- und Getreideernte. Viele Gelsen.





August:

Temperaturen und Niederschläge etwa dem langjährigen Durchschnitt entsprechend. Längere Perioden sommerlichen Schönwetters, vor allem in der ersten Dekade und zu Monatsende, sonst meist unbeständiges, feuchtschwüles Wetter mit zahlreichen Gewittern. Am 24./25. Kaltlufteinbruch mit Neuschnee bis auf 2ooo m.

download www.biologiezentrum.at

Weitere Daten zur Verbreitung der Wacholderdrossel:

Aus erfreulich vielen Meldungen über diese Art ergibt sich eine weitere Ausbreitung, die in Kärnten bereits die Südostgrenze des Landes erreicht. In der Steiermark ist das Ennstal zwischen Wörschach und Admont praktisch durchwegs besiedelt, bereits 1972 wurde das mittlere Mürztal bei Krieglach erreicht. In Niederösterreich reicht das Brutvorkommen im Waldviertel weiter nach Süden und Osten als bekannt; außerdem wurde ein Brutversuch aus dem Alpenvorland gemeldet.

Daten zur Höhenverbreitung

Mehrere Meldungen aus dieser Brutzeit geben Hinweise auf hochgelegene Brutplätze (z.B. Zwergtaucher, Stockente, Kiebitz). An solchen Daten ist unser Archiv immer noch relativ arm.

Beobachtungen Sommer 1975:

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Weitere Brutplätze aus St: Weinburger Teich 2o.7. 2 ad + 2 inv.(WSt)
Neudauer Teich: 25.7. 2 ad mit 3 frisch geschl. pull, 5.Ei taub (BWe

Rothalstaucher (Podiceps griseigena)

Eine weitere Sommerbeob. aus St: 1. u. 5.6. 1 Ex Bkl. Rabenhofer Teich südl. Leibnitz (WSt).

Zwergtaucher (Podiceps ruficollis)

St: 13.8. erfolgreiche Brut am Schattensee (1318 m) Gem. Krakau-Hintermühlen. Wahrscheinlich höchstgelegener Brutplatz der Steiermark (EHa, IPr).

Graureiher (Ardea cinerea)

Ergänzende Angaben zu Böck, Egretta 18, 2:
N: Petronell: 19/2o.5. ca. 1o besetzte Horste (RWe).
St: Kolonie Altneudörfl: am 14.5. 7 besetzte Horste, 1 toter Altvogel und Eischalen unter einem Horstbaum. Die Kolonie ist durch den Bau eines Hochwasserschutzdammes und damit verbundene Schlägerungen aufs höchste gefährdet (HHa).

Purpurreiher (Ardea purpurea)

V: 1975 wahrscheinlich wieder Brut bei Fußach. Beob. von ad zw. 1.5. u. 7.6., am 26.8. 2 iuv. (VBl).

Silberreiher (Casmerodius albus)

B: 21.5. vom Flugzeug aus im österr. Teil des Neusiedler Sees am Westufer rund 11o, am Ostufer (nahe ung.Grenze) rd. 15o besetzte Horste festgestellt (mdl. Mitt. Insp.Kreisler, Flugsicherung Trausdorf).

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Brutzeitbeobachtungen:
N: Raum Neulengbach (JRe), Triestingtal (ETi), Dunkelsteiner Wald (mdl. Mitt. Prim.Schober an KBa), Bucklige Welt (WWa).
B: Moschendorfer Wald, dort früheres Brutvorkommen durch Fällen der Horstbäume unterbrochen (FSp).
OÖ: Umgebung Molln (mdl. Mitt. Heinrich Kuffner an JBl)
St: sö. Ausläufer des Wechsels (WWa).

download www.biologiezentrum.at

Graugans (Anser anser)

B: Bereits am 28.1. verpaarte Ex. am Illmitzer Zicksee (HFr)
Am 6.4. dort 3 führende Paare (MSt).

Krickente (Anas crecca)

Ein neuerlicher Brutnachweis aus St: 5. u.19.7. 1 w führt Murstausee Gralla (WSt).
Zwischen Mai und August regelmäßige Beob. in den Ennsauen bei Stainach und um Mitterndorf (MCz).

Stockente (Anas platyrhynchos)

St: Im Sommer 1975 am Riesachsee, 1386 m, sö. Schladming ca. 5 BP. (mdl. Mitt. an MSt).
T: 3.5. 1 m. am Durlaßboden-Stausee, 137o m (EMR).

Reiherente (Aythya fuligula)

K: 18.5. ein Paar brutverdächtig am Sablatnig-Teich (WWr).
St: 18.5. noch ein Paar auf dem Rattenberger Teich b.Judenbu

Gänsesäger (Mergus merganser)

T: 27.4. 2 m, 1 w. am Plansee (HMR). Dort zuletzt 1969 e Brutnachweis (R.Wismath, 1971, Orn.Mitt. 23, 7/8 pp 131-135).

Weißkopfgeier (Gyps fulvus)

Außer in den Salzburger Hohen Tauern auch in K beob: 1 Ex. bei Ferlach fotografiert (WWr).

Rotmilan (Milvus milvus)

K: 14.6. u.27.7. je 1 Ex. Rattendorf im Gailtal (Martinek fide w

Kornweihe (Circus cyaneus)

B: 14.3. 1 Paar zeigt Flugspiele, Friedrichshof, Parndorfer Platte (MSt).

Fischadler (Pandion holiaetus)

Weiter späte Zug- bzw. Sommerdaten:
K: 1.6. 1 Ex. Völkermarkter Stausee (WWr).
St: zw. 2.6. u.9.7. 7 Beob. eines Ex. am Neudauer Teich (BWo)

Haselhuhn (Tetrastes bonasia)

K: 25.2. 1 Ex. Gailauen b.Villach (SWa).
St: 2o.2. 1 m, in der Koppenschlucht (HSch),
8.7. ein Familienverband unterhalb der Bergeralm bei Bad Mitterndorf (11oo m), (HCz).
T: 22.2. Spuren und Losung b. Trins,
25.4. Losung im Brunntal,
8.5. 1 Ex. am Holzleitensattel (HMR).

download www.biologiezentrum.at

Wachtelkönig (Crex crex)

Rufende m. verh:
O: Freundorf b.Klaffer (15.5., EPe), Ibmer Moor, Wenger Moor (2o.5., MGa), Leithen b. Eberschwang (29.7., JGr).
St: Halbenrain (14.5. HHa), St.Lambrecht (24.6. u. 5.8., IPr), Hörfeld, Mariahof (12.7., SPr), Steir.Laßnitz (4-5 m,1o.7. EHa).
T: JRe), Arzl (29.5. u.6.6. HMR).
V: Lauterach (13.5.-3.7. max.2), Lustenau (14.5.) Fußach(11.6. VBl)

Großtrappe (Otis tarda)

B: Im Hansag 3 balzende m. (MSt, PPr).
N: 22.6. 1 Ex. Fischa-Wiesen (EDu).

Kiebitz (Vanellus vanellus)

S: Brutplätze im Lungau: Vorderweißpriach-Bruggarn (11oo m) einige BP, Althofener Moos bei Mariapfarr ca. 1o BP, Dürrenecksee (17oo m) b. Tamsweg erfolglose Brutversuche eines BP in den letzten Jahren (mdl. Mitt. von Einheimischen an HEr).

Bekassine (Gallinago gallinago)

V: Im Rheindelta 17 Reviere, 4 im Raum Lauterach-Dornbirn (VBl).

Großer Brachvogel (Numerius arquata)

B: In den Zitzmannsdorfer Wiesen 2 brutverdächtige Paare (MSt,PPr).
N: 1.6. 1 Ex. zw. Wallsee u. Leitzing (EAl).
V: Im Rheindelta mit 11 Paaren neuer Tiefstand. Während der Brutzeit wurden dort Gräben ausgebaggert (VBl).
Im Weitried Rankweil 2 erfolgreiche Bruten (FSt).

Brachschwalbe (Glareola pratincola)

B: 29.5. 2 Ex, 26.6. 2 Ex. Lange Lacke, 29.8. 1 Ex. Wörthenlacke (RTr).

Heringsmöwe (Larus fuscus)

B: 2o.9. 2-3 imm. am Oberstinker (DKu).
K: 18.6. 1 Ex. BK am Völkermarkter Stausee (WWr).
N: 5.5. 2 imm.Ex. Schönau/Donau (EDu).
W: 5.6. 2 ad Ex. am Entlastungsgerinne der Donau (HCz).

Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)

K: 22.7. 1 ad Rkl. Drauschleife b.Villach (SWa).

Zwergohreule (Otus scops)

K: ca. 2o.8. 1 Ex. rufend bei Rottenstein, St.Georgen am Längsee (GRo).

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

N: 26.7. 1 Ex. Sandberg b.Oberweiden (BLei).
St: 19.5. 1 m. überfahren gefunden, zw.Gosdorf u.Wittmannsdorf
18.5. 1 m. bei St.Nikolai bei Draßling (JRe).

download www.biologiezentrum.at

Alpensegler (Apus melba)

K: 29.7. in der Kolonie in der Kirche Heiligenblut 5 Nester mit 3, 4 mit 2, 1 mit 1 Jungen beringt. Md. 1-2 Nester schon ausgeflogen (WWr, MWo, JZm).
21.8. 1 Ex. über der Drauschleife bei Villach (SWa).
18.1o. 9 Ex. über Obervellach (ALi).
T: 1.1o. 1 Ex. Sattelberg bei Gries am Brenner (HMR).

Bienenfresser (Merops apiaster)

N: md. 5 BP im Osten des Landes (ABi, JRe, MSt, EDu).
O: 31.5. 1 Ex. beringt in Obstgarten bei Aigen (EPe).

Blutspecht (Dendrocopus syriacus)

N: 8.5. 1 w. in Weingarten m.kl. Obstbäumen zw. Dürnstein und Unterloiben (KBa).

Weißrückenspecht (Dendrocopus leucotos)

N: 3o.9. 1 Ex. Truppenübungsplatz Allentsteig (GRo).

Haubenlerche (Galerida cristata)

B: Beob. außer im Seewinkel
29.3. 1 Ex. bei Eisenberg (FSp),
17.5. 1 singendes Ex. Punitz (EDu).

N: 31.5. 1 Ex. futtersuchend Wr.Neustadt (HWa).
W: 3.5. im Überschwemmungsgebiet 1 Nest mit 4 Jungen, 1 mit 3 Eiern (ATh)
1.5. 1 Ex. NE-Ecke Zentralfriedhof (KBa, HWa)

Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris)

K: Zw. 3.5. u. 13.8. 1 Paar an der Eggerlochhöhle b.Warmbad Villach. Bringt 3 Junge hoch. Erstansiedlung (SWa).
St: 1.4. Erstankunft am Puxer Loch.
9.6. dort 1o Ex., guter Bruterfolg (EDu, EHa).

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

St: 21.5. mehrere Nester an Gebäuden in der Herrengasse, Stadtzentrum von Graz, von 12-15 Ex. angeflogen (KBa).

Aschköpfige Schafstelze (Motacilla flava cinereocapilla)

V: im Rheindelta mind. 5 BP (VBl).

Maskenstelze (Motacilla flava feldegg)

B: 2o.4. 1 m. am Bootshafen Purbach (MSt).
15.6. 1 m. singt am Parkplatz des Seebades Illmitz (MSt).
27.7. dort erfolgreiche Brut, Junge gerade ausgeflogen (BLei).

Baumpieper (Antnus trivialis)

B: 2o.7. 1 Ex. mit Futter, warnend, Wäldchen bei Schwarzseelacke (MSt). Bisher fehlen Brutnachweise im Seewinkel außerhalb des Hansag.

©Ornithologie www.biologiezentrum.at

Schwarzstirnwürger (Lanius minor)

Außerhalb des Neusiedlerseegebietes folgende Beob.:
NÖ: 22.6. 1 Ex. b.Prinzendorf/Zaya (WLe).
St: 5.7. 1 Ex. b. Tillmitsch
20.7. 1 Ex. füttern 2 Junge, Seibuttendorf (WSt).
W: 2.5. 1 m, 1 w, Steinhof (ETi).

Alpenbraunelle (Prunella collaris)

O: 16.5. 1 Ex. singt am Schieferstein, 1181 m, b.Losenstein (PPr). Vorkommen in relativ geringer Seehöhe.

Zwergschnäpper (Ficedula parva)

Außer Beobachtungen im "klassischen" Vorkommen im Wiener Wald, Meldungen aus
St: 26.5. u.3.6.74 1 m. singt in Buchenwald, Kl.Gölk bei Krieglach (RSt).
17.5.75 1 Paar am Hörndlberg, Salzaspeicher bei Bad Mitterndorf (HCz).

Sprosser (Luscinia luscinia)

N: 9.5. 1 singendes Ex. am Bisamberg längere Zeit hindurch verhört, an 3 Folgetagen nicht mehr zu beobachten (EDu). Seit Jahren liegen von dieser früher in den Donauauen bei Wien brütenden Art keine Frühjahrsbeobachtungen mehr vor.

Steinrötel (Monticola saxatilis)

N: 25.5. 1 w. vertreibt andere Kleinvögel, Weingarten am Fuß des Pfaffenberges b.Deutsch-Altenburg (HEr).
V: 2.-4.6. nach Schneefall bis auf 1200 m 1 m. u. 1 w. im Tal beob. m. zeigt einmal kurzen Singflug von Fichte zum Boden (RKi).

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Folgende Brutvorkommen bzw. Brutbeobachtungen in Ergänzung zur Beilage zu ID 19:
K: 31.5. 1 Ex. haßt auf Krähen, Nähe Staatsgrenze b.Bleiburg. Mai-Juni Brutvorkommen bei Nötsch, Reisach u.Rattendorf im Gailtal sowie bei Heiligenblut (WWr).
4.6.-14.8. Beob. von 2-6 Ex. b.Warmbad Villach (SWa).
N: Frühjahr 74 Brutversuch eines Paares im Ortsbereich von Purgstall/Erlauf, Jungvogel von Elstern geraubt (FRe).
6.4.75 einzelne Ex. und Paare in Rapottenstein (HCz).
8.5. einzelne, Paare und kl.Gruppen um Kleingerungs, Haselberg, Biberschlag, Ottenschlag, Martinsberg und am Stifterteich im Weinsberger Wald (KBa, HWa).
17.5. 1 Ex. am Oberhofteich b.Geras (HLa u.KBa).
S: 10.6. Nest mit 4 juv. u. 1 Ei in Moorwald am Westende des Fuschlsees (JParker).

download www.biologiezentrum.at

St: Im Ennstal Brutnachweis vom Wörschacher Moos (HCz) und Krumauer Moor (Fütternde Eltern, 8.6. WWe), weiters Brutzeitbeob. von Niederöblarn (HCz), Putterer See (MDi), Irdninger Moos, Ennswiesen bei Liezen und Mitterberg bei Selzthal (HCz).
Im Raum Eisenerz 4.6. fütternde in der Ramsau, 5.6. Nest auf der unteren Prossen (WWe).
Um Krieglach seit 1972 Brutzeitbeob., 1974 der erste Brutnachweis, 1975 in der Umgebung von Feistritz 3 kleine Kolonien von insgesamt md. 18 BP (RSt).
Im oberen Murtal 13.4. kleine Brutkolonien in Adendorf, Gem. Mariahof sowie im Doblermoos, Gem. Kulm a. Zirbitz (EHa); 29.6. mehrere Nester im Stadtgebiet Knittelfeld (WWr).
9.7. 1 Ex. am Muhrteich (EDu).
T: 1o.6. einige Ex. hassen auf Elster, Autobahnrasthaus Weer (HCz).

Ortolan (Emberiza hortulana)

K: Juli 75 mehrere BP bei Lind im Drautal (WWr).
5.7. Nest mit frisch geschl. inv. bei Treßdorf i.Gailtal (MWo).
28.6. Nest in Getreidefeld, 3 5-6 tag Junge, Rattendorf im Gailtal (MWo).
T: 13.6. 1 m. singt bei Inzing (HMR).

Zippammer (Emberiza cia)

K: Brutplatz bei Rechberg erneut bestätigt, neuer Brutplatz am Kreuzbergsattel im Gailtal (11oo m), dort am 5.7. 3 nj. beringt (WWr, JZm, MWo).

Bergfink (Fringilla montifringilla)

St: 29.6.75: In der Nähe des Grebenzenschutzhauses wird ein anhaltend singendes m. beob. (mdl. Mitt. von E.Schwab, Hainstadt, BRD an EHa). Nachsuche am 3.7. erfolglos.

Zitronenzeisig (Serinus citrinella)

T: 11.5. 1 Ex. b. Waldrast (HMR).
V: 25.3.-4.5. fast täglich 1o-15 am Futterplatz, auch singend, Wald am Arlberg (RKi).

download www.biologiezentrum.at

Schwarzstirnwürger (Lanius minor)

Außerhalb des Neusiedlerseegebietes folgende Beob.:
NÖ: 22.6. 1 Ex. b.Prinzendorf/Zaya (WLe).
St: 5.7. 1 Ex. b. Tillmitsch
20.7. 1 Ex. füttern 2 Junge, Seibuttendorf (WSt).
W: 2.5. 1 m, 1 w, Steinhof (ETi).

Alpenbraunelle (Prunella collaris)

O: 16.5. 1 Ex. singt am Schieferstein, 1181 m, b.Losenstein (PPr). Vorkommen in relativ geringer Seehöhe.

Zwergschnäpper (Ficedula parva)

Außer Beobachtungen im "klassischen" Vorkommen im Wiener Wald, Meldungen aus
St: 26.5. u.3.6.74 1 m. singt in Buchenwald, Kl.Gölk bei Krieglach (RSt).
17.5.75 1 Paar am Hörndlberg, Salzaspeicher bei Bad Mitterndorf (HCz).

Sprosser (Luscinia luscinia)

N: 9.5. 1 singendes Ex. am Bisamberg längere Zeit hindurch verhört, an 3 Folgetagen nicht mehr zu beobachten (EDu). Seit Jahren liegen von dieser früher in den Donauauen bei Wien brütenden Art keine Frühjahrsbeobachtungen mehr vor.

Steinrötel (Monticola saxatilis)

N: 25.5. 1 w. vertreibt andere Kleinvögel, Weingarten am Fuß des Pfaffenberges b.Deutsch-Altenburg (HEr).
V: 2.-4.6. nach Schneefall bis auf 1200 m 1 m. u. 1 w. im Tal beob. m. zeigt einmal kurzen Singflug von Fichte zum Boden

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Folgende Brutvorkommen bzw. Brutbeobachtungen in Ergänzung zur Beilage zu ID 19:
K: 31.5. 1 Ex. haßt auf Krähen, Nähe Staatsgrenze b.Bleiburg. Mai-Juni Brutvorkommen bei Nötsch, Reisach u.Rattendorf im Gailtal sowie bei Heiligenblut (WWr).
4.6.-14.8. Beob. von 2-6 Ex. b.Warmbad Villach (SWa).
N: Frühjahr 74 Brutversuch eines Paares im Ortsbereich von Purgstall/Erlauf, Jungvogel von Elstern geraubt (FRe).
6.4.75 einzelne Ex. und Paare in Rapottenstein (HCz).
8.5. einzelne, Paare und kl.Gruppen um Kleingerungs, Haselberg, Biberschlag, Ottenschlag, Martinsberg und am Stifterteich im Weinsberger Wald (KBa, HWa).
17.5. 1 Ex. am Oberhofteich b.Geras (HLa u.KBa).
S: 10.6. Nest mit 4 juv. u. 1 Ei in Moorwald am Westende des Fuschlsees (JParker).

download www.biologiezentrum.at

St: Im Ennstal Brutnachweis vom Wörschacher Moos (HCz) und Krumauer Moor (Fütternde Eltern, 8.6. WWe), weiters Brutzeitbeob. von Niederöblarn (HCz), Putterer See (MDi), Irdninger Moos, Ennswiesen bei Liezen und Mitterberg bei Selzthal (HCz).
Im Raum Eisenerz 4.6. fütternde in der Ramsau, 5.6. Nest auf der unteren Prossen (WWe).
Um Krieglach seit 1972 Brutzeitbeob., 1974 der erste Brutnachweis, 1975 in der Umgebung von Feistritz 3 kleine Kolonien von insgesamt md. 18 BP (RSt).
Im oberen Murtal 13.4. kleine Brutkolonien in Adendorf, Gem. Mariahof sowie im Doblermoos, Gem. Kulm a. Zirbitz (EHa); 29.6. mehrere Nester im Stadtgebiet Knittelfeld (WWr).
9.7. 1 Ex. am Muhrteich (EDu).
T: 1o.6. einige Ex. hassen auf Elster, Autobahnrasthaus Weer (HCz).

Ortolan (Emberiza hortulana)

K: Juli 75 mehrere BP bei Lind im Drautal (WWr).
5.7. Nest mit frisch geschl. inv. bei Treßdorf i.Gailtal (MWo).
28.6. Nest in Getreidefeld, 3 5-6 tag Junge, Rattendorf im Gailtal (MWo).
T: 13.6. 1 m. singt bei Inzing (HMR).

Zippammer (Emberiza cia)

K: Brutplatz bei Rechberg erneut bestätigt, neuer Brutplatz am Kreuzbergsattel im Gailtal (11oo m), dort am 5.7. 3 nj. beringt (WWr, JZm, MWo).

Bergfink (Fringilla montifringilla)

St: 29.6.75: In der Nähe des Grebenzenschutzhauses wird ein anhaltend singendes m. beob. (mdl. Mitt. von E.Schwab, Hainstadt, BRD an EHa). Nachsuche am 3.7. erfolglos.

Zitronenzeisig (Serinus citrinella)

T: 11.5. 1 Ex. b. Waldrast (HMR).
V: 25.3.-4.5. fast täglich 1o-15 am Futterplatz, auch singend, Wald am Arlberg (RKi).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Ornithologischer Informationsdienst Folge 23 1-9