

=====
 Herausgegeben von der Österreichischen Vogelwarte, Referat für Faunistik, Postfach 417, A-1014 Wien. Zusammengestellt von Albert Ausobsky, Bernd Leisler (Limicolen) und Karl Mazzucco unter Mitarbeit von Dr. Kurt Bauer und Hans Winkler.

Nur für den persönlichen Gebrauch; gilt nicht als Veröffentlichung!
 =====

Hinweise für die Einsendung von Beobachtungsdaten:

Da in der Zwischenzeit eine Reihe neuer Mitarbeiter mit ihren Daten zu unserem ID beiträgt, seien die Richtlinien wiederholt, nach denen die Einsendungen wenn möglich erfolgen sollen, um den Bearbeitern das Sortieren und Zusammenstellen zu erleichtern. Bitte die Einsendungen auf Zetteln im Postkartenformat (Viertel eines Schreibmaschinenblattes, DIN A 6), vorzunehmen. Für jede Art und jedes Bundesland möge ein separater Zettel verwendet werden. Links oben der Artname, rechts oben das Bundesland (abgekürzt). Das Beobachtungsdatum bitte links herausrücken, rechts daneben den zur Beobachtung gehörigen Text. Rechts unten Name und Adresse des Beobachters (Stempel); falls kein Stempel zur Verfügung steht, genügt es natürlich auch, die Adresse etwa nur auf jedem zehnten Zettel neben den Namen zu setzen.

FRÜHJAHRBERICHT 1968

Die Meldungen, aus denen dieser Bericht zusammengestellt wurde, stammen von:

Abrahamczik, H. (HAb)	Ganso, M. (MGa)	Penz, R. (RPe)
Aschenbrenner, L. (LAsch)	Grims, F. (FGr)	Petz, E. (EPe)
Ausobsky A. (AAu)	Gruber, Dr. F. (DGr)	Reid, Col. J. (JRe)
Billek, A. (ABi)	Hable, OSR Dir. E. (EHa)	Samwald, F. (FSa)
Bittner H. & M. (HMBi)	Haar, H. (HHa)	Scherzinger, W. (WSch)
Blum, V. (VBl)	Hollyer Mr.	Sindelar J. (JSi)
Böck, F. (FBö)	Hrdy A. (AHR)	Spitzer, G. (GSp)
Dangel, M. (MDa)	Jilka, Prof. A.	Straschil, B. (BStr)
Dobler, E. (EDo)	Köck, J. (JKö)	Walter, W. (WWa)
Duda, Dr. E. (EDu)	Lehmann, W. (WLe)	Weber, Dir. W. (WWe)
Erlinger, G. (GEr)	Leisler, B. (BLe)	Weissert, B. (BWei)
Fendrich, W. (WFe)	Lindenthaler, A. (ALi)	Winkler, H. (HWi)
Festetics, Dr. A. (AFe)	Luft, I. (ILu)	Worsfold, Mr.
Firbas W. (WFi)	Mazzucco, K. (KMa)	Woschitz, M. (MWo)
Freundl, Dr. H. (HFr)	Pauler, K. (KPau)	Wotzel, Dr. F. (FWo)
		Wruß, W. (Wwr)

Allen Einsendern sei für ihre Mühe herzlich gedankt!

Eine Reihe von Ankunftsdaten aus Oberösterreich wurde mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Dr. Gerald Mayer den Vogelkundlichen Berichten und Informationen - Ausgabe Oberösterreich - Nr. 78 (VO 78) entnommen.

Für Vergleiche wurde gelegentlich auch der Ornithologische Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 31 herangezogen, was uns Herr Gerhard Knötzsch freundlicherweise in summarischer Form gestattete.

Die auffallendsten avifaunistischen Ereignisse dieses Frühjahres waren:

- der starke Einflug von Seiden-, Nacht-, Rallen- und Purpurreiher in der östlichen Hälfte Österreichs
- der starke Rotfußfalken-Durchzug
- der Einflug der Maskenstelze, *Mot. flava feldegg*.

Von den Zugvögeln kamen die Märzankömmlinge überwiegend normal oder etwas verspätet an, die Aprilankömmlinge fast durchwegs verfrüht.

BEOBACHTUNGENPrachtaucher, Gavia arctica

EPe sah am 25.4. 3 Ex. und am 26.4. 1 Ex. am Klafferteich, Mühlviertel, O, also nur wenige Tage nach der bereits gemeldeten Beobachtung von EHa am Furtner-teich, St.

Haubentaucher, Podiceps cristatus

Durchzugsbeobachtungen: 2.3. 1 Ex. Wasserpark, W (ABi), 10.3. 1 Ex. Donau bei Dschungeldorf, N (AHR), 15.4. 1 Ex. Stürzelwasser, W (HMBi), 2.4. 1 Ex. Obere Halbjochlacke, Seewinkel, B (BStr), 7.4. 1 Ex. Neudauer Teich, St. (BWei)
Ankunft im Brutgebiet: 8.3. 2 Ex. Darscho (GSp), 28.3. 3 Ex. (EDu) und 12.4. 5 Ex. (ABi) Lange Lacke, Seewinkel, B; 17.4. Ankunft am Furtner-teich, St. (EHa).
Bestandszahlen: 28.4. und 5.4. je 13 Ex. Güssinger Teich (FSa, G.Schmidl), 1.5. ca. 300 Ex. vor den Schilfgebieten der Fußacher Bucht, V (VBl), 20.4. 20 Ex. am Neusiedlersee zwischen Breitenbrunn und Oggau, B (Gsp), 28.4. 1 Ex. Bernhardsthaler Teich, Weinviertel, N (ILu), 3.5. 2 Ex. und 4.5. 1 Ex. Klafferteich, Mühlviertel, O (EPe).

Rothalstaucher, Podiceps griseigena

Eine einzige Frühjahrsbeobachtung: 6.4. 1 Ex. im Sommerkleid am Alt-Höll-Teich bei Purbach, Waldviertel, N Eine Kontrolle eine Woche später verlief negativ (MGa).

Schwarzhalstaucher, Podiceps nigricollis

Die ersten Beobachtungen erfolgten später als im Vorjahr:

24.3. 1 Ex. Neudauer Teiche, St (BWei)
24.3. 3 Ex. Fuchslochlacke, Seewinkel, B (HWi)
27.3. 3 Ex. Stausee Gralla, St (FSa)
31.3. ... 2 Ex. Salzige Seen, 2 Ex. Fuchslochlacke, Seewinkel, B (WLe)
Weitere Durchzugs- und Ankunftsdaten: 4.4. 2 Ex. Mühlenerteich, St (EHa), 6.4. 12 Ex. auf den Teichen des Waldviertels, N (MGa), 7.4. 2 Ex. Schönuerteich an Triesterstraße, N (EDu), 8.4. 2 Ex. Furtner-teich, St (Frau Ilse Präsent nach EHa), 11.4. 1 Ex. Neusiedl a.S., B (Gsp), 11.4. 6 Ex. Donau bei Altenwörth, N (FBö), 14.4. 15 Ex. auf den Teichen des Waldviertels, N (MGa), 18.4. 2 Ex. Neudauer Teiche (BWei), 20.4. mind. 4, wahrscheinlich aber 6 Ex. Breitensee b. Marchegg, N (WLe), 20.4. 2 Paare Ochsenbrunnlacke, Seewinkel, B (BLei), 28.4. 6 Ex. Katzelsdorfer Teich, 10 Ex. Bernhardsthaler Teich, 12 Ex. Herrnbaumgartner Teich, Weinviertel, N (ILu).

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis

Am 29.3. traf das erste Brutpaar am Furtner-teich, St ein (EHa).

Kormoran, Phalacrocorax carbo

Durchzug: 17.3. 5 Ex. ad. Ahamer Schlickbänke im Innstauraum Ering-Frauenstein, O (GER, Pammer, Mayer); zwischen 17.3. und 20.4. 1 immat. Ex. in der Hagenauer Bucht, Innstausee Ering-Frauenstein, O; 22.3. 26 Ex. Fußacher Bucht, V (VBl); 7. und 8.4. 12 Ex. Fußacher Bucht, V (VBl); 10.4. 4 Ex. Rohrspitz Bodensee, V (RPe).- Nach dem 10.4. scheint der Zug bis auf einzelne Nachzügler abgeschlossen. Neben dem immat. Ex. am Innstau Ering-Frauenstein sah auch VBl am 1.u.2.5. noch 1 Ex. in der Fußacher Bucht, V
Ankunft in den Brutkolonien: 10.3. bereits 2 Ex. auf den Horsten in der Reiherkolonie bei Marchegg, N (WSch); 10.3. 2 Ex. Orth, N; 8 Ex. Fischamend, N (WLe); 31.3. 2 Ex. Marchegg, N (AHR); 7.4. 3 Ex., 9 Ex. Marchegg, N (AHR); 11.4. 3 Ex. Fischamend, N (JRe).

Fischreiher; Ardea cinerea

Sandinsel Fußach, V: 15.3. 55 Ex., 8.4. 11 Ex., 9.4. 8 Ex., 5.5. 1 Ex (VBl)
Auswahl weiterer Frühjahrsbeobachtungen: 19.3. 11 Ex. Innstausee Schär-
ding bei Reichersberg, O (FGr); 27.3. 1 Ex. fliegt hoch über Schwarzen-
bergallee, W (EDu); 26.4. 1 Ex. Klafferteich, Mühlviertel, O (EPe).

Purpureiher, Ardea purpurea

Die ersten wurden außerordentlich früh beobachtet:

31.3. 1 Ex. an der Feistritz bei Fürstenfeld, St (FSa, HHa)

31.3. ... 1 Ex. Neusiedl am See, B (HWi)

Der nächste wurde im Neusiedlersee-Gebiet erst am 11.4. bei der Vogel-
warte Neusiedl gesehen (GSp), am 13.4. sah ABi am Illmitzer Zicksee
und auf dem Weg zum Sandeck bereits 5 Ex. und am 19.4. flogen abends
8 Ex. in Formation von SW nach NO über die Vogelwarte (BLei).

Wie auch bei Seiden-, Nacht- und Rallenreiher scheint im letzten
Aprildrittel ein stärkerer Einflug erfolgt zu sein, die Art wurde nun
auch in St, K und V beobachtet: 21. bis 27.4. 1 Ex. am Furtnerteich, St
(EHa); 23.4. 1 Ex. Rohrspitz, Bodensee, V (VBl); 26.4. 1 Ex. Fußacher
Bucht, Bodensee, V (VBl); 27.4. 1 Ex. Gurkmündung, Völkermarkter Stau-
see, K (Wwr, Mwo); 5.5. bereits 4 Ex. Fußacher Bucht, V (EDo); 11.5.
1 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Mwo), 3 Ex. ebenda (Mwo)

Silberreiher, Casmerodius albus

Nachtrag zu den Winterbeobachtungen bei Regelsbrunn, N:

Am 23.2. konnte JKö zwischen Regelsbrunn und Haslau 2 Ex. an der Donau
beobachten.-

Im März hielten sich einige Ex. längere Zeit am Kühwörther Wasser in der
unteren Lobau, W auf: WSch sah am 3.3. zweimal je 2 Ex., desgleichen WLe
am 16.3. Zuletzt wurden dort von WFe 3 Ex. am 25.3. beobachtet.

Weitere Feststellungen außerhalb des Brutgebietes am Neusiedlersee: 10.3.
3 Ex. Altwasser der March bei Baumgarten, N (WSch); 31.3. 3 Ex. bei
Schwabegg, K an der Drau (Hemerka und Woschitz nach Wwr); 7.4. 7-8 Ex.
bei Marchegg, N (HMBi), im weiteren zahlreiche Meldungen aus diesem Gebiet
(Ahr, BLei), jedoch nur mehr maximal 4 Ex. gesehen; 15.4. 2 Ex. Fische-
mündung bei Fischamend (Dr. Schiemer nach GSp); 18.4. 1 Ex. Drösing an
der March, N (FBö); 20.4. 1 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Wwr).

Seidenreiher, Egretta garzetta

Eine der auffallendsten avifaunistischen Erscheinungen in diesem Früh-
jahr war der starke Einflug von Seiden-, Nacht-, Rallen- und Purpur-
reihern etwa ab dem 20. April. Wenigstens beim Seidenreiher wird das
Auftreten von Ost nach west deutlich spärlicher und verschiebt sich in
den Mai hinein. Aus dem äußersten Westen, dem Rheindelta, V, wurde von
den Vorarlberger Ornithologen keine einzige Beobachtung gemeldet!

Wie bei den drei anderen Reihern, wurden auch bei dieser Art vor
dem eigentlichen Einflug einige verfrühte Ex. beobachtet:

7.4. 1 Ex. bei Marchegg, N (HMBi); 12.4. 1 Ex. Neusiedl am See, B (Hollyer,
Worsfold); 16.4. 1 Ex. Podersdorf, B (Hollyer, Worsfold); 18.4. 1 Ex.
Neusiedler Teiche, B (HWi).

Niederösterreich: Bei Marchegg auch am 22.4. 1 Ex. (BLei).

Burgenland: 20.4. 1 Ex. ad. Grundlacke, Seewinkel, B (HWi); 26.4. 3 Ex.
Seewinkel (HWi); 28.4. 2 Ex. Güssinger Teich (FSa); 28.4. 2 Ex. Grund-
lacke, Seewinkel (WWa); halten sich von nun ab ständig dort auf (EDu,
MGa, WLe, BLei, VRe, GSp); 29.4. 1 Ex. Purbach (WLe); 12.5. 1 Ex. auf
Weiden in einer Schottergrube vor Illmitz, 1 Ex. Lange Lacke, 2 Ex.
Grundlacke (MGa).

Steiermark: 14. und 21. 5. je ein Ex. Neudauer Teiche (BWei), 16., 17.
und 25.5. je ein Ex. im Schilf des Furtnerteiches (EHa).

Kärnten: 27.4. 6(!) Ex. Völkermarkter Stausee (Mwo, WWr); 5.5. und 7.5. je 1 Ex. ebenda (Mwo), 12.5. 12(!) Ex. ebenda (Mwo); 18. und 24.5. je 1 Ex. ebenda (Mwo); 27.5. 1 Ex. ebenda (Wwr).

Oberösterreich: 5.5. 1 Ex. Hagenauer Bucht, Innstausee Ering-Frauenstein (Pammer nach GER); 5.5. 2 Ex. Reichersberger Staugebiet, Stauraum Schärding-Neuhaus (GER, Pammer); 11.5. 1 Ex. ebd. (GER mit Pointner, Reichholf, Riehm).

Rallenreiher, *Ardeola ralloides*

Auch hier verfrühte Ex.: 5.4. 1 Ex. bei Vogelwarte Neusiedl, B (GSp)
11.4. ... 1 Ex. bei Jois, B (Hollyer, Worsfold)
20.4. 1 Ex. Ostufer des Neusiedlersees südlich Podersdorf, B (BLEi); 21.4. Westufer des Neusiedlersees bei Breitenbrunn, B (BLEi); 28.4. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl, B (GSp); 19.5. 5 Ex. Breitenbrunn, B (HWi).

Kuhreiher, *Ardeola ibis*

Am 24.5. beobachtete BLEi 1 Ex. ad. am Gsigsee, Seewinkel, B. An dem Tier konnten keine Anzeichen einer Gefangenschaftshaltung festgestellt werden. Eine Nachfrage bei der Biol. Station Wilhelminenberg, welche eine größere Anzahl von Kuhreihern in Gefangenschaft hält, ergab, daß diese Tiere zur fraglichen Zeit noch im Winterquartier waren und keine davon die Möglichkeit gehabt hatte zu entfliegen.

Es handelt sich dabei um den ersten sicheren Nachweis in Österreich. In SO-Ungarn allerdings seit 1959 regelmäßige Feststellungen!

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax*

Wiederum eine erstaunlich frühe Beobachtung: 31.3.: 13 Ex. Marchegg, N (Ahr)
Wie bei den anderen Reiherarten stärkerer Einflug ab 20.4.:

20.4. mind. 5 Ex. ad. Breitensee, Marchegg, N (WLe)
20.4. 4 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Wwr)
22.4. 1 Ex. ad. Breitensee, Marchegg, N (BLEi)
26.4. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl am See, B (GSp)
27.4. 1 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Wwr, Mwo)
28.4. 2 Ex. ad. 1 Ex. immat. Breitensee, Marchegg, N (Ahr)

Von der großen Anzahl von Beobachtungen aus dem Mai seien nur die wichtigsten genannt:

4.5. 1 Ex. Weiden; B (GSp); 5.5. 1 Ex. über Schönauer Teich, N (EDu); 5.5. 5 Ex. Völkermarkter Stausee, K, bei Eisenbahnbrücke (Mwo); 11.5. 4 Ex., davon mind 1 ad., Rheindelta, V (VBl, EDu); 11.5. 10 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Mwo); 12.5. 5 Ex. Auerlacke, Seewinkel, B (GSp); 12.5. 7 ad. 1 immat. Marchegg, N (Ahr); 12.5. 16 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Mwo); 14.5. 15 Ex. Sandinsel Fußach, V (VBl); 18.5. ca. 10 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Wwr); 18.5. 1 Ex. Überschwemmungsgebiet der Donau, W (Ahr); 23.5. 4 Ex. Völkermarkter Stausee, K (Mwo); 24.5. 2 Ex. Auerlacke, Seewinkel, B (BLEi); 25.5. 1 Ex. ad. Grundlacke, Seewinkel, B (EDu); 26.5. 8 Ex. ad. 1 immat. Marchegg, N (Ahr); 27.5. 1 immat. Ex. Völkermarkter Stausee, K (Wwr); 30.5. 7 Ex., 2 davon ad., im Wäldchen bei Auerlacke, Seewinkel, B (BLEi, Dr. Szijj).

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus*

Außerordentlich frühe Beobachtungen:

19.4. 1 Ex. bei Breitenbrunn, B gehört (BLEi)
20.4. 1 Ex. bei der Vogelwarte Neusiedl, B (HWi)
28.4. ... 1 Ex. bei der Vogelwarte Neusiedl, B (GSp)

Am Furtner und Mühlener Teich, St stellte EHa Durchzug zwischen 3. und 8. Mai fest. - 1 M am 13.5. im Rheindelta, V (RPe).

Rohrdommel, *Botaurus stellaris*

Am 8.3. 2 Ex. an der Grundlacke, Seewinkel, B, gehört (GSp); ab diesem Zeitpunkt am Neusiedlersee u. im Seewinkel eine größere Anzahl von Beobachtungen.

Weißstorch, Ciconia ciconia

Die ersten Beobachtungen in diesem Frühjahr stammen aus Vorarlberg:

19.3. 2 Ex. Ried bei Dornbirn
20.3. 3 Ex. Weitried Rankweil
30.3. 3 Ex. bei Koblach (alle Daten von EDo).

Die ersten Störche in Ostösterreich:

24.3. 2 Ex. Neudau, St (HHa)
31.3. ... 1 Ex. Marchegg, N (AHR)

Bis Mitte Juni eine ganze Reihe Durchzugsmeldungen aus Oberösterreich, Steiermark und Kärnten: 22.4. bis 14.6. 1 Ex. in und um Braunau, O (GER); 24. und 25.4. 1 Ex. Aigen i. Mkr., O (EPe); 3.5. 15(!) Ex. bei Gubernitz St (EHa); 13.5. 1 Ex. Teufenbach, St (EHa); 14.5. 3 Ex. Mariahof, St (EHa); 16.5. 1 Ex. Ebental b. Klagenfurt, K (MWO); 19. und 22.5. je 9 Ex. Ebental, K (MWO); 24.5. 1 Ex. Klafferteich, Mühlv., O (EPe); 29.5. 6 Ex. Ebental, K, 2 Ex. waren beringt (MWO); 2.6. 2 Ex. St. Peter bei Klagenfurt, K (MWO); 3.6. 1 Ex. Krummauer Moor b. Admünt, St (WWe); 3.6. 9 Ex. bei Mühlheim, O (GER); 9.6. 4 Ex. St. Peter, K (MWO); 14.6. 14(!) Ex. St. Jakob an der Straße, Ebental, K (MWO).

Schwarzstorch, Ciconia nigra

Die ersten Beobachtungen etwa zur gleichen Zeit wie im Vorjahr:

28.4. 1 Ex. über Wulka bei Donnerskirchen, B (HWi)
4.5. ... 1 Ex. St. Michael bei Leoben, St, von S nach N fliegend (WFi).
Bei Hörfeld, Bez. Murau, St, ab dem 6.5. (EHa).
Insgesamt aus dem Frühjahr bedeutend weniger Meldungen als 1967, besonders fiel dies in Marchegg, N, und im Hansag, B, auf.

Löffler, Platalea leucorodia

10.3. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel-B (WWa)
17.3. 15. Ex. N-Ufer der Wörthenlacke, Seewinkel-B (MDa)
Am 3.5. sahen Reichholf und Riehm 1 Ex. auf den Berghamer Schlickbänken, Innstauraum Simbach-Braunau-O; am 4.5. wurde der Vogel ebd. von Pointner bestätigt (Meldung von GER).

Graugans, Anser anser

Ankunft siehe ID 6. Weitere Durchzugsmeldungen:

27.2. 7 Ex. Hagenauer Bucht, Innstau Ering-Frauenstein-O (GER); 2.3. 1 Ex. Stürzellacke-W (ABi); 3.3. 9 Ex. Hagenauer Bucht-O (GER).

Brandgans, Tadorna tadorna

13.3. 2 Ex. Rheinspitz, Gaißau-V (VBl) 14.4. 1 M Albersee, Seew.-B(ABi)
17.3. 2 Ex. ebd. (RPe) 26.4. 1 Sandinsel Fußach-V (VBl)
14.4. ... 1 W Donau bei Fischamend-N (GSp) 23.5. ... 2 Ex. ebd. (VBl)
Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der Beobachtungen wieder leicht zugenommen.

Pfeifente, Anas penelope

Durchzug nur wenig schwächer als im Vorjahr. Stärkerer Zug erst ab 8. März. Seewinkel-B: 6 Daten aus dem März (MDa, MGa, ABi, GSp, HWi), die erste Beobachtung am 8.3. (17 Ex. Götschlacke - MDa), einer der größten in den vergangenen Jahren in Österreich beobachteten Trupps, nämlich 23 M. 19 W.; am 17.3 am N-Ufer der Langen Lacke (MDa). Aus dem April gleichfalls 6 Meldungen (BLei, HWi, Hollyer und Worsfold), maximal am 21.4. 26 Ex. am Oberstinker (BLei). Die letzten Beobachtungen: 2.5 und 4.5. je 2 M. am N-Ufer der Langen Lacke (MDa).
Rheindelta-V : 3 Märzdaten, maximal am 23.3. 5 M. 2 W. auf der Sandinsel Fußach (VBl). Viermal im April beobachtet, am 11.4. mit 3 M. 3 W. das

Pfeifente Fts.

Maximum und gleichzeitig das letzte gemeldete Datum (VBl).

Andere Orte: 27.3. 1 W Kirchberger Mühlteich-St (FSA); 7.4. 1, 1 Ex.

Marchegg-N (Ahr); 20.4. 2,1 Ex. Marchegg-N (WLe); bis 20.4. vereinzelt Ex. auf dem Völkermarkter Stausee-K (Wwr); 21.4. 1, 1 Ex. Hörzendorfer Stausee, Zollfeld-K (WFi); ein Nachzügler hielt sich vom 12.5. bis 3.6. auf dem Furtnerteich-St auf (EHa).

Gleich wie im Vorjahr dauerte der Zug in gleichbleibender Stärke (mit witterungsbedingten Schwankungen) bis zum Ende des 2. Aprildrittels und flaute dann stark ab.

Schnatterente, Anas strepera

Seewinkel-B: 8.3. 21 Ex. an vier Lacken (GSp, Hwi); 22.3. ca. 40 Ex. Fuchslochlacke (Hwi); 23.3. 42 Ex. Oberstinkersee (ABi); 24.3. 217 Ex. auf sieben Lacken (Hwi, ABi); 17.4. 58 Ex. Oberstinkersee (Hwi); 21.4. 41 Ex. auf vier Lacken, darunter Oberstinker (Hwi); - beginnen sich mit Einsetzen des Brutgeschäftes nun wieder zu zerstreuen!

Durchzugsdaten außerhalb des Seewinkels:

17.3. 1,1 Rheinspitz, Bodensee-V (RPe); 13.4. 1,0 Schönau an der Donau-N (EDu); 20.3. 3,3 Marchegg-N (WLe); 21.4. 1,1 Innstausee Obernberg bei Mühlheim-O (FGr); 22.4. 1,1 Marchegg-N (BLEi); 17.5. 2,0 Meiselsdorfer Teich-N (EDu); 23.5. 1,1 Marchegg-N (MGa).

Krickente, Anas crecca

Der Frühjahrszug im Seewinkel-B war deutlich schwächer als im Vorjahr: Hwi sah am 8.3. insg. 147 Ex. auf Gansl- Erdeihof- und Wiesengrundlacke, am 23.3. ca. 130 Ex. am Gsigsee, am 24.3. 78 Ex. an Fuchsloch-, Auer- und Grundlacke; am gleichen Tag zählte ABi ca. 300 Ex. zwischen Sandeck und Apetlon; 82 Ex. hielten sich nach Hwi noch am 21.4. auf Unterstinker, Illmitzer Zicklacke, Alber- und Kirchsee auf.

Auch anderswo war der Durchzug schwach, nur wenig Meldungen liegen vor: 19.3. 5,5 Innstausee Schärding-O bei Reichersberg (FGr); 7.4. 1,1 Donau-Altarm zwischen Spillern und Korneuburg-N (FBö); 26.4. 20 Ex. Fußacher Bucht-V (VBl); 21.4. 1 Ex. Breitenbrunn-B (BLEi).

Spießente, Anas acuta

Bodensee-V: 17.3. 4,4 Rheinspitz (RPe); 19.3. 5,4 Fußacher Bucht (RPe); 10.4. 10 Ex. Fußacher Bucht (KMa, Hwi); 26.4. 1,1 ebd. (VBl).

Seewinkel-B: 8.3. 3,3 Ex. Wiesengrund, 0,1 Salzige Seen (Hwi); 24.3. 7 Ex. Fuchsloch-, 2,1 Grundlacke (Hwi); 28.3. 1 Ex. Illmitzer Zicksee (EDu);

14.4. 2,2 Illmitzer Zicksee (Hollyer & Worsfold); 21.4. 2,0 Illmitzer Zicksee (Hwi), 3,3 Wörthenlacke (BLEi).

Weiters noch am 31.3. 1,0 Ex. und am 7.4. 1, 1 Ex. Marchegg-N (Ahr); 20.4. 0,1 Ex. Neusiedler Teich-B (BLEi).

Knäkente, Anas querquedula

Ankunft etwa 10 Tage später als im Vorjahr:

3.3. 1,1 Ex. Leopoldsteinersee-St (WWe)

8.3. 6 Ex. bei Zeiselmauer-N (KPau)

8.3. 8 Ex. an Gansl- Wiesengrundlacke und Salzigen Seen (Hwi), 2,2 Ex. Grundlacke, Seewinkel-B (GSp).

10.3. ... 2,2 Ex. Donau zwischen Haslau und Orth-N (WLe)

Weitere Daten: 15.3. 1,0 Rohrspitz, 7,3 Hard, Bodensee-V (VBl); 17.3.

8 Ex. Altenwörth-N auf Donau (FBö); 21.3. 9 Leopoldsteinersee-St (WWe);

24.3. ca. 400 zwischen Sandeck und Apetlon (ABi); 72 Ex. auf fünf weiteren Lacken des Seewinkels-B (Hwi); 5.4. ca. 100 Ex. insgesamt im Rheindelta-V (VBl); 6.4. 5,5 Laxenburger Teich-N (EDu); 14.4. 4 auf Donau bei

Petronell-N (FBö); 1,1 Donau bei Fischamend-N (GSp); 20.4. ca. 600 Ex.

Neusiedlersee bei Purbäch-B (GSp); 20.4. 2,0 Völkermarkter Stausee-K

(Wwr); 20.4. 9,4 Ex. Marchegg-N (WLe); 21.4. 5,5 Innstausee Obernberg bei

Mühlheim-O (FGr).

Das Durchzugsmaximum war ähnlich wie im Vorjahr Ende März - Anfang April, insgesamt war jedoch der Zug schwächer, was auch von einigen Beobachtern besonders hervorgehoben wird.

Löffelente, *Anas clypeata*

Auch bei dieser Art wie schon bei Krick-, Spieß- und Knäkenente verhältnismäßig schwacher Frühjahrszug. Die ersten im Seewinkel-B später als im Vorjahr: 8.3. 11 Ex. an drei Lacken (GSp, HWi); 24.3. erst 19 Ex. an vier Lacken (HWi); 18.4. 18,18 am Illmitzer Zicksee, Südteil und 4,6 auf der Podersdorfer Lacke; drei Tage später, am 21.4. 44 auf fünf Lacken (HWi).

Meldungen von außerhalb des Seewinkels: 14.4. 3,2 Donau bei Fischamend-N (GSp); 21.4. Ankunft am Mühlenerteich-St (EHa); 20.4. 3,2 Marchegg-N (WLe); 20.4. 2,2 Rheindelta-V (RPe); 22.4. 2,2 Marchegg-N (BLei); zwischen 8. und 10.5 1,0 am Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe).

Kolbenente, *Netta rufina*

17.3. 1,2 Ex. Rheinspitz, Bodensee-V (RPe), erste Beobachtung in diesem Frühjahr.

Zwischen 10.4 und 11.5. von VBl fünfmal in wechselnder Anzahl im Rheindelta beobachtet (am 27.4. 5,1 Ex., am 11.5. 15,0 Ex.).

Von außerhalb des Bodenseegebietes nur eine einzige Meldung: 12.5. 1,0 Ex. Nordufer der Langen Lacke, Seewinkel-B (BLei).

Tafelente, *Aythya ferina*

Durchzugsmaximum Ende März, bis Ende April langsames Abflauen des Zuges. Kärnten: 10.3. 1 Ex. Feistritzer Stausee (WWr)

Steiermark: 12.4. 2,2 Furtnernteich (EHa); 23.4.-1.5. 1,1 ebenda (EHa).

Burgenland (Auswahl): 7.3. 20 und 22.3. 56 Auerlacke, Seewinkel (HWi)

Niederösterreich: 10.3. 10,2 Ex. (ABi), 20.3. 20 Ex. und 6.4. 6 Ex.

(EDu) Laxenburger Teich; 23.3. 2,3 Altarm der Donau bei Schönau (MGa);

18.4. 3,0 Altarm der March bei Dürnkrot (FBö); 19.4. ca. 20 Ex. (FBö)

und 20.4. 12,7 (WLe) Marchegg; 28.4. 10 Herrnbauimgartner Teich, ca. 50 (2 Drittel MM) Wolfsteich und 2 Katzelsdorfer Teich sowie 10+3 am

Bernhardsthaler Teich, weinviertel (ILu).

Oberösterreich: 27.3. 1,1 Ziegelteich von Schlägl Mühlviertel (EPe);

31.3. 30 Stausee Thalling bei Steyr (WFi).

Moorente, *Aythya nyroca*

Die erste Beobachtung bereits am 8.3.: 1 Ex. Fuchslochlacke, Seewinkel-B (GSp). Die Hauptmasse traf wie üblich erst im Verlauf des April im Brutgebiet ein, der Zug dauerte bis zum Ende des ersten Maidrittels.

Neusiedlersee-B (Auswahl): 17.4. 12 bei Rust (Hollyer, Worsfold); 18.4.

2 Breitenbrunn (GSp); 20.4. 6 Purbach, 2 Neusiedl (BLei); 21.4. 4 bei Breitenbrunn (BLei).

Marchegg-N: 31.3. 3 (AHR), 7.4. 5 (AHR), 22.4. 6-7 (BLei), 28.4. bis 12.5. 1 (AHR).

Weiters noch zwei Meldungen aus der Steiermark: 20.3. 6 Neudauer Teiche (BWei); vom 4.4. bis 20.4. auf dem Mühlener Badeteich, Bez. Murau (EHa).

Reiherente, *Aythya fuligula*

Das Durchzugsmaximum wird später als bei der Tafelente erreicht, erst vom letzten Märzdrittel an bis zum 20.4. war starker Durchzug festzustellen.

Kärnten: 10.3. 2,2 am Feistritzer Stausee (WWr)

Steiermark: 27.3. 1,2 Stausee Gralla (FSa); 9.4. und 20.4. je 1,1 Neudauer Teiche (BWei).

Burgenland: Im Seewinkel die meisten Beobachtungen auf der Fuchslochlacke, dort am 8.3. 2,2 (GSp), am 24.3. 24 (HWi), am 1.4. 3,3 (BStr) und am 30.5. 7,2 (BLei, Dr. Szijj). Am 20.4. sah GSp 28 auf dem Neusiedlersee bei Purbach.

Reiherente Forts.

Niederösterreich: Bei Marchegg am 31.3. ca. 30, am 7.4. 32 (etwa die Hälfte MM) (AHR); 20.4. 20,14 (wLe), 22.4. 6 (BLEI), 28.4. 7,4; 5.5. 5 und am 12.5. 0,1 (AHR) - die letzte Beobachtung an diesem Platz. -

Im Brutgebiet auf den Waldviertler Teichen am 6.4. insgesamt 17, vom 10. bis 14.4. im gleichen Bereich 22 (MGa). - Weiters am 25.4. 2 auf dem Laxenburger Teich (EDu) sowie am 28.4. 2,0 Katzelsdorfer und 6+2 Bernhardsthaler Teich, Weinviertel (ILu).

Oberösterreich: 19.3. 180 Innstausee Schärding bei Reichersberg (FGr); 31.3. ca. 100 auf dem Stausee Thalling bei Steyr (WFi); 21.4. 6,4 am Innstausee Obernberg (FGr); vom 3. bis 9.5. 1,0 auf dem Klafferteich, Mühlviertel (EPe).

Bergente, Aythya marila

Nachtrag zum ID 6: Hwi sah am 24.3. 1,2 auf der Fuchsloch- und 0,1 auf der Stundlacke, Seewinkel-B.

Schreiadler, Aquila pomarina

Die erste Frühjahrsbeobachtung diesmal aus Marchegg-N: BLEI sah am 24.3. 1 ad. über den Sumpfwiesen auf der tschechischen Seite der March. Im Hansag-B wurden die ersten am 19.4. (GSp), 20. und 26.4. (Hwi) beobachtet (je 1 Ex.).

Besonderes Interesse verdienen einige Feststellungen im Bereich des Bodensees-V: am 31.5. hielten sich 2 im Dornbirner Ried auf, 1 immat. wurde am 2.6. im Lauterracher Ried gesehen und am 9.6. zog 1 Ex. über Bregenz (alle Daten von VBl).

Rotmilan, Milvus milvus

4.3.	1 Ex. Wolfurter Ried-V (RPe)	20.4.	1 Ex. Hansag b. Andau (Hwi)
13.4.	1 Ex. Fußacher Bucht-V (VBl)	2.6.	2 Ex. Lauteracher Ried-V (VBl)

Schwarzmilan, Milvus migrans

Es fehlen Frühbeobachtungen wie 1967 (vgl. ID 3). Die ersten Daten: 23.3. ... 2 Ex. Lobau-W (wLe) 31.3. ... 2 Kuppenberg b. Götzis-V (VBl). Um Mitte April bereits zahlreiche Meldungen aus dem Auengebiet der Donau in Niederösterreich und von der March sowie mehrere Feststellungen im Rheindelta. Am 1.5. 1 Ex. in der Hölle, Seewinkel-B (EDu).

Seeadler, Haliaeetus albicilla

Nachtrag zu ID 6: Nach dem 10.2. noch zweimal beobachtet: am 18.2. sah FBö 1 Ex. über dem Weingartlwasser zwischen Zwentendorf und Traismauer-N und zuletzt stellte JKö am 23.2. 1 Ex. zwischen Regelsbrunn und Haslau-N fest.

Wespenbussard, Pernis apivorus

Ankunft: 26.4.: 1 Ex. Andauer Hansag-B (Hwi) 27.4.: 1 Ex. Breitenbrunn-B (GSp)
26.4.: 1 Ex. Lauteracher Ried-V (VBl) 30.4.: 1 Ex. Mariahof-St (EHa)
Am 3., 15. und 21.5. je 1 Ex. im weitried Rankweil-V (EDo); 10.5. 2 Lauteracher Ried-V (RPe); 11.5. 1 bei Engelsdorf-N, 1 beim Meiselsdorfer Teich-N (EDu); 12.5. 3 kreisen über der Straße nach Pulkau bei Eggenburg-N (EDu).

Rohrweihe, Circus aeruginosus

Die ersten Meldungen von außerhalb des Neusiedlersee-Gebietes:

17.3.	1 Ex. Donau bei Fischamend-N (GSp)
18.3.	1 Ex. Fußach-V (VBl)
19.3.	1 M Rohrspitz, Rheindelta-V (VBl)
21.3.	1 M nördlich Zurndorf-B (JRe)
23.3.	2 W Fußacher Bucht-V (VBl)

Insgesamt: 7 Ex. in der zweiten Märzhälfte
 13 Ex. im ersten Aprildrittel
 1 Ex. (!) im zweiten Aprildrittel
 5 Ex. im dritten Aprildrittel
 5 Ex. im Mai (bis 11.5.: 1 M Fußacher Ried -EDo- beobachtet
 - ohne Neusiedlersee-Daten!)

Auswahl: 9.4. 2,3 Fußacher Bucht-V (VB1); 9.4. 1,0 Mühlleiten-N (FBö);
 9.4. 0,1 Völkermarkter Stausee-K (WWR); 24.4. 0,1 Neudauer Teich-St
 (FSa); 28.4. 1,0 Wolfsteich, weinviertel-N (ILu); 5.5. 0,1 Marchegg-N
 (AHR); alle übrigen Daten aus dem Rheindelta (VB1, EDo, RPe).

Im Bereich des Neusiedlersees-B eine frühe Beobachtung bereits am
 8.3.: 1 M Neusiedl am See (GSp); am 23.3. zählt ABi an mehreren See-
 winkel-Lacken bereits insges. 10, tags darauf am Ostufer des Sees
 zwischen Apetlon und Sandeck. 6-7.

Wiesenweihe, Circus pygargus

Ankunft im Brutgebiet: 16.4. 1 M bei Neusiedl-B, desgleichen am 17.4. (HWi);
 am 19.4. 1 W im Andauer Hansag-B, am 21.4. 1 W im Tadtener Hansag (GSp).
 Zugbeobachtungen: 25.4. 1 M Weitried Rankweil-V, desgleichen am 27.4.
 (EDo); 27.4. 1 W welches am 1.7.66 in Schleswig-Holstein beringt wor-
 den war, im Lauteracher Ried-V abgeschossen! (RPe); 4.5. 1 M Götsch-
 lacke, Seewinkel-B (WLe); 11.5. 1 M Fußacher Ried-V (EDo).

Fischadler, Pandion haliaetus

Die ersten Meldungen stammen alle aus Ostösterreich:

24.3.: 1 Marchegg-N (BLEi) 30.3.: 1 Illmitzer Zicksee-B (MGa)
 24.3.: 1 bei St. Andrä, Seew.-B (WSch) 31.3.: 1 Neudorf b. Ilz-St (HHA, FSa)

Erstes Aprildrittel 7

Zweites " 10

Drittes " 2

Erstes Maidrittel 2

Am 1.4., 5.4., 9.4., 12.4., 19.4. und 20.4. je 1 Ex. an den Neudauer
 Teichen-St (BWei); 4.+5.4. 1 Fußacher Bucht-V (VB1); 8.4. 1 Furtner-
 teich-St (EHa); 10.4. 1 Altenwörth-N (FBö); 11.4. 1 Fischamend-N (JRe);
 11.4. 1 Lauteracher Ried-V (VB1); 12.4. 2 Neusiedl a.S.-B (GSp); 14.4.
 1 Maria Ellend-N (EDu); 14.4. 1 Winkelauer Teich, Waldviertel-N (MGa);
 15.4. 1 Allersteig-N (MGa); 21.4. 1 Lauteracher Ried-V (RPe); 21.4.
 1 Lobau-W (ABi).

Die letzten Beobachtungen: 4.5.: 1 Innstausee Schärding-O (FGr)
 11.5.: 1 Meiselsdorfer Teich-N (EDu)
 2.6.: 1 immat. Althöllteich-N (MGa)

Baumfalke, Falco subbuteo

7.4. 1 Schönauer Teich-N, Triesterstraße (EDu)

14.4. 1 Lauteracher Ried-V (V^{D1})

21.4. 1 Hansag-B (BLEi)

27.4. 1 Lauteracher Ried-V (RPe)

27.4. 2 Hainburger Berge-N (FBö)

28.4. 1 Illmitzer Zicklacke, Seewinkel-B (GSp)

Die Meldungen häufen sich erst in der zweiten Maihälfte.

Rotfußfalke, Falco vespertinus

Der starke Durchzug dieser Art war neben der Reiher-Invasion eine der
 auffallendsten Erscheinungen im Frühjahr 1968. Nicht weniger als 70 Ex.
 - gegenüber 7 im Vorjahr! - wurden uns gemeldet.

Der Zug setzte in ganz Österreich ziemlich schlagartig ein, in der
 ersten Woche wurden nur MM gesehen:

22.4.: 1,0 Mariahof-St (EHa) 25.4.: 1,0 Weitried Rankweil-V (EDo)
 23.4.: 1,0 Rohrspitz, Rheindelta-V (RPe) 26.4.: 2,0 Neudorf b. Ilz-St (HHA)
 23.4.: 1,0 Furtnersteich-St (EHa) 27.4.: 1,0 Weitried Rankweil-V
 " " 1,0 Fußacher Ried-V (beide
 EDo)

Rotfußfalke Forts.

27.4.:1,0 Vogelwarte Neusiedl-B (HWi) 28.4.:1,1 Oggauer Heide-B (MDa,WLe)
 27.4.:1,0 bei Oberweiden-N 28.4.:0,1 Marchegg-N (Ahr), die
 :1,0 bei Marchegg-N (beide KMa) ersten Ww!
 Weitere Beobachtungen: 30.4. und 3.5. je 1,0 Oggauer Heide-B (WLe);
 3.5. 1,1 Weitried, Rankweil-V(EDo); 4.5. 0,1 Götschlacke, 0,1 Lange
 Lacke, Seewinkel-B (MDa,WLe); 5.5. 1,0 Marchegg-N (Ahr); 10.5. 1,0 Sand-
 insel Fußach-V (VBl).

Nach einer Pause von etwa einer Woche wird in der zweiten Maihälfte eine
 zweite Durchzugswelle beobachtet, wobei um den 20.5. innerhalb von drei
 Tagen größere Trupps auftreten:

17.5.:1,0 Lauteracher Ried-V(VBl) 21.5.:3,1 Weitried, Rankweil-V(EDo)
 19.5.:1,1 ebd. (VBl) 21.5.:6 Ebental-K (Mwo)
 19.5.:4,1 Furtnerteich-St (EHa) 22.5.:1,2 Auerlacke, Seewinkel-B(GSp)
 19.5.:4,4 Gr. Petersdorf-B (MGa) 22.5.: 4 Ebental-K (Mwo)
 19.5.:3 Ebental b. Klagenfurt-K(Mwo)

Nummehr bis Mitte Juni wieder Abflauen des Zuges:

23.5. 1,1 Weitried, Rankweil-V (EDo); 24.5. 1,0 Furtnerteich-St (EHa),
 30.5. 1,1 Seewinkel-B (BLEi; Dr. Szijj); 11.6. 0,1 Fürstenfeld-St (FSa);
 13.6. 2,1 Altenmarkt-Riegersdorf, Bez. Fürstenfeld-St (FSa).

Rötelfalke, Falco naumanni

Das erste Ex. am 9.4. bei Grafenstein-K (WWR); am 18.4. 1 M Rosental bei
 Hollenburg-K (WFi).

Turmfalke, Falco tinnunculus

Am 9.3. Ankunft in Mariahof-St (EHa).

Wachtel, Coturnix coturnix

22.4. 1 schlägt bei Marchegg-N (BLEi)
 25.4. 1 " bei Fürstenfeld-St (FSa)
 1.5. 1 " im Lauteracher Ried-V (RPe)
 3.5. 7 rufen im Raum Meiningen-Koblach-V desgl. am 21.5. (EDo)
 13.5. erster Wachtelschlag bei Frojach-St (EHa)
 Zwischen 28.5. und 7.6. hörte Blei über dem 18. Wiener Bezirk achtmal
 Wachtelschlag, und zwar jeweils nachts zwischen 2330 und 0147 h.

Kranich, Grus grus

Am 12.4. beobachtete MGa 7 ad. und 1 immat. bei Zurndorf-B auf Feldern
 an junger Saat fressend.

Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana

8.4. 1 Fußacher Bucht-V (VBl) desgl. am 10.4. (KMa, HWi)
 18.4. 2 rufen bei den Neusiedler Teichen-B (HWi)

Kleines Sumpfhuhn, Porzana parva

1 Ex. am 8.4. bei der Vogelwarte Neusiedl-B (GSp). 2 rufende am 20.4. bei
 Neusiedl-B (HWi).

Wachtelkönig, Crex crex

28.4. 1 Lauteracher Ried-V (RPe)
 28.4. 1 Lobau bei Mühlleiten-N(WFi)
 3.5. 4 rufen im Raum Meiningen-Koblach-V; dies stellte offenbar
 schon den vollständigen Brutbestand dar, weil am 21.5.
 ebensoviele festgestellt wurden (EDo).
 Am 9.5. hörte BLEi 1 Ex. bei Baumgarten an der March-N rufen.

Teichhuhn, Gallinula chloropus

Ankunft am Furtner-teich-St am 28.3. (EHa).

Bläßhuhn, Fulica atra

Nachtrag zum Winterbericht: Ähnlich wie in der Stadt Salzburg, steigt auch am Leopoldsteinersee-St die Zahl der Überwinterer von Jahr zu Jahr an. Sie betrug 1964-65 4 Ex., 1965-66 8 Ex., 1966-67 17-19 Ex. und 1967-68 32 Ex.; es erfolgte also von einem Winter zum anderen jeweils eine Verdoppelung.

Austernfischer, Haematopus ostralegus

Westösterreich: Am 28.5. 1 auf der Sandinsel Fußach-V (VB1.); diese Beobachtung paßt phänologisch gut in die Häufungsperiode der Beobachtungen aus Süddeutschland.

Ostösterreich: Bereits am 7.4. 1 an den Neudauer Teichen-St (BWei), was gut die weitgehende Unabhängigkeit des Auftretens dieser Art am Bodensee und am Westrand des Karpathenbeckens herausstreicht.

In Ungarn tritt besonders häufig die Rasse longipes auf ihrem transkontinentalen Zug oder vom Schwarzen Meer her die Donau aufwärts auf, während dort ostralegus erst einmal festgestellt werden konnte. Die Verhältnisse in Österreich können allerdings nur mit Hilfe von Belegexemplaren geklärt werden.

Kiebitz, Vanellus vanellus

Über Einsetzen des Frühjahrszuges siehe ID 6. Dazu sei noch die Ankunft am Furtner-teich-St nachgetragen: am 25.2. 25 Ex. (EHa).

Weitere Zugdaten:

3.3. ca. 50 St. Valentin-N (GSp); 5.3. 88 Weitried Rankweil-V (EDo); 7. bis 11.3. 3-5 bei Eisenerz durchziehend, St.; 10.3. 7 über Schlägl, Mühlviertel-O fliegend (EPe); 10.3. ca. 100 bei Herzogstuhl am Zollfeld-K (WWR), 12.3. ca. 1100 Höchster Ried-V (VB1); 14.3. ca. 300 und 15.3. bis zu 1000 Zeiselmauer-N (KPau); 15.3. ca. 700 Höchster Ried-V, hier ist also der Höhepunkt des Zuges schon überschritten (VB1); 17.3. ca. 500 zwischen Laxenburg und Münchendorf-N, 150 zwischen Münchendorf und Ebreichsdorf-N (HWi); 17.3. ca. 45 bei Krems-N fliegend (WSch); 19.3. ca. 90-100 bei Guttendorf-K (WWR); 20.3. nur mehr 100 Ex. im Weitried Rankweil-V (EDo); 21.3. 26 über Aspern-W ziehend (LAsch); 22.3. ca. 300 Höchster Ried-V (VB1); 25.3. ca. 30 Zeiselmauer-N (KPau) - Ende des Zuges.

Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula

Aus März und April meist Daten aus der Umgebung des Neusiedlersees:

9.3. 1 Lange Lacke (WLe)	10.4. 9 Gansllacke (MGa)
23.3. 1 Sandinsel Fußach-V (VB1)	20.4. 1 Grundlacke (BLEi)
29.3. 1 Grundlacke Seew. (BLEi)	21.4. 1 Illmitzer Zicksee (HWi)
9.4. 4 bei Podersdorf (MGa)	

Ab 5.5. im Seewinkel-B stärkere Zunahme: an diesem Tag am Illmitzer Zicksee 13 Ex. (GSp). Mit 29. Ex. am 13.5. und 27 Ex. am 24.5. (BLEi) sind die Maxima erreicht.

Im Bodenseegebiet mit einer Ausnahme nur Mai-Juni-Beobachtungen (VB1, EDo). Von 14 Meldungen seien die Maxima: 23.5. 9 Sandinsel Fußach und 11.6. 6 ebenda (VB1) genannt.

Außerhalb dieser Gebiete nur zwei Beobachtungen: 23.5. 1 Neudauer Teiche St (BWei) und 27.5. 1 Gurkmündung, Völkermarkter Stausee-K (WWR).

Flußregenpfeifer, Charadrius dubius

Erstankunft: 17.3. 2 am Ufer der Langen Lacke, Seewinkel-B (MDa)

19.3. 2 auf Kiesbank im Rhein bei Fußach-V (VB1)

Am 24.3. bereits 9 auf der Grundlacke, Seewinkel-B (HWi). Hauptdurch-

Flußregenpfeifer Forts.:

zug Ende April- Anfang Mai. Maxima: 18.4. 12 Gañsllacke, 3 bei Podersdorf (Hollyer, Worsfold), 4 Illmitzer Zicksee, 1 Albersee, Seewinkel-B (HWi); 1.5. 10 Grundlacke. 15.5. 15 ebenda (EDu). Außerhalb von Seewinkel und Rheindelta: 28.3. 1 bei Fürstenfeld-St (FSa), 4.4 erste Beobachtung am Mühlener Teich-St (EHa), vom Beobachter gegenüber anderen Jahren als auffallend früh vermerkt; 5., 12. und 21.4 je 1 Neudauer Teiche-St (Bwei); 7.4. 2 Schönauer Teich, Triesterstraße-N (EDu); 26.4. 2 Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe); 28.4. 3 Bernhardsthaler Teich N (ILu); 12.5 1 Schloß Hainfeld-St und 28.5. 1 Paar Obgrün bei Ilz-St(HHa).

Seeregenpfeifer, Charadrius alexandrinus

Ankunft im Brutgebiet Seewinkel-B:

17.3. 1 M Nordufer der Langen Lacke (MDa). Am 23.3. bereits 16 am Gsigsee (HWi) sowie am 21.4. 21 am Kirchsee (HWi); diese beiden Lacken gehören zu den bedeutendsten Brutplätzen im Gebiet.

Im Rheindelta von Mitte April bis Ende Mai - Anfang Juni durchgehend beobachtet (VBl, EDo, RPe). Hervorzuheben: 21.4. 2 Sandinsel Fußach (EDo), 2.5. 3,1 ebenda (VBl).

Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus

Eintreffen im Brutgebiet in der Steiermark am 24.5. (EHa).

Kiebitzregenpfeifer, Pluvialis squatarola

Wie im Vorjahr kurzer Durchzug zwischen 11.5. und 31.5. An acht Tagen im Rheindelta-V beobachtet, nur dreimal im Seewinkel-B; maximal 2 zusammen (VBl, EDo; EDu, BLei, HWi).

Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria

Die ersten Beobachtungen: siehe ID 6. Darnach nur mehr im Rheindelta-V beobachtet: 17.3. 4 Höchster Ried (VBl); 30.3. 4 im Lauteracher Ried (EDo); 9.4. 3 Höchster Ried (Vbl); 21.4. 2 Sanddelta (EDo); 24.4. 1 mit verletztem Bein im Dornbirner Ried (RPe).

Steinwälzer, Arenaria interpres

Nur wenig Beobachtungen: 4.5. und 14.5. je 1 Sandinsel Fußach-V; (VBl, RPe) nach GSp am Darscho, Seewinkel-B 1 am 2.6.

Bekassine, Gallinago gallinago

Stärkerer Zug erst ab dem zweiten Märzdrittel (1.3. 1 Zeiselmauer-N, KPau; 10.3. 3 Wolfurter Ried-V, RPe; 10.3. 1 Altwasser bei Schönau a.d. Donau-N (EDu); dauert bis um den 20.4. (Meldungen vom Neusiedlerseegebiet-EDu, BLei, WSch; von den Innstauseen - Fgr; aus den Marchauen-N FBö), gewöhnlich nur kleine Trupps, nur am 23.3. 15 am Gsigsee, Seew.-B (HWi).

Waldschnepfe, Scolopax rusticola

Durchzug in der Donau-Au bei Zeiselmauer-N, ähnlich wie im Vorjahr zwischen 12.3. und 27.3.; in dieser Zeit achtmal 1-2 beobachtet, drei Abschüsse (KPau).

Brachvogel, Numenius arquata

Zugbeobachtungen: 19.3. 3 bei Reichersberg-O, Innstausee Schärding, von S nach N fliegend (Fgr); 31.3. 3 bei Marchegg-N (AHR). Im Seewinkel-B am 8.3. 11 (BLei) und am 17.3. 32 (MDa) jeweils am N-Ufer der Langen Lacke sowie zahlreiche weitere Beobachtungen kleinerer Trupps. Rheinebene-V (Brutgebiet): 2.3. 4 Lauteracher Ried (RPe), Ankunft!

Regenbrachvogel, Numenius phaeopus

Ungewöhnlich starker Frühjahrszug, Meldungen vom Rheindelta-V, von den Innstauseen-O und aus dem Seewinkel-B. Die ersten Daten:

4.4. 1 Hagenauer Bucht Innstau 8.4. 1 Fußacher Bucht-V (VBl)
 Ering-Frauenstein-O (GER) 10.4. 3 Sandinsel Fußach-V (VBl)
 5.4. 2 ebenda (GER)

Im Rheindelta und an den Innstauseen ab 11.4. ein starker Durchzugsgipfel (11.4. 5 Hagenauer Bucht - GER; 11.4. 11 Sandinsel Fußach - VBl), welcher nach zwei Tagen wieder abflaut (am 13.4. noch 1 Hagenauer Bucht - GER - sowie gegen 30 im Rheindelta - OR). Eine zweite, viel schwächere Durchzugswelle ist im Rheindelta zwischen 27.4. und 28.5. mit dem Maximum im ersten Maidrittel zu beobachten (VBl, EDo, RPe). Erst diese zweite Welle bringt die ersten Beobachtungen im Seewinkel-B, u. zw. beginnt dort der Zug unvermittelt stark:

21.4. 62 am N-Ufer der Langen Lacke (AFe), 1 Schwarzsee (FBö).
 Weiters am 28.4. 8-10 Lange Lacke (AFe), 2 Illmitzer Zicksee (GSp); 2.5. 21 und 2 am N-Ufer der Langen Lacke (MDa, WLe); 3.5. 2 Lange Lacke, 3 Grundlacke; 4.5. 5 Lange Lacke (MDa, WLe); 5.5. 3 und 6.5. 1 am Unterstinker (GSp); 9.5. 4 bei der Auerlacke fliegend (JRe); dies war gleichzeitig die letzte Seewinkel-Beobachtung in diesem Frühjahr; zeitlich gut damit zusammenpassend waren im Rheindelta zuletzt am 11.5. 4 beobachtet worden, danach bis zum 28.5. dort nur mehr Einzelexemplare (VBl).

Uferschnepfe, Limosa limosa

Seewinkel-B:

8.3. 1 Lange Lacke (BLei) 9.3. 8 Lange Lacke (MDa)
 Stärkerer Zug aber erst vom 17.3. an: 17.3. 35 an der Langen Lacke (MDa);
 24.3. ca. 100 Kirchsee (ABi); 28.3. ca. 100 Götschlacke (EDu); 30.3.
 45 Illmitzer Zicksee (MGa); 31.3. mind 52 östlich der Wörthenlacke (HWi).
 Rheindelta-V:

Eine sehr frühe Beobachtung ist im OR 31 genannt: 2.3. 3 Ex.
 Die regelmäßigen Beobachtungen beginnen erst ab 27.3. Am 30.3. bereits 23 im Dornbirner Ried (EDo, RPe); 3.4. 19 Fußacher Bucht, 7.4. 37 im Gaißauer Ried; 8.4. 54, 9.4. 56 und 13.4. 70 in der Fußacher Bucht (alle VBl); am 23.4. noch 40 auf der Sandinsel (EDo), dann starker Rückgang.
 Andere Gebiete:

21.3. ca. 30 bei Zurndorf-B (JRe); 24.3. 2 Wallersee-S (Fwo); 15.4. 1 Schloß Hainfeld, 1 Kirchberger Teiche St, (HHa, FSa). 19. bis 21.4. 2 Neudauer Teiche-St (Bwei); 28.4. 1 Bernhardsthaler Teich-N (ILu).

Pfuhschnepfe, Limosa lapponica

Nur zwei Beobachtungen: 28.4. 1 Grundlacke, Seewinkel-B (WWa); 11.5. 1 Sandinsel Fußach-V (VBl, EDo).

Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus

Ankunft ähnlich wie im Vorjahr:

24.3. 1 Darscho, Seewinkel-B (HWi) 29.3. 1 Podersdorfer Lacke-B (BStr)
 26.3. 1 Parndorf-B (KMa) 1.4. 1 Holdenlacke, Seewinkel-B (BStr)
 Stärkerer Zug jedoch erst ab Mitte April, die Daten kommen nun aus ganz Österreich: 10.4. 1 Sandinsel Fußach-V (VBl); 19.4. 4 Schloß Hainfeld b. Feldbach-St (FSa); 19. bis 27.4. 2-6 Neudauer Teiche-St (Bwei); 21.4. 1 Innstausee Obernberg-O (FGr); 21.4. 72 an zehn Lacken des Seewinkels -B (BLei, HWi); 22.4. bis 5.5. stets etliche am Furtner- und Mühlenerteich St (EHa); 26.4. 1 Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe); 27.4. 1 Völkermarkter Stausee-K, Gurkmündung (Wwr); 28.4. 1 WallerseeS(Fwo); 28.4. ca. 10 Güssinger Teiche-B (FSa); 28.4. 1 Schloß Hainfeld-St (FSa); 28.4. 3 Bernhardsthaler Teich-N (ILu); 1.5. 4 Güssinger Teiche-B (FSa); 4.5. 13 Grundlacke Seewinkel-B (GSp); 5.5. 1 Marchegg-N (Ahr); 5.5. 6 Bernhardsthaler Teich-N (MGa); 8.5. 4 Sandinsel Fußach-V (EDo); 8.5. 4 Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe).

Rotschenkel, *Tringa totanus*

Ankunft: 8.3. 1 Lange Lacke (BLEi), 1 Grundlacke (GSp), Seew.-B
9.3. 1+3 Lange Lacke, Seewinkel-B (MDa)
15.3. 4 Sandinsel Fußach-V (VB1).

Am 17.3. balzten bereits 5-6 an der Langen Lacke, Seewinkel-B (MDa).
Durchzugsdaten: 3.4. 7 Sandinsel Fußach-V (VB1); 12.4. 2 Neudauer Teiche
St (BWei); 23.4. bis 3.5. täglich am Furtner- und Mühlener Teich-St
(EHa); 28.4. 1 Wolfsteich, 1-2 Bernhardsthaler Teich, Weinviertel-N
(ILu); 1.5. 1 Güssinger Teich-B (FSa mit G.Schmidl); im Rheindelta-V bis
10.5. 1 Ex. (VB1).

Grünschenkel, *Tringa nebularia*

Ankunft wie im Vorjahr: 24.3. 1 bei Apetlon-B (ABi)
27.3. 1 Sandinsel Fußach-V (VB1), desgleichen
am 31.3. und 3.4. (VB1)

Früher als in anderen Jahren kulminiert der Zug um den 25.4., wo inner-
halb weniger Tage in ganz Österreich verhältnismäßig große Trupps be-
obachtet werden: 21.4. 9 an fünf Seewinkel-Lacken (HWi); 21.4. 1 Hörzen-
dorfer See, Zollfeld-K (WFi); 25.4. 12 Neudauer Teiche-St (BWei); 26.4.
6 Klafferteich, Mühlviertel-O (EPE); 26.4. 11 Fußacher Bucht-V (VB1);
27.4. bis 8.5. Durchzug am Furtner- und Mühlenerteich-St (EHa); 28.4.
19 Marchegg-N (AHr); 28.4. 5 Bernhardsthaler Teich-N (ILu).
Im Mai gleichmäßiger Zug, die Trupps sind aber viel kleiner, max. am 9.5.
4 an der Grundlacke, Seewinkel-B (JRe). Die Daten stammen nun meist aus
Rheindelta und Seewinkel (Ausnahmen: Furtnererteich-St (EHa), Neudauer
Teiche-ST (BWei), Innstausee Obernberg-O: 11.5. 3 Ex.(FGr), Bernhards-
thaler Teich-N 4 Ex. (MGa)).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus*

6 Märzdaten vom Hansag-B, von der Mosadolacke, Seewinkel-B (BLEi), von
Schönau an der Donau-N (EDu), der Sandinsel Fußach (VB1) und zweimal von
Schloß Hainfeld b. Feldbach-St (FSa, HHa).
Durchzugsmaximum April bis Anfang Mai, erwähnt seien: 4.4. bis 8.5. sieben-
mal je 2-4 an Furtner- und Mühlenerteich-St (EHa); 6.4. 1 Laxenburg-N
(EDu); 7.4. 1 Schönauerteich, Triesterstraße-N (EDu); 9.4. 1 Groß Wilfers-
dorf-St.(HHa); 13.4. 1 Schönau-N (EDu); 14.4. 1 Zobernbach bei Pilgers-
dorf-B (JRe); 15.4. 5 Schloß Hainfeld-St (HHa, FSa); 19.4. 1 Marchegg-N
(FBö); 21.4. 2 Hansag bei Taden-B (GSp); 23.4. 1 Neudauer Teich-St
(BWei); 28.4. 1 Wallersee-S (Fwo).
Ab 8.5. fehlen Daten (ähnlich wie im Vorjahr). Erst am 23. und 25.5. beob-
achtet BWei wieder 1 Ex. an den Neudauer Teichen-St, am 16.4. dann 2 Ex
bei Fürstenfeld-St (FSa), am 24.6. 1 Ex. bei Zeiselmauer-N (KPau) und
am 30.6. 2 Ex. Marchegg-N (EDu).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola*

Nach einer sehr frühen Beobachtung - 24.3. 2 Schloß Hainfeld bei Feld-
bach-St (HHa, FSa) - setzte der Zug um den 10.4. nur zögernd ein und
kulminierte relativ früh um die April-Mai-Wende und in der ersten Mai-
dekade. Er blieb in der Stärke weit hinter jenem des Vorjahres zurück;
am Bodensee etwa wurde nur ein einziges Mal ein Trupp von mehr als 10 Ex.
beobachtet (OR 31), auch WWr meldet aus K "weniger als im Vorjahr".

Die Meldungen stammen aus K (27.4. ca. 10 Gurkmündung, 23.5.
5 Strußnig-Teich - WWr), St (20.4. bis 23.5. sechzehnmal Neudauer Teiche,
1-25 Ex., meist über 10 - BWei; 19.4. bis 20.5. bis zu 15 am Furtner-
teich, Mühlener Badesee und im Hörfeld - EHa), N (28.4. 30 Bernhardsthaler
Teich - ILu; 5.5. 4 Marchegg - AHr; 5.5. 50 Bernhardsthaler Teich - MGA;
11.5. 5 Meiselsdorfer Teich - EDu); B (11.4. bis 28.5. maximal am 16.5.
40 Illmitzer Zicksee - JRe), O (29.4. bis 24.5. fünfmal 1-4 am Ziegel-
teich bei Schlägl und Klafferteich, Mühlviertel - EPE; 11.5. 14 Innstau
Obernberg b. Mühlheim - FGr) sowie V (26.4. bis 31.5. 1-7 Sandinsel
Fußach - VB1, EDo).

Teichwasserläufer, Tringa stagnatilis

Außergewöhnlich starker Frühjahrszug im Bodenseegebiet und am Neusiedlersee, früher als normal.

Im Rheindelta wurden bereits am 31.3. 3 beobachtet (OR 31), am 10.4. sah VBl 1 bei Gaißau.

Seewinkel-B: 14.4. 1 Gansllacke (Hollyer, Worsfold), 18.4. 3 Unterstinker, 1 Podersdorfer Lacke (HWi), 20.4. 2 Podersdorfer Lacke, 1 Unterstinker (AFe, BLei), 21.4. desgl. (HWi), dazu 2 an der Fuchslochlacke, 2 Illmitzer Zicksee (AFe), das sind insgesamt 7 Ex.!!; 1.5. 1 Grundlacke (EDu).

Flußuferläufer, Tringa hypoleucos

Ankunft: 4.3. 1 Rheinufer bei Buchs CH (AAu)

28.3. 1 bei Fürstenfeld-St (FSa)

2.4. 2 Neudauer Teiche-St (BWei).

12.4. Ankunft in Frojach-St (EHa).

Hauptdurchzug letztes Aprildrittel und erstes Maidrittel:

25.4. bis 9.5. 4-5 Neudauer Teiche, danach bis zum 28.5. 1-3 (BWei);

25.4. 4 Leitha bei Zürn Dorf-B (JRe), 26.4. 1 Klafferteich, Mühlviertel-N (ILu); 1.5. mind. 8 am linken Donau-Ufer zwischen Mannsdorf u. Orth-N (FBö); 1.5. 22 bei Neusiedl und Weiden-B (GSp); 4.5. 3 Leopoldsteinersee St (WWe); 4.5. 5 Gansllacke, Seewinkel-B (GSp). Einzelne Durchzügler den ganzen Mai über.

Zwergstrandläufer, Calidris minuta

Mehr Daten aus der ersten Aprilhälfte als sonst:

8.4. 1 Sandinsel Fußach-V (VBl) 11.4. 1 Schottergrube bei Podersdorf
10.4. 1 Rheindelta-V (RPe) -B (MGa)

18.4. 1 Gansllacke, Seewinkel-B (BLei)

Im Mai normaler Zugablauf; Maxima: 8. und 9.5. je 7 Sandinsel Fußach-V (VBl, EDo); 12.5. 43 Seewinkel (WLe, BLei); 19.5. 7 Sandinsel Fußach-V (EDo); 24.5. 20 Illmitzer Zicksee, Seewinkel-B (BLei); 28.5. 1 bei Obgrün bei Ilz-St (HHa); - am 1.6. 1, 9.6. 4 und 11.6. 7 auf der Sandinsel Fußach-V (VBl).

Temminckstrandläufer, Calidris temminckii

Ausgesprochen früher Zugbeginn.

18.4. 1 Gansllacke, Seewinkel-B (Hollyer, Worsfold)

21.4. 1 Sandinsel Fußach-V (EDo)

23.4. 1 ebd. desgl. am 28.4. (VBl)

Im Mai 4 Beobachtungen im Rheindelta-V mit je 1-2 Ex. (VBl, EDo), sowie siebenmal im Seewinkel-B mit insgesamt 40 Ex. (!) (EDu, BLei, JRe, HWi), was deutlich die West-Ost-Zunahme bei dieser Art zeigt, welche sich nach Ungarn zu fortsetzt.

An den Neudauer Teichen-St. am 9.5. 2, am 19. und 23.5. je 1 Ex. (BWei).

Alpenstrandläufer, Calidris alpina

Zugbeginn zwei Wochen später als im Vorjahr.

Rheindelta-V: die ersten 2 am 31.3. (VBl); geringe Trupprößen: 3.4. 6 und 8.4. 8, sonst höchstens 1-3, zuletzt 1 am 2.5. (VBl).

Seewinkel-B: erst ab 15.4. beobachtet! Dafür dauert der Zug länger, die Trupprößen sind beachtlich: 15.4. 15 Kirchsee (ABi); 18.4. 40 Kirchsee (HWi); 21.4. 78 Kirchsee (HWi); 29.4. 120 Illmitzer Zicksee (WLe), 12.5. 28. im Brutkleid Illmitzer Zicksee (BLei); zuletzt 25.5. 1 an der Grundlacke (EDu).

Sichelstrandläufer, Calidris ferruginea

11.5. 1 Sandinsel Fußach-V (VBl) 12.5. 1 N-Ufer der Langen Lacke Seewinkel-B (BLei)

Weiters am 1.6. 1 auf der Sandinsel Fußach (VBl).

Sanderling, Calidris alba

Zwischen 27.4. und 27.5. dreizehnmal im Rheindelta-V beobachtet (VBl, EDo, RPe). Der ungewöhnlich starke Zug dokumentiert sich besonders in der Anzahl der beobachteten Ex.: am 2. und 5.4. waren es je 4 Ex., am 7.5. 15 (!), dann sank die Zahl langsam: 8. und 9.5. 11, 11.5. nur 3, am 12.5. nochmals 12 und am 16.5. 10, am 19.5. 6, darnach nur mehr 1 Ex.

Aus dem ganzen übrigen Österreich steht dem nur eine einzige Meldung gegenüber: 12.5. 2 am Unterstinker, Seewinkel-B (HWi).

Kampfläufer, Philomachus pugnax

Durchzugsbeginn siehe ID 6.

Rheindelta-V: am 8.3. erst 25 Ex. im Höchster Ried, doch schon am 10.3. 160 ebd.; am 27.3. sind es ca. 300, am 4.4. ca. 350, das Maximum wird am 7.4. erreicht, wo sich ca. 550 im Gaißauer Ried aufhalten, der Bestand nimmt nun gegen die Mitte des Monats April stark ab (13.4. ca. 40 Sandinsel Fußach), am 27.-28.4. sind es nochmals ca. 300, im Mai aber nurmehr bis 20 Ex., nach dem 22.5. noch 2 Beobachtungen: 31.5. 3 und 9.6. 2 Sandinsel (Daten von VBl, EDo, RPe).

Seewinkel-B: am 8.3. 25 an der Grundlacke (GSp), 18 Erdeihoflacke (HWi); 17.3. bereits ca. 200 im Bereich Lange Lacke - Gsigsee (MDa). Der Zugbeginn ist also sowohl zeitlich wie auch in der Größe der Trupps im Rheindelta und Seewinkel recht ähnlich. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren, wo sich an wenigen Plätzen große Konzentrationen bildeten (Gsigsee, Illmitzer Zicksee), zerstreute sich in diesem Frühjahr, bedingt durch die extreme Trockenheit und der dadurch entstandenen Wasserverhältnisse, die Kampfläufer sehr stark, sodaß es schwierig war, eine Übersicht über die Bestände zu erhalten. Jedenfalls scheint der Zug wieder wesentlich stärker als im Vorjahr gewesen zu sein. Am 22.3. sah HWi 140 am Gsigsee und ca. 300 an der Fuchslochlacke; 23.3. ca. 420 Gsigsee (HWi), ca. 500 Grundlacke (ABi), 28.3. ca. 800 Grundlacke (EDu), 29.3. an sechs Lacken insgesamt 1120 Ex. (BLEi); Maximum im April: 11.4. ca. 2000 in geschnittenem Schilfgürtel des Neusiedlersees bei Oggau, werden zufällig vom Baumfalk hochgejagt (BLEi); 18.4. 765 an neun Lacken (HWi); 20.4. ca. 600 Ochsenbrunnlacke, ca. 400 Podersdorfer Lacke (BLEi); 21.4. 1385 an 12 Lacken (HWi); ca. 455 im Hansag (GSp). - Sehr vorsichtig geschätzt, kann man für das Neusiedlerseegebiet nach den angeführten Beobachtungen einen Aprilbestand von ca. 5000 Ex. annehmen. - Zuletzt am 28.5. 1 W Ganslacke (GSp).

Andere Beobachtungsorte: 3.3. 2 Schloß Hainfeld-St (FSA, HHa); 21.3. ca. 500 bei Zürnndorf-N (JRe); 30.3. 12 Auhof, Perg-O (WFi); 7.4. ca. 50 Marchegg-N (AHR); 1.4. und 20.4. je 1, 23.4. 2, 25.4. 16, 26.4. 30, 27.4. bis 21.5. viermal je 1 Ex. Neudauer Teiche-ST (BWei); 15.4. 3 Grobharter Teich-St (HHa); 20.4. 140 Wallersee-S (FWo); 20.4. 1 W Gurkmündung-K (WWr); 25.4. bis 8.5. Durchzug am Furtner- und Mühlener Teich-St (EHa); 27.4. 10-15 Gurkmündung-K (WWr); 28.4. ca. 100 Güssinger Teiche, B (FSA); 28.4. ca. 100 Bernhardsthaler Teich-N, 2 Wolfsteich-N (ILu). - Nach diesen Daten zeichnet sich sehr deutlich ein starker Zugsgipfel in der letzten Aprildekade ab. Maibeobachtungen: 12.5. 3 Schloß Hainfeld-St (HHa); 23.5. 1 W Strußnig-Teich-K (WWr); 27.5. 1 W Gurkmündung-K (WWr).

Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta

Ankunft wie im Vorjahr: 17.3. 1 Ex. am N-Ufer der Langen Lacke, Seewinkel-B (MDa).

Im Rheindelta am 30.-31.3. 1 Ex. (EDo), am 8. und 9.4. 2 Ex. (VBl) und am 10.5. ein Paar (VBl).

Stelzenläufer, Himantopus himantopus

Angeblich am 20.4. an der Podersdorfer Lacke (Hollyer, Worsfold) sowie am 24.5. am Gsigsee (nach BLEi), Seewinkel, beobachtet. EPe sah am 9. und 10.5. 1 Ex. am Klafferteich, Mühlviertel-O.

Odinshühnchen, Phalaropus lobatus

Am 21.4. 1 am Illmitzer Zicksee, Seewinkel-B (AFe). Wegen der Seltenheit von Frühjahrsbeobachtungen ist diese Meldung von besonderer Bedeutung.

Brachschwalbe, Glareola pratincola

Trat früher als im Vorjahr auf:

13.5. 1 Ex. Grundlacke, Seewinkel-B (BLei, Elliot)
23.-24.5. 1 Ex. ad. Sandinsel Fußach-V (VBl u.a.)

Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius parasiticus

1 Ex. am 22.3. an der Auerlacke, Seewinkel-B (HWi, BLei).

Mantelmöwe, Larus marinus

Innerhalb von fünf Tagen zweimal in Österreich beobachtet:

27.4. 1 immat. Hagenauer Bucht, Innstauraum Ering-Frauenstein-O (GEr)
1.5. 1 immat. Neusiedlersee bei Breitenbrunn-B (GSp)

Heringsmöwe, Larus fuscus

Nachtrag zu ID 5: am 17.9. 4 ad. auf den Ahamer Schlickbänken, Innstau Ering-Frauenstein-O (GEr, Pammer).

Frühjahrsbeobachtungen: 30.3. 3 ad. Sandinsel Fußach-V (EDo); 8.4. 1 ad. Fußacher Bucht-V (VBl); 11.4. 2 ad. Donau bei Fischamend-N (JRe); 13.4. 1 ad. Donau bei Schönau-N (EDu); 26.4. 2 ad. 1 subad. Sandinsel Fußach V (VBl); 29.4. 2 ad. 3 subad. ebd. (VBl); 8. und 11.5. 1 ad. ebd. (EDo); 18.5. 1 ad. Neusiedlersee (GSp).

Silbermöwe, Larus argentatus

Bodensee-V: Adulte Ex. am 26.4. (1 - VBl), 5.5. (1 - EDo), 7.5. (2 - VBl) auf der Fußacher Sandinsel. Es handelte sich dabei um gelbfüßige Tiere. Immat. Großmöwen, bei denen eine sichere Artdiagnose (zwischen Herings- und Silbermöwe) kaum möglich ist, wurden am 9.4. (14), 2.5. (25), zwischen 8. und 12.5. (ca. 20), 21.5. (17, davon je 4 subad. Herings- und Silbermöwen) und 9.6. (ca. 20) auf der Sandinsel Fußach-V beobachtet (VBl).
Raum Untere Donau-N und Neusiedlersee-B: 10.3. 2 ad. Haslau-N, 2 ad. 2 immat. Fischamend-N (WLe); 13.4. ca. 40 ad. (!) auf Donausandbank bei Schönau-N (EDu); 1.5. 5 immat. Unterstinker, Seewinkel-B (EDu); 5.5. 28 immat. Fischamend-N (JRe); 9.6. 2 immat Neusiedlersee-B (HWi).

Sturmmöwe, Larus canus

10.3. 5 ad. 2 immat Donau bei Haslau-N, 12 ad. 5 immat. Donau bei Fischamend-N (WLe); 20.3. 6 ad. 2 immat. Donau bei Regelsbrunn-N (EDu); 11.4. 1 ad 2 immat. Fischamend (JRe); 11.4. 2 immat bei Neusiedl a.S.-B (GSp).

Schwarzkopfmöwe, Larus melanocephalus

Am 23.3. konnte GER 1 immat. Ex. unter Lachmöwen am Innstausee Ering-Frauenstein-O beobachten.

Aus dem Neusiedlerseegebiet erstmals seit mehreren Jahren keine Meldung. Auf die Beobachtungen ab Mai im Rheindelta-V wird im ID 8 eingegangen.

Lachmöwe, Larus ridibundus

FGr beobachtete am 19.3. den Schlafplatzflug am Innstausee Schärding-O bei Reichersberg: dieser dauerte von 1754 bis 1845 Uhr (Einbruch der Dunkelheit - Sonnenuntergang um 1807 Uhr). Über 1500 Ex. flogen im angeführten Zeitraum von N nach S (stromaufwärts); anfangs hielten sich die Tiere ziemlich hoch, bei zunehmender Dämmerung flogen sie immer tiefer, bei fast völliger Dunkelheit hielten sie sich dann knapp über

Lachmöwe Forts.:

der Wasseroberfläche. Der Beobachter betont die auffallende Scheu.-
Am 14.4. zählt GSp noch ca. 1300 Ex. auf der Donau bei Fischamend-N.

Zwergmöwe, Larus minutus

Der Zug war im Seewinkel stärker als im Vorjahr, jener der immat. begann früher. 10.4.: 1 immat.(!) Fußacher Bucht-V (RPe, KMa, HWi)

11.4.: 1 ad. Neusiedlersee bei Neusiedl-B (GSp).

Erst nach einwöchiger Pause folgen die nächsten Beobachtungen:

5 ad. Podersdorfer Lacke (HWi); 20.4. 3 ad. 1 immat. Grundlacke, 3 ad. 1 immat. Neusiedlersee bei Hölle (BLEi); 21.4. 9 ad. 14 immat. Lange Lacke (BLEi), 4 ad. Podersdorfer Lacke (HWi); 23.4. 26 ad. 7 immat. Neusiedlersee b. Neusiedl (GSp); 28.4. 1 ad. 3 immat. Unterstinker (GSp) - alle Daten aus dem Neusiedlerseegebiet-B; - 28.4. 1 ad. 2 immat. und 29.4. 1 ad. Sandinsel Fußach-V (VBl).

Im Seewinkel-B wird Anfang Mai das Maximum erreicht: 2.5. 27 ad. 143 immat.(!) Illmitzer Zicksee (MDa, WLe); 4.5. 6 ad. 66 immat. ebd.(WLe, MDa); 7.5. 4 immat. Sandinsel Fußach-V (VBl); 11.5. 1 ad. 7 immat. ebd.; 12.5. 12 immat. ebd., am 14.5. zusätzlich noch 2 ad. (VBl); 12.5. 3 Ex. Lange Lacke (BLEi); 12.5. 9 immat. Illmitzer Zicksee (WLe).

Die letzte Meldung aus dem Seewinkel stammt vom 24.5.: 8 immat. Illmitzer Zicksee (BLEi). Es erfolgt hier also in der Durchzugskurve vom 2.5. an ein steter Abfall. Anders im Rheindelta, wo am 23.5. zusammen mit 16 immat. das letzte ad. Ex. beobachtet wurde. Dort stieg die Zahl der beobachteten immat. bis 11.6. auf 25 Ex. (VBl).

Dreizehenmöwe, Rissa tridactyla

Am 20.3. sah GER 1 ad. am Innstausee Ering-Frauenstein-0; am 5. und 6.6. wurde 1 ad. am Rhein bei Fußach-V beobachtet (VBl).

Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger

Der Zug begann eine Woche später als im Vorjahr:

19.4.: 1 Kirchberger Mühlteich-St (FSa) 21.4.: 7 Lange Lacke Seew.-B(BLEi)

19.4.: 15 Sandinsel Fußach-V (VBl) 23.4.: 23 Sandinsel, Fußach-V (VBl, RPe)

20.4.: 3 Grundlacke, Seewinkel-B (BLEi)

Im Seewinkel-B war der Durchzug eher schwach, maximal sah WLe am 12.5. 28 an der Langen Lacke. Am Bodensee-V wurden die größten Ansammlungen im ersten Maidrittel beobachtet: am 5. und 9.5. je ca. 50, am 7.5. ca. 90 auf der Sandinsel Fußach (VBl).- Am Furtnersteich-St notierte EHa zwischen 25.4. und 15.6. fast täglich welche in wechselnder Anzahl (1-55 Ex.).

Ferner liegen Beobachtungen von folgenden Orten vor:

K: Gurkmündung, Straußnig-Teich bei Moosburg (WWr)

St: Leopoldsteinersee b. Eisenerz (WWe), Neudauer Teiche (BWei)

N: Meiselsdorfer Teich b. Eggenburg (EDu), Schönau a.d. Triesting (MGa); Schönauerteich (EDu); Donau b. Fischamend (JRe)

O: Innstauseen Schärding bei Reichersberg (FGr); Glashüttenteich bei Schlägl (EPe).

Weißflügelseeschwalbe, Chlidonias leucopterus

Die ersten Beobachtungen sehr früh:

21.4. 3 Neudauer Teiche-St(BWei, HHa, FSa) 25.4. 1 Klafferteich, Mühlv.-0(EPe)

25.4. 22 Wörthenlacke, Seew.-B (HWi) 26.4. 50-60 Götschlacke, See-

25.4. 2 Neudauer Teiche-St (BWei) winkel-B (HWi)

Nach achttägiger Pause folgt eine zweite, schwächere Welle: vom 4.5. bis 12.5. wurden sowohl im Rheindelta-V wie auch im Seewinkel-B mehrfach jeweils 2-5 Ex. beobachtet (Rhd.:VBl, EDo; Seew.: MDa, MGa, WLe, BLEi, HWi). Hierhinein paßt auch die Beobachtung von EDu, welcher am 11.5. 4 am Meiselsdorfer Teich bei Eggenburg-N sah.

Schließlich wurde im letzten Maidrittel nochmals schwacher Durchzug festgestellt: 20. und 21.5. 5 Furtnersteich-St (EHa); 24.5. 1 Illmitzer Zicksee, Seewinkel-B (BLEi).

Weißbartseeschwalbe, Chlidonias hybrida

21. und 22.5. 1 nicht ganz ausgefärbtes Ex. Sandinsel Fußach-V (VBl);
1.6. 1 ausgefärbtes Wallersee-S. (FWo); 14.6. 6, davon 2 bereits im Winterkleid, Rheindelta-V (VBl); 22.6. 2 Rheinmündung-V (EDo).

Lachseeschwalbe, Gelocheidon nilotica

8.5. 1 Sandinsel Fußach-V (EDo); 27.5. 2 Neusiedl a.S.-B (GSp); am gleichen Tag sah laut Prof. Jilka Dr. P. Blaszyk 1 Ex. - vom Neusiedlersee her kommend - am Illmitzer Zicksee. Im Vorjahr war die Art in Österreich nicht beobachtet worden.

Raubseeschwalbe, Hydroprogne caspia

Die Beobachtungen streuen geographisch auffallend stark:

11.4. 1o Donau bei Fischamend-N (JRe) - 13.4. 2 Hagenauer Bucht, Innstau Ering-Frauenstein-O (GEr) - 14.4. 1 Haslauer Teich, Waldviertel-N (MGa).

Die weiteren Daten: 18.4. 2 Neusiedlersee b. Breitenbrunn-B (GSp); 25.4. 1 Lange Lacke, Seewinkel-B (HWi); 4.5. 4 Illmitzer Zicksee, Seewinkel-B (MDa, WLe); 24.5. 1 ebd. (BLEi); 26.5. 1 Furtnerteich-St. neu für St ! (Beobachter Trogisch, Maier - gemeldet von EHa).

Flußseeschwalbe, Sterna hirundo

30.3. 2 Sanddelta, Fußach-V (EDo); 30.3. 1 Illmitzer Zicksee, Seewinkel B (WLe); 31.3. 2 Bregenzerach-Mündung, 1 Fußacher Bucht, Rheindelta-V (VBl); 1.4. 6 Bregenzerach-Mündung (VBl).

Am 21.4. 4 Innstausee Obernberg bei Mühlheim-O (FGr); 26.5. 2 Donau bei Kritzendorf-N (EDu).

Zwergseeschwalbe, Sterna albifrons

Während aus dem Frühjahr 1967 Meldungen fehlten, konnten heuer sowohl im Rheindelta wie auch im Seewinkel welche beobachtet werden, wobei sie im Seewinkel etwas früher auftraten:

29.4. 1 Lange Lacke, Seewinkel-B (WLe); 4.5. 1 Grundlacke, Seew.-B (GSp); 8.5. 1 Fußacher Bucht, Rheindelta-V (EDo); 10.5. 2 Sandinsel Fußach-V (VBl). - Am 11. und 13.6. beobachtete VBl 1 ad. an der Rheinmündung-V.

Hohltaube, Columba oenas

Von HHa am 11.2., 9.3., 7.4., und 22.4. jeweils in einem Ex. in Neudorf bei Ilz-St beobachtet. - Am 25.4. 2, 26.4. und 9.5. je 1 Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe).

Ringeltaube, Columba palumbus

Ankunft wie im Vorjahr:

23.2.: 1 Rheinholz bei Gaißau, 25.2.: 1. Beobachtung bei Braunau-O
1 Gaißauer Ried, Rhd.-V (VBl) (VO 78)
29.2.: 1 über Au bei Langenzers- 29.2.: Ankunft in Windischgarsten-O
dorf-N (EDu) (VO 78)

Am 10.3. die ersten 4 bei Ludmannsdorf, Rosental-K (WWr); Zugverlauf: RPe zählte im Lauteracher Ried-V am 11.3. 30, am 16.3. ca. 200 und am 10.4. ca. 500. Ebenfalls im ersten Aprildrittel, nämlich am 7.4. sah KPau die größten Trupps (bis zu 100) bei Zeiselmauer-N.

Turteltaube, Streptopelia turtur

Früher als im Vorjahr: 11.4. 1 Vogelwarte Neusiedl-B (GSp); 12.4. erste Beobachtung in Pulgarn-O (VO 78); 15.4. 2 Schloß Hainfeld b. Feldbach-St (FSa, HHa); 20.4. erste Beobachtung in Steyregg-O (VO 78); 20.4. 2 gurren am Bisamberg-N (ABi); 23.4. 4 Lauteracher Ried-V (RPe)
Durchzugsdaten aus V: 1.5. 1 Lauteracher Ried (VBl); 3.5. 9 Weitried Rankweil (EDo); 8.5. 1 Lauteracher Ried (VBl).

Turteltaube Forts:

Merkwürdige Konzentrationen in der ersten Junihälfte: 7.6. 16 und 9.6. 12 Lauteracher Ried, 15.6. 18 und 18.6. 23 auf Maisacker im Wolfurter Ried (RPe).

Kuckuck, Cuculus canorus

Die ersten Beobachtungen eine Woche früher als im Vorjahr:

- | | |
|--|---|
| 6.4.: 1. Beobachtung in Pulgarn-O u. Plesching b. Linz-O (VO 78) | 9.4.: 1 Völkermarkter Stausee-K (WWR) |
| 7.4.: 1 Völkermarkter Stausee-K (MWO) | 10.4.: 1 Rheindelta-V (RPe) |
| 7.4.: 1 Blumau b. Fürstenfeld-St (FSa) | 11.4.: 1 Fußacher Bucht, 2 Lauteracher Ried, Rhd.-V (VBl) |
| 7.4.: 1. Beob. b. Steyregg-O (VO 78) | 12.4.: 2 rufen, Bisamberg-W (EDu) |
| 8.4.: 1 Hütteldorf-W (JSi) | |

Besonders in den gebirgigeren Teilen Österreichs erfolgte die Ankunft erst im letzten Aprildrittel. Durchzugsdaten auch noch Anfang Mai:

- 1.5. 1 Unterstinker, Seewinkel-B (EDu); 11.5. mind. 10 Überschwemmungsgebiet der Donau-W (ABi)

Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus

Nur aus der Oststeiermark gemeldet: am 22.5. singt 1 in der Nähe des Forsthauses Altenmarkt bei Fürstenfeld (FSa); am 29.5. 1 bei Großhart, Bez. Hartberg (HHA).

Mauersegler, Apus apus

Außergewöhnlich frühe Ankunft:

- | | |
|--|---|
| 18.4.: die ersten im Seewinkel-B (Hollyer) | 23.4.: 2 Fußacher Bucht-V (RPe) |
| 19.4.: 1 Wien-18 (BLEi), 1 Wien-9 (EDu) | 23.4.: 2 Wien-9 (KMa) |
| 20.4.: Ankunft Gmunden-O (VO 78) | 24.4.: Ankunft in Linz (VO 78) |
| 20.4.: 1 Bregenz-Langen-V (VBl) | 25.4.: 3 Graz, Stadtpark (HHA) |
| 22.4.: 6 Wien-17 (ABi) | Nach dem OR 31 im Bodenseegebiet bereits ab 14.4. |

Blauracke, Coracias garrulus

Auch von dieser Art liegt eine außergewöhnlich frühe Beobachtung aus der Oststeiermark vor: 18.4. 1 Sebersdorf-Geiseldorf, Bez. Hartberg (FSa)

Die weiteren Meldungen:

- | | |
|---|---|
| 3.5.: 1 Schwarzach-V (VBl) | 19.5.: 1 Ebental b. Klagenfurt-K (MWO) |
| 18.5.: 1 nördl. Oberpullendorf-B, 2 Kohfidisch-B, 2 Groß Petersdorf-B (MGa) | 22.+26.5. je 1, 23.5. 2 im Lauteracher Ried-V (RPe) |
| | 3.6.: 1 Admont-Weng-St (WWe)-vgl. ID3! |
| | 10.6.: 1 Stadl a.d. Mur-St (EHa) |

Wiedehopf, Upupa epops

Ebenfalls früher als im Vorjahr:

- | | |
|--|--|
| 24.3.: 1 Braunau-O (VO78) | 30.3.: 1 Burgau Bez. Fürstenfeld-St (FSa) |
| 26.3.: 1 Bischofshofen-S (AAu) | 30.3.: Ank. im Bez. Murau-St (EHa) |
| 28.3.: 1 Hansag-B (EDu) | 30.3.: 1 an der Dornbirner Ache-V (RPe) |
| 28.3.: 1. Beob. in St. Marienkirchen-O (VO 78) | 31.3.: 1 St. Andrä (WLe), 2 Salzige Seen (MGa, WLe), Seewinkel-B |

Die erste Beobachtung in Kärnten am 14.4. bei Moosburg (WWR). - Aus der Rheinebene-V zwischen 1.4. und 31.5. weitere 20 Ex. gemeldet (VBl, EDo, RPe), davon 5 im ersten, 7 im zweiten und 4 im letzten Aprildrittel, dazu am 1.5. 1 im Lauteracher Ried gehört (VBl), am 15.5. 1 rufendes Ex. bei Meiningen (EDo), am 31.5. 1 ebd. (EDo) sowie 1 im Wolfurter Ried (RPe). - Mitte April 3 in der Hinteren Seeau bei Eisenerz-St (Revierjäger Haselwanter nach WWe), 1 Ex. ebd. am 18.5.

Wendehals, Jynx torquilla

Abgesehen vom ersten Ex. Ankunft ähnlich wie im Vorjahr.

- 1.4.: 1 Koblach-V (EDo)
 9.4.: 1 St. Peter b. Klagenfurt-K (Mwo) 13.4.: 1 Beob. in Braunau-O (VO 78)
 10.4.: 1 Staudach b. Hartberg-St (FSa) 14.4.: 1 Sandeck, Seew.-B (WWa)
 10.4.: 1 Rheindelta-V (RPe, KMa, Hwi) 14.4.: 1 Beob. Windischgarsten-O (VO 78)
 13.4.: 1 Schönau a. d. Donau-N (EDu) 15.4.: 1 zwischen Stockerau u. Tulln
 N (FBö)
 15.4.: 2 Pilgersdorf-B (JRe)

Weitere Meldungen (Auswahl): 21.4. 1 Lange Lacke, Seew.-B (WWa); 25.4.
 1 Eberschwang-O (DGr); 27.4. 2 Obstgärten bei Ottensheim-O (HRei); 28.4.
 2 Donauauen b. Ottensheim-O (HRei).

Heidelerche, Lullula arborea

Am 16.3. 20 Ex. im Lauteracher Ried - V (RPe)

Feldlerche, Alauda arvensis

Zugmaximum Anfang März: 3.3. ca. 500 im Lauteracher Ried-V (RPe); 3.3.
 8 über Hütteldorf-W nach NO ziehend (JSi); 6.3. ca. 100 bei Fürsten-
 feld-St (FSa).

Uferschwalbe, Riparia riparia

8.4. ca. 10 unter 300 Rauchschnalben im Rheindelta-V (VBl)
 14.4. 2 Sandbruch bei Fischamend-N (EDu)
 28.4. 3 Katzelsdofer Teich, 5 Herrnbaumgartner Teich, Weinviertel-N (ILu);
 30.4. 2 Purbach-B (MGa); 1.5. ca. 100 Neusiedler Teich-B (EDu); 9.5.
 ca. 30 mit etwa 50 Rauchschnalben am Klafferteich, Mühlviertel-O (EPe);
 12. bis 27.5. 5-10 Meiselsdofer Teich-N (EDu); 13.5. mind. 14 Glashütten-
 teich b. Schlägl-O (EPe); 18.5. 2 und 19.5. 6 Neudauer Teiche-St (FSa,
 HHa, BWei); 22.5. erste Beobachtung am Furtnerteich-St (EHa).

Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris

Die ersten Meldungen: 22.3.: 4 Laternser Schlucht-V (EDo)
 24.3.: 30 Puxerloch, Bez. Murau-St (EHa)

Rauchschnalbe, Hirundo rustica

17.3.: 1 bei Fürstenfeld-St (FSa) 27.3.: 1 Bregenz-V (VBl)
 19.3.: 1 Völkermarkter Stausee-K (WWR) 28.3.: 2 Wien 11 (JRe)
 22.3.: 3 St. Peter b. Klagenft.-K (Mwo) 28.3.: Ankunft Windischgarsten-O,
 24.3.: Ankunft Steyrermühl-O (VO 78) Machland-O (VO 78)
 26.3.: 1 Parndorf-B (KMa) 29.3.: 1 Lauterach-V (RPe)
 29.3.: Ank. in Braunau-O (VO 78)

In größerer Anzahl erst Anfang April: So sah MGa am 6.4. zahlreiche Ex.
 im Waldviertel-N, an manchen Teichen bis zu 200 Ex. Am 12.4. jagten
 bei der Vogelwarte Neusiedl-B 52 Ex. (GSp). ABi stellte zwischen 12.
 und 15.4. in Illmitz und Apetlon-B insgesamt noch wenige fest, es wur-
 den jedoch von Tag zu Tag mehr.

Mehlschnalbe, Delichon urbica

Die Ankunft im Brutgebiet und der Durchzug erstrecken sich über einen
 sehr großen Zeitraum. Einige Ex. wurden außerordentlich früh beobachtet:
 27.3.: 1 Stausee Gralla-St (FSa) 6.4.: Ankunft Bad Goisern-O (VO 78)
 31.3.: 1 Tadten-B (MGa) 7.4.: 6 Sandinsel Fußach-V (VBl)
 Am 15.4. waren jedoch erst 2 in Illmitz-B, wo die Art in großer Zahl
 brütet, zu beobachten (ABi), in Eisenerz-St wurden die ersten verspätet
 - erst anfangs Mai - festgestellt (WWe).

Schafstelze, Motacilla flava

M. flava flava: Ankunft sehr früh.

22.3. 3 auf Kiesbank im Rhein bei Fußach-V (VBl)

23.3. 1 Neusiedl a. See-B (ABi)

23.3. 5 Fußacher Ried-V (VBl)

Am 3.4. bereits ca. 40, am 10.4. ca. 90 auf der Fußacher Sandinsel-V (VBl); in Marchegg am 7.4. 6-7 Ex. (HMBi).

M. flava thunbergi: die erste bereits am 6.4. am Klosterteich in Zwettl N (MGa); am 14.5. 2 im Rheindelta-V (VBl).

M. flava cinereocapilla: FSA konnte diese Rasse nun auch in der Steiermark als Brutvogel feststellen. Er sah am 19.4. erstmals 1 M. bei Schloß Hainfeld, Feldbach. Am 28.4. konnte er ebd. bereits ein Paar beobachten, am 5.5. sah er zusammen mit HHa nur das M. und am 3.6. war wieder das Paar zu sehen, das M. hatte Futter im Schnabel. Von den Salzburger Brutgebieten (Pinzgau) liegt keine Meldung vor. Am 14.5. stellte VBl 1 M. im Rheindelta fest. - Die MM. dieser Rasse sind eindeutig an der scharf abgesetzten rein weißen Kehle von thunbergi und flava zu unterscheiden.

M. flava feldegg: Die größte faunistische Überraschung dieses Frühjahrs war das Auftreten der Maskenstelze an einer ganzen Reihe von Beobachtungs-orten. Es scheint, als ob sie gegenwärtig eine ähnliche Ausbreitungswelle durchmachte wie vorher M. fl. cinereocapilla. An zwei Stellen wurden auch Bruten festgestellt, sodaß gegenwärtig in Österreich drei Schafstelzenrassen brüten. Der Einflug begann in der zweiten Aprildekade: zwischen 10. und 22. 4. sahen Hollyer und Worsfold mehrmals 1 M. zwischen Neusiedl am See und Jois-B. Am 13.4. konnten MGa, HAb und WLe 1 M. am Haslauer Teich bei Heidenreichstein, waldviertel-N beobachten. Am Völkermarkter Stausee-K wurden die nächsten gesehen: am 1.5. stellte Mwo 1 Ex. fest, am 4.5. vermerkte er sogar 3 Ex.. Im Rheindelta-V wurde ab 14.5. 1 M. beobachtet (VBl) - dort erfolgte später auch eine Brut! Schließlich sah EDu 1 M. am 13.6. an der Grundlacke, Seewinkel-B. Ein zweites Brutpaar entdeckte FSA an den Güssinger Teichen: 5.7. 1 M. und 1 W. mit zwei flüggen juv., desgl. am 6.7.; das M sah er am 7.7. zusammen mit Prof. F. Rathmayr wieder, das Paar am 9.7., wobei das W. wieder juv. fütterte. Zuletzt konnte er das W. mit den 2 juv. am 13.7. beobachten.

Vermutlich gibt es noch eine Anzahl weiterer Beobachtungen, welche jedoch von den Beobachtern für zu unwahrscheinlich gehalten und deshalb nicht eingesandt wurden!

In Österreich waren bis 1966 überhaupt nur dreimal Maskenstelzen beobachtet worden (vgl. Egretta 9, p. 40). Im Vorjahr sah dann RPe am 21.5. 1 Ex. im Rheindelta-V, ferner fand 1967 auch eine Brut im Schweizer Kanton Tessin statt (siehe SCHIFFERLI in Orn.Beob 65, p.38).

Gebirgsstelze, Motacilla cinerea

Abseits der Brutgebiete am 17.3. 2 an der Donau bei Maria Ellend-N (GSp) und am 20.3. 1-2 Ex. ebd. (EDu).

Bachstelze, Motacilla alba

Ankunft siehe ID 6. Nach KPau waren bei Zeiselmauer-N bis 16.3. die die meisten Brutvögel bereits eingetroffen.

1 Ex., welches die Merkmale der Trauerbachstelze aufwies, am 7.5. von VBl auf der Sandinsel Fußach-V beobachtet.

Brachpieper, Anthus campestris

11.4.: 1 Ex. Sandinsel Fußach-V (VBl). 19.4. 1 Schützen-B (BLEi); 19.4. 3 Rheindelta-V (RPe); 28.4. 2 Fußacher Ried-V, 6.5. 1 ebd. (VBl); 16.5. 1 westlich Unterstinker, Seewinkel-B (JRe).

Baumpieper, Anthus trivialis

31.3. 1 Neusiedl am See-B (HWi)

1.4. 2 singen im Lauteracher Ried-V (RPe)

Am 13.4. ca. 20 auf dem Hochwasserdamm der Donau bei Schönau-N (EDu).

Wiesenpieper, Anthus pratensis

Die letzten Durchzügler: 4.4. 15-20 nördlich Halbthurn-B (JRe); 12.4. 4 Deutsch Jahrndorf-B (MGa); 12.-15.4. mehrere Ex. in der Umgebung von Illmitz-B (ABi).

Rotkehlpieper, Antus cervinus

21.4. 5 Gsigsee, Seewinkel-B (BLEi)

25.4. 1 Wörthenlacke, Seewinkel-B (HWi)

27.4. 1 Fußbacher Bucht-V (VBl)

Weiters am 1.5. 12, darunter zwei balzende Paare, Sandinsel Fußbach (VBl);

1.5. 2 Umgebung der Grundlacke, Seewinkel-B (EDu); 3.5. 5 Seewinkel-B (HWi); 11.5. 4 Sandinsel Fußbach-V (VBl); 12.5. 4 Seewinkel-B (BLEi).

Letztes Datum: 21.5. 21.5. 1 Sandinsel Fußbach-V (VBl).

Neuntöter, Lanius collurio

19.4.: 1M 1W Tierpark Schützen-B (BLEi, EDu)

21.4.: 1M Lauteracher Ried-V (RPe) 28.4.: 2M 1W Oggauer Heide-B (WLe)

27.4.: 1W Zentralfriedhof Wien (ABi) 28.4.: 2M bei Dobersdorf, Bez. Güssing B, (FSa)

27.4.: 1M Neusiedl am See-B (HWi)

27.4.: Ank. in Steyermühl-O,
Braunau-O (VO 78)

1.5.: 2 Fußbach-V (VBl)

1.5.: 1 Koblach-V (EDo)

1.5.: Ank. in Steyregg-O und Pulgarn-O (VO 78)

Bei Marchegg traf die Hauptmenge der Brutvögel im ersten Maidritt ein (KMa).

Schwarzstirnwürger, Lanius minor

30.4.(!).. 1 bei Fürstenfeld-St (FSa) 6.5.: 1 bei Podersdorf-B (GSp)

Am 11.5. 1 bei Gnies-St (Straße Ilz-Gleisdorf, HHa); am 21.5. 3 Eben-
tal bei Klagenfurt-K (Mwo).

Rotkopfwürger, Lanius senator

Nur zwei Beobachtungen:

30.4.: 1 Ebental b. Klagenfurt-K (Mwo) 16.5.: 1 nahe Flugplatz Fürstenfeld
St (FSa - erstmals im Bezirk
beobachtet).

Seidenschwanz, Bombycilla garrulus

Nachtrag zu ID 6: zwischen 3. und 5.1. 18-22 Ex. St. Peter bei Klagen-
furt-K; 17.3. ca. 40 Ellender Wald-N, fressen Hagebutten (WFe).

Zaunkönig, Troglodytes troglodytes

Am 21.4. 1 Ex. weitab von den nächsten Brutplätzen am Seedamm von Neu-
siedl am See-B (EDu).

Heckenbraunelle, Prunella modularis

Starker Durchzug Ende März: 28.3. 2 Neusiedler Teich-B (EDu); 28.3. und
31.3. je 5 bei Fürstenfeld-St (FSa); 30.3. ca. 15 singende im Über-
schwemmungsgebiet der Donau-W (ABi).

Rohrschwirl, Locustella luscinioides

28.3.: 1 singt beim Neusiedler Teich-B (EDu)

31.3.: 2 singen bei Neusiedl am See - B (JSi, HWi)

14.4. 1 singt am Illmitzer Zicksee, Seew.-B (ABi); 20.4. 1 singt bei

Rohrschwirl Forts:

Marchegg-N (wLe); 23.4. 1 singt im Rheindelta-V (RPe); 27.4. 1 singt an Fischa unterhalb von Fischamend-N (EDu); 28.4. je 1 singt an Wolfs- und Katzelsdorfer Teich, Weinviertel-N (ILu); 28.4. 1 singt im Schilf des Furtnersteiches-St (Frau Ilse Präsent, gemeldet von EHa, letzter Nachweis dort nach EHa 23.4.1874 von P. Bl. Hanf); im weiteren bis zum 14.6. an der gleichen Örtlichkeit singen gehört; 4.5. 2 singen am Laaerberg-W (ABi); 5.5. bis 5.6. 1 Neudauer Teiche-St (BWei).

Schlagschwirl, Locustella fluviatilis

26.4. 3 singen b. Fürstenfeld-St(FSa); 27.4. 1 singt b.Ma.Ellend-N (EDu) 27.4. 1 singt b. Marchegg-N(Prof.Jilka); 30.4. 1 singt bei Albern-N (JRe). Starker Durchzug nach dem 10.5.: 11.5. mind. 15 singen im Überschwemmungsgebiet der Donau-W (ABi); 12.5. 4-5 singen am Meiselsdorfer Teich-N (EDu).

Am 15.5. das erste Ex. an den Neudauer Teichen-St, vom 19.5. bis 5.6 2 Ex. ebd., am 11.6. 3 Ex. (BWei). In einem Beobachtungsgebiet bei Marchegg-N trafen die letzten beiden MM zwischen 2. und 8.6. ein (KMa).

Feldschwirl, Locustella naevia

24.4. 1 singt im Lauteracher Ried-V (RPe); 28.4. 1 singt b. Marchegg-N(KMa)

Mariskensänger, Acrocephalus melanopogon

8.3. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl-B (GSp)

Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus

6.4.: 1 Laxenburg-N (EDu) 13.4.: 4 singende Sandeck, 2 Herrensee,
10.4.: 1 Rheindelta-V (RPe) Seewinkel-B (ABi)
16.4.: 2 singen am Seedamm von Neusiedl
am See-B (HWi).

Seggenrohrsänger, Acrocephalus paludicola

Eine einzige Meldung: am 20.4. 1 im Gebiet der Gurkmündung-K gefangen und beringt (WWr).

Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris

4.5. 1 singt b. Laxenburg-N (EDu) 11.5. mind. 20 singende im Überschwem-
6.5. 2 singen im Lauteracher Ried mungsgebiet d.Donau-W (ABi)
V (RPe) 11.5. 2 singen b. Marchegg-N (KMa)
11.5. 1 Fußach-V (VBl) 12.5. 2 Meiselsdorfer Teich-N (EDu)

Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus

28.4. 2 Rhein bei Hard-V (VBl); 28.4. 1 singt beim Wolfsteich-N (ILu)

Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus

14.4. 1 singt am Illmitzer Zicksee, Seewinkel-B (ABi);
17.4. mind. 1 singt am Ostufer des Neusiedlersees-B (HWi)
20.4. 1 singt in der Fußacher Bucht-V (RPe)
Am 4.5. singt 1 Ex. am Zentralfriedhof-W in ganz untypischem Biotop
(Durchzug - ABi).

Gelbspötter, Hippolais icterina

28.4 erste Beob. b. Staregg-O(VO78) 4.5. 3 singen im Laxenburger Park(EDu)
4.5 4 singen Zentralfriedhof-W (ABi) 4.5. 1. Beobachtung in Gmunden-O
und Braunau-O (VO 78)
In St. Peter bei Klagenfurt am 12.5. 4, am 14.5. 1 und am 19.5. 9 Ex. (MwO)

Gartengrasmücke, Sylvia borin

27.4. 1 singt bei Fischamend-N (EDu) 28.4. 4 singen bei Marchegg-N(KMa)
 27.4. 2 singen b. Marchegg-N(KMa)
 Starker Durchzug am 11.5.: 6-7 im Überschwemmungsgebiet der Donau-W
 singend (ABi).

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla

24.3. 1M Zeiselmauer-N (KPau) 30.3. mind.3 singen im Schloßpark
 27.3. 2 singen b. Zeiselmauer-N (KPau) Pottendorf-N (HWi)
 27.3. 1 Hütteldorf-W (JKö) 30.3. 1. Beobachtg. b. Braunau-O (VO78)
 28.3. 1 Fürstenfeld-St (FSa) 30.3. 4 singen im Überschwemmungs-
 28.3. 2 singen Albernhafen-W (JRe) geb. d. Donau-W (ABi)
 29.3. 1W bei Podersdorf-B (BLEi) 31.3. 4 singen im Prater-W (KMa)
 29.3. 1. Beobachtg. b. Gmunden-O (VO78) 31.3. 10-12 singen Laxenburg-N (ABi)
 31.3. Ankunft Steyregg-O (VO 78)
 Zwischen 12. und 15.4. noch immer Zug: 2 singende im Illmitzer Wäld-
 chen, Seewinkel-B (ABi).

Klappergrasmücke, Sylvia curruca

31.3. (!!) 2 Neusiedl a.S.-B, davon eines gefangen u. beringt (JSi)
 7.4. ... das erste Ex. in Braunau-O (VO 78)
 10.-12.4. 2-4 Illmitzer Wäldchen, Seewinkel-B (MGa)
 12.4. 3 Neusiedl am See-B (BLEi)
 13.4. 2-3 Schönau an der Donau-N (EDu)
 13.4. 1 St. Peter bei Klagenfurt-K (Mwo)
 14.4. ... Ankunft in Gmunden-O (VO 78)
 Dazu um den 15.4. mehrere weitere Meldungen aus dem Neusiedlerseegebiet,
 während im Bodenseegebiet zu dieser Zeit erst 1 Ex. beobachtet worden
 war (OR 31). Offenbar wird der Osten Österreichs von dieser aus SO
 aus dem Winterquartier kommenden Art früher erreicht als Mittel- und
 Westösterreich. Ähnliches scheint auch für die Mönchsgrasmücke zu gel-
 ten.
 Die Erstankömmlinge bringen noch nicht die Klapperstrophe (Reviergesang),
 es dürfte sich dabei ausschließlich um Durchzügler handeln. Die ein-
 heimischen Brutvögel kommen erst Ende April - Anfang Mai: ABi hörte am
 27.4. am Zentralfriedhof-W bereits 7 Ex. "klappern".

Dorngrasmücke, Sylvia communis

9.4. 1M b. Fürstenfeld-St (FSa) 16.4. 2(1singt) Jungersberg-B (HWi)
 13.4. 1 St. Peter b. Klagenft.-K (Mwo) 18.4. 1 singt Lauteracher Ried-V (RPe)
 13.4. 1. Beob. b. Braunau-O (VO78) 19.4. 1 singt bei Jois-B (BLEi, EDu)
 15.4. 3 bei Stockerau-N (FBö) 19.4. Ankunft Steyrermühl-O (VO 78)

Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria

27.4. 1M ad. Marchegg-N (KMa) 4.5. 5MM ad. singen ebd. (KMa)
 28.4. 2MM ad. singen b. Marchegg-N (KMa) 4.5. 1 Laxenburg-N (EDu)
 Am 19.5. in Marchegg-N die ersten ad. WW und am 2.6. die ersten vj. MM und
 WW (KMa); auch EDU sah zwischen 12. und 27.5. in der Umgebung von
 Eggenburg-N nur 3-4 ad. MM.

Zilpzalp, Phylloscopus collybita

Ankunft deutlich später als im Vorjahr:
 17.3. 1. Beob. in Braunau-O (VO 78) 23.3. 30-35 bei Neusiedl a.S.-B (ABi)
 19.3. 2 singen Wölfurter Ried-V (RPe) nur wenige davon singen!
 30.3. 3-4 Laxenburg-N (EDu) singen nicht. 24.3. 1 Hütteldorf-W (JKö)
 20.3. 1 singt b. Ma. Ellend-N (EDu) 24.3. 1 Zeiselmauer-N (KPau)
 21.3. 1. Beob. b. Steyregg-O (VO 78) 24.3. ca. 20 Seewinkel-B (ABi)
 22.3. 1 Fußach-V (VBl) 24.3. erste Beobachtung in Pul-
 22.3. 1. Beob. b. Linz, Steyrermühl-O garn-O, Gmunden-O (VO 78)
 (VO 78)
 22.3. 1 Neusiedl a. See-B (HWi, BLEi)

Zilpzalp Forts

Zwischen 12. und 15.4. noch Zug: 9 singende im Seewinkel-B (ABi)
Im Mühlviertel die ersten 2 singenden erst am 28.3. bei Aigen-O (EPe).

Fitis, Phylloscopus trochilus

Ankunft sehr früh:

23.3. 1 singt b. Fischamend-N (MGa) 24.3. erste Beobachtung bei
24.3. 1 singt Sandeck, Seew.-B (ABi) Braunau-O (VO 78)
24.3. 1 singt in Marchegg-N (BLei) 27.3. 1 singt bei Fußach-V (VBl)
Am 30.3. im Überschwemmungsgebiet der Donau-W bereits 6 singende Ex, am
31.3. in Laxenburg-N 5 singende (ABi); 31.3. zahlreiche Ex. bei Neu-
siedl-B singend (JSi); zwischen 12. und 15.4. im Seewinkel-B noch
Durchzügler (ABi).

Berglaubsänger, Phylloscopus bonelli

15.4. 4 singen im Laternser Tal-V 600 m NN (EDo)
2.5. noch ein Durchzügler bei Bischofshofen-S (AAu)

Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix

Ankunft normal:

10.-12.4. 2 singen im Illmitzer Wäldchen, Seewinkel-B (MGa)
13.4. 1 singt im Lauteracher Ried-V (RPe)
13.4. ... 1 singt bei Schönau a.d. Donau-N (EDu)
Bis 1.5. liegen Durchzugsdaten von Plätzen, an denen die Art nicht brü-
tet, vor (Neusiedlerseegebiet-B -Hwi, EDu; Überschwemmungsgebiet-W -
ABi; Marchegg-N -KMa); 21.4. 1 singt bei Ilzberg, 27.4. 1 singt Hard-
wald, beides bei Ilz-St (HHa).

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus

Noch Ende März Zugbewegungen: 24.3. 5 im Illmitzer Wäldchen, Seew.-B
(ABi); 28.3. 1 Halbthurn-B (EDu).

Grauschnäpper, Muscicapa striata

27.4. 2 Zentralfriedhof-W (ABi) 29.4. erste Beobachtung St. Marien-
28.4. 1 Lauteracher Ried-V (RPe) kirchen-O (VO 78)
An den meisten Beobachtungsorten in N, O und St Ankunft zwischen 2. und
8., längstens 12. Mai; am 4.5. im Laxenburger Park-N bereits 8-10 Ex.,
am 12.5. bei Eggenburg-N 6-8 Ex. (EDu).

Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca

Zug ähnlich wie im Vorjahr:

4.4. 2 St. Peter b. Klagenft.-K (Mwo) 10.-12.4. 2 Illmitzer Wäldch.-B (MGa)
5.4. 1M Hütteldorf-W (JSi) 11.4. 2 zwischen Zwentendorf u.
7.4. 1 Helenental-N (EDu) Traismauer-N (FBö)
8.4. 1M Schloßpark Schönbrunn-W (FBö) 12.4. Beginn des DZ im Bez. Murau
-St (EHa)

Der Zug dauert den ganzen April über in etwa gleichbleibender Stärke an
(Daten von ABi, HMBi, EDu, Hwi u.a.). Am 1.5. noch 4-5 im Seewinkel-B
(EDu), am 4.5. 1 Ex. Marchegg-N (KMa), 1 Laxenburg-N (EDu) und am 20.5. (!)
1M 1W Neusiedl am See-B (GSp).

Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis

7.4. 1 singt am Kolbeterberg-W (JSi) 12.4. 1 Furtnersteich-St (EHa)
9.4. 1M Großenzersdorf-N (FBö) 14.4. 1M Lobau-W (HBi)
12.4. 1M Langenzersdorf-N (EDu)
Am 1.5. noch 2-3 Durchzügler im Seewinkel-B (EDu); 4.5. 8-10 singende in
Laxenburg-N (EDu). - Am 25.5. bei Stadl a.d. Mur-St von Fr. Bertraud Hable
beobachtet, letzter Nachweis im Gebiet 16.4.1884 von P.Bl.Hanf (EHa). -
Diese Beobachtung könnte ein weiterer Hinweis für die langsame Ausbrei-
tung der Art nach W sein, welche zu einer Reihe von neuen Brutplätzen in
Oberösterreich, Steiermark und Salzburg führte.

Zwergschnäpper, Ficedula parva

11.5. 2 singende Ex. Baunzen-N (BLEi).

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata

8.3. 1M Wiesengrund, Seew.-B (Hwi); 10.3. 1M Groß Wilfersdorf-St (FSa);
12.3. 7 St. Peter b. Klagenfurt-K, desgl. am 17.3. (Mwo).

Weitere Durchzugsdaten: 17.3. 1M Staudamm bei Frauenstein-O (Pammer nach GER); 22.3. 1M beim Innstausee Ering-Frauenstein-O (GER); 23.3. 2MM Fußacher Bucht-V (VBl).

Braunkehlchen, Saxicola rubetra

Ankunft später als im Vorjahr:

13.4. 1M bei Ilz-St (Hha) 20.4. ca.30 Lauteracher Ried-V (RPe)
15.4. 5 St.Peter b.Klagenft.-K(Mwo) 20.4. 2 südl. Podersdorf-B (BLEi)
17.4. 1M Groß Wilfersdorf, Bez. Fürs- 21.4. erste Beobachtung in Windisch-
tenfeld-St (FSa) garsten-O (VO 78)
18.4. 3M 2W Lauteracher Ried-V (RPe)
Durchzug bis Mitte Mai (z.B. 11.5. 5 Fürstenfeld-St - FSa).

Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

28.3. 1.Beob. in Taufkirchen-O(VO78) 1.4. 1 singt Hütteldorf-W (JSi)
29.3. 1.Beob. im Machland-O (VO 78) 2.4. 1M Fürstenfeld-St (FSa)
30.3. " " St.Marienkirchen-O (VO 78) 2.4. 1.Beobachtg.Pulgarn-O (VO 78)
31.3. " " Steyrermühl-O (VO 78) 4.4. " " in Braunau-O (VO 78)
31.3. 1M Zentralfriedhof-W (Hwi) " " in Gmunden-O (VO 78)
5.4. 1,2 Fußacher Bucht-V, ca. 10
Lauteracher Ried-V (VBl).

Im Vergleich zu vielen anderen Arten ist die frühe Ankunft in den tiefer gelegenen Teilen Oberösterreichs auffallend. In Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten wurde die Art in größerer Zahl dagegen erst ab Mitte April gesehen. (In K z.B. am 14.4. das erste singende M bei Treibach - Wwr, am 21.4. das erste Ex. in St.Peter bei Klagenfurt - Mwo).

Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros

Ankunft verspätet.

17.3. 1. Ex. bei Steyregg-O (VO 78) 23.3. 1,1 Neusiedl-B, 1M Seewinkel-B (ABi)
21.3. 1 Ilz-St (Hha) 24.3. 3 Hainburger Berge-N (MGa)
21.3. 1M Lauteracher Ried-V (RPe) 24.3. 1 singend Apetlon-B (ABi)
21.3. 1.Beob. Viechtwang-O (VO 78) 24.3. Ank. in St.Marienkirchen-O(VO78)
22.3. " " Braunau-O (VO 78) 25.3. 1 St.Peter b.Klagenft.-K (Mwo)
25.3. 2 singend Hütteldorf-W (JSi)

Nachtigall, Luscinia megarhynchos

9.4. 1 St.Peter b.Klagenft.-K(Mwo) 20.4. 1 singt Bisamberg-N (ABi)
11.4. 1 Ferlach-K (Mwo) 21.4. 1 singt b.Klagenfurt-K (WFi)
12.4. 1 Langenzersdorf-N (EDu) 21.4. 2 singen Lobau-W (KMa)
12.4. 1 St.Peter b.Klagenft.-K(Mwo) 24.4. 1 singt Dornbirner Ache-V (RPe)
Am 26.5. 1 Ex. an der Feistritz bei Fürstenfeld-St, erstmals im Bezirk (FSa).

Blaukehlchen, Luscinia svecica

23.3. 5-6 singen b. Neusiedl-B (ABi) 28.3. 1M Fürstenfeld-St (FSa- erst-
27.3. 1 bei Zeiselmauer-N (KPau) mals im Bezirk)
28.3. 2-3 Neusiedler Teich-B (EDu)
Weitere Durchzügler bei Zeiselmauer-N am 12.4. und 22.4. (KPau); am 16.
4. 1W im Lauteracher Ried-V (RPe)

Rotkehlchen, Erithacus rubecula

Ein starker Durchzugsgipfel war Ende März festzustellen: 20.3. die ersten zwei in einem Garten bei Walddorf-K (WWR); 23.3. 8 Durchzügler bei Neusiedl-B (ABi); 24.3. 12-15 zwischen Apetlon und Sandeck, Seewinkel-B (ABi); 30.3. ca. 15 Überschwemmungsgebiet-W (ABi); 31.3. starker Zug bei Neusiedl am See und Weiden-B (JSi). Am 13.4. sang noch ein Durchzügler im Illmitzer Wäldchen-B (ABi).

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

Früher Durchzug:

26.3. 1M bei Zeiselmauer-N (KPau) 30.3. 1 Fußacher Bucht-V (EDo)
 29.3. 1W ebd. (KPau) 31.3. 1 Tadtener Hansag-B (Hwi)
 30.3. Beobachtg. Eberschwang-O (DGr) 1.4. 1 Lauteracher Ried-V (VBl)

Der Zug dauert mindestens bis 5.5., wobei Ende April - Anfang Mai das Maximum erreicht wird. In der Rheinebene-V z.B. zu dieser Zeit folgende Beobachtungen: 28.4. ca. 50 Lauteracher Ried (RPe); 1.5. 61 Lauteracher Ried, 20 Fußacher Bucht (VBl); mind. 100 Schweizer Ried (RPe); 4.5. mind. 40 im Raum Meiningen-Koblach (EDo).

Misteldrossel, Turdus viscivorus

Am 3.3. ca. 30 im Wolfurter Ried, Rheinebene-V (RPe); 24.3. ca. 50 Schlägl, Mühlviertel-O (EPe).

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

Die letzten Durchzügler: 20.3. zwei Trupps mit je ca. 10 Ex. Laxenburg N, (EDu); 21.3. 21 nördlich Zurndorf-B (JRe); 23.3. mind. 70 Lobau-W (WLe); 24.3. ca. 50 Zeiselmauer-N (KPau); 24.3. ca. 15 Sandeck, Seewinkel-B (ABi); 28.3. ca. 100 Neusiedler Teich-B (EDu); 5.4. 60 Schlägl, Mühlviertel-O (EPe); 15.4. ca. 15 Hölle, Seewinkel-B (ABi).

Singdrossel, Turdus philomelos

27.2. erste Beobachtung bei St. Marienkirchen-O (VO 78)

28.2. 2 Wolfurter Ried-V (RPe)

29.2. 7-8 bei Langenzersdorf-N (EDu)

Am 7.3. bereits ca. 100 im Lauteracher Ried-V, am 19.3. mind. 1000 ebd. (RPe). - Die Hauptmasse der Brutvögel traf im Wienerwald bei Hütteldorf nach JSi erst zwischen dem 15. und 20.3. ein. - Am 24.3. noch stärkerer Durchzug bei Marchegg-N (BLEi).

Rotdrossel, Turdus iliacus

Schwacher Durchzug zur üblichen Zeit. - Die ersten Meldungen:

14.3. 1 Ex. Groß Wilfersdorf-St (FSa)

16.3. Durchzug im Bez. Murau-St zusammen mit Misteldrosseln und Wacholderdrosseln (EHa).

16.3. 3 bei Fürstenfeld-St (FSa)

Maximum im letzten Märzdrittel: 23.3. ca. 200 Lauteracher Ried-V (RPe);

23.3. ca. 30 Wien 23 (JSi); 24.3. 30 bei Gattendorf-B (MGa).

Die letzten Beobachtungen: 6.4. 1 Laxenburg-N (EDu)

8.4. 1 Egg, Bregenzerwald-V (KMa)

13.4. 1 Lauteracher Ried-V (RPe)

Ringdrossel, Turdus torquatus

Bereits am 14.3. 7 im Weitried Rankweil-V (EDo); am 29.3. 3 M. im Brutgebiet am Südhang des Tennengebirges-S in 1200 m NN (AAu). Auf der Halseralm bei Hieflau-St, ca. 800 m NN, am 2.4. von A. und F. Waßner stärkerer Durchzug beobachtet; 10.4. 1M 1W Illmitzer Wäldchen, Seew.-B (MGa); im Bregenzerwald-V zwischen 8. und 12.4. zahlreiche Trupps von T.t.alpestris auf aperen Stellen um die Orte Andelsbuch und Schwarzenberg (600-700 m NN); MM singen in Obstbäumen; am 8.4. an der Bregenzerache bei Andelsbuch ca. 10 der nordischen Rasse (KMa).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 7 1-29](#)