

Herausgegeben von der Österreichischen Vogelwarte, Referat für Faunistik, Postfach 417, A-1014 Wien. Zusammengestellt von K. Mazzucco und B. Leisler (Limicolen).

Nur für den persönlichen Gebrauch; gilt nicht als Veröffentlichung !

Nach der neuerlichen Druckkostenerhöhung Anfang 1969 reicht der Mitgliedsbeitrag für die "Österr. Vogelwarte" nur mehr zur Deckung der Unkosten, welche aus dem Druck unserer Zeitschrift "Egretta" entstehen. Alle anderen Tätigkeiten der Vogelwarte müssen aus Spenden finanziert werden. Wir möchten deshalb besonders diejenigen Bezieher des ID, welche nicht selbst durch Einsenden von Beobachtungsmeldungen mitarbeiten, bitten, ihren Beitrag zum Erscheinen des ID in Form einer Geldspende zu leisten.

SOMMERBERICHT 1968

Die Meldungen, aus denen dieser Bericht zusammengestellt wurde, stammen von:

Anschau Dr. M. J. (MAN)	Köck J. (JKö)
Aschenbrenner L. (LAsch)	Lehmann W. (WLe)
Ausobsky A. (AAu)	Leisler B. (BLei)
Billek A. (ABi)	Lindenthaler A. (ALi)
Bittner H. & M. (HMBi)	Luft I. (ILu)
Blum V. (VBl)	Mazzucco K. (KMa)
Böck F. (FBö)	Pauler K. (KPau)
Dangel M. (MDa)	Peter Dipl. Ing. H.
Dobler E. (EDo)	Penz R. (RPe)
Duda Dr. E. (EDu)	Petz E. (EPe)
Erlinger G. (GEr)	Reid Col. J. C. (JRe)
Fendrich W. (WFe)	Reisinger Ing. H. (HRei)
Firbas Dr. W. (WFi)	Samwald F. (FSa)
Freundl Dr. H.	Scherzinger W. (WSch)
Frey H. (HFr)	Sindelar J. (JSi)
Ganso M. (MGa)	Spitzer G. (GSp)
Grims F. (FGr)	Straschil B. (BStr)
Gruber Dr. J. (DGr)	Walter W. (WWa)
Haar H. (HHa)	Weber Dir. W. (WWe)
Hable OSR, Dir. E. (EHa)	Weissert Ing. B. (BWei)
Heister J.	Winkler H. (HWi)
Hrdy A. (AHr)	Woschitz M. (MWo)
Jilka Prof. A.	Wotzel Dr. F. (FWo)
Kainz Ing. B.	Wruß W. (WWr)

BEOBACHTUNGEN

Haubentaucher, Podiceps cristatus

Burgenland: Neusiedlersee ca. 15 Brutpaare. davon 9 bei Rust; die ersten pulli am 18. 6. an vier Stellen (GSp). Lange Lacke 3 Bp (EDu, BLei), pulli bereits am 25. 5. (BLei). Güssinger Teiche am 19. 6. 10 Nester (!), am 7. 7. 2 Paare mit je 3 pull., 21. 7. 3 Paare mit insges. 10 pull. und 5 ad. noch am Nest, 28. 7. 4 Paare mit 14 pull. sowie 4 ad. am Nest (FSa).

Niederösterreich: Am 2. 6. je 2 Ex. Bruneiteich b. Thaures, Teich b. Guttenbrunn, Schandachen-Teich, 1 Ex. Brandteich, 4 Ex. Gr. Radischen-Teich (alle ILu). Vösendorfer Teich am 20. und 28. 7. je 1 Paar mit 2 juv. (EDu).

Oberösterreich: Innstausee Schärding am 4. 5. 11 Ex., am 16. 6. 4 ad. ohne pull. sowie 2 ad. mit 2 pull. und 1 ad. mit 1 pull.: Innstau Obernberg am 11. 5. 1 Ex. (Alle Beob. von FGr)

Steiermark ??

Kärnten: WWr schätzt für 68 auf dem Wörthersee ca. 20 Bp, auf dem Ossiachersee ca. 5 Bp. JRe sah am 21.6. am Wörthersee 1 Paar mit 4 pull.
 Salzburg: Für 68 keine Angaben, 66 und 67 etwa 50-60 Bp im ganzen Land (die meisten am Waller- und Zellersee/Pzg. - KMa).
 Vorarlberg: ca. 100 Bp im Rheindelta und bei Hard; eine Zählung an den wichtigsten Plätzen ergab 69 führende Paare (VB1).
 Eine sehr grobe Schätzung für Österreich läßt einen Brutbestand von 300 -340 Paaren vermuten (V 100, S 50-60, K 35-40, N 20, St 5, O 60-70).

Schwarzhalstaucher, Podiceps nigricollis

Rheindelta/V: Brutverdacht in einer Lachmöwenkolonie, jedoch keine juv. gesehen (VB1).
 Seewinkel/B: 9.5. 7 Ex. Stundlacke (JRe), 31.7. ca. 20 Ex. Fuchslochlacke (BLei, KM)
 Insgesamt infolge des ungünstigen Wasserstandes nur geringer Brutbestand.
 Güssinger Teiche/B: 7.7. 1 Ex. (FSa).
 Neudauer Teiche/St: 25.5. 1 Ex. (BWei).
 Niederösterreich:
 Herrnbaumgartner Teich 5.5. 8 Ex. (MGa)
 Katzelsdorfer Teich 5.5. 6 Ex. (MGa)
 Bernhardsthaler Teich 5.5. 12 Ex. (MGa)
 Bruneiteich b. Thaures 2.6. 4 Ex. (ILu)
 Meiselsdorfer Teich 12.-27.5. 4 Ex. (EDu)
 Laaerberg/W 4.5. 2 Ex. (ABi)
 Schönauerteich (Triesterstr.) 5.5. 15-18 Ex., 27.6. ca. 10 Ex. mit pulli,
 14.7. ca. 15 Ex. mit pulli (EDu).

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis

Vorarlberg: Für den Sommer 68 im Rheindelta 40 Bp geschätzt. Eine Zählung an etwa der Hälfte der in Betracht kommenden Plätze ergab 19 führende Paare.
 Salzburg: Anlässlich einer Exkursion im Rahmen des alljährlich stattfindenden Salzburger Ornithologentreffens wurde am 22.6. der bisher höchstgelegene Brutplatz dieser Art im Land entdeckt: 1 ad. sowie mehrere bettelnde pull. Egelsee b. Abtenau, 726 m NN.
 Oberösterreich: am 16.6. 1 Ex. mit 3 pull. Innstausee St. Florian/Schärding (FGr); am 15.4. 20 Ex. am Glashüttenteich b. Schlägl, Mühlv. (EPe); 20.4. 9 Ex. und 9.5. 1 Ex. Klafferteich, Mühlv. (EPe).
 Steiermark: 12.5. und 3.6. jeweils mehrere Ex. Krummauer Moor b. Admont (WWe); noch am 10.8. 1 brütendes Ex. auf den Reither Teichen, Bez. Feldbach; am 15.8. ebd. 1 ad. am Nest und 1 ad. mit 4 pull. (HHa).
 Niederösterreich: am 14.4. 54 Ex. auf den Waldviertler Teichen (MGa), 8.7. 4 ad. ()
 5 juv. Breitensee b. Marchegg (AHr).

Fischreiher, Ardea cinerea

Übersommerer: Im Rheindelta/V 2-5 Ex. (VB1, RPe), Zuzug ab Mitte August (VB1). 21.5. und 31.5. je 1 Ex. bei Meiningen/V (EDo). - 2.6. je 1 Ex. Schandachenteich, Bruneiteich und Teich b. Guttenbrunn, Waldv./N (ILu). - 6.7. 1 Ex. Krummauer Moor b. Admont/St. (WWe). - 13.7. 2 Ex. bei Eberschwang/O (DGr).
 Brutkolonien:
 Niederösterreich: 1968 insges. ca. 120 Bp, verteilt auf 11 Kolonien (FBö). 3.3. 9 Ex. auf den Horsten b. Mühlleiten (WSch), 10.3. mind. 21 Ex. auf den Horsten b. Orth/Donau (WLe).
 Steiermark: Am. 1.5. in den Kolonien bei Dedenitz 4, Altneudörfl 3, Ratzenau b. Gosdorf 2-3 Horste besiedelt (alle Umgebung von Radkersburg); unter den Horsten bereits frische Eischalen (MAn).
 Kärnten: Bei Schwabegg eine Kolonie aus ca. 30 Horsten (auf Buche, Fichte, Föhre). Nestlinge zunächst von Jägern ausgeschossen, auf Beschwerden kamen dann sämtliche Nachgelege auf. Zwischen 28.4. und 15.6. konnten von Hemerka und Woschitz 37 Nestlinge in 16 Horsten beringt werden, zwei davon wurden bereits in Italien geschossen (MVö). Derzeit die größte österreichische

Fischreiher-Kolonie !

Purpurreiher, Ardea purpurea

Brutplätze: Am österreichischen Bodenseeufer/V 4 erfolgreiche Brutpaare, ab 17. 8. flügge juv. (VB1). - Nachdem 1967 am unteren Inn/O ein Paar erfolgreich gebrütet hatte, wurden 1968 zwei Paare beobachtet; nur eines davon brütete tatsächlich (bereits am 26. 6. ein fast flügger Jungreiher von Reichholf ca. 30 m vom Horst entfernt aufgescheucht - vgl. Bodensee !); das zweite Paar baute drei Horste, zu einer Brut kam es jedoch nicht (zu jung ? - GER). - Von den Brutplätzen am Neusiedlersee und im Seewinkel/B liegen keine Angaben vor. Möglicherweise brütete die Art heuer noch an mehreren anderen Plätzen. So konnte FSa jeweils 1 Ex. zwischen 19. 6. und 28. 7. an den Güssinger Teichen/B feststellen, am 14. 8. beobachtete er dort 3 Ex. - EDu sah am 7. 7. 3 Ex. in der Lobau b. Groß Enzersdorf/N. 2 Ex., welche von HHa und FSa am 24. 7. bei Obgrün nahe Ilz, Bez. Fürstenfeld/St, beobachtet wurden, dürften dagegen bereits den Beginn des Zwischenzuges anzeigen.

Silberreiher, Casmerodius albus

Keine Meldungen von den Brutplätzen am Neusiedlersee/B vorliegend. An der March/N zuletzt (vgl. ID7) am 26. 5. (2 Ex. Breitensee - AHr) und am 1. 6. (1 Ex. Lange Luß - KMa) beobachtet. - 1 Ex. hielt sich den ganzen Juli über an Fischteichen bei Obgrün nahe Ilz/St auf (HHa). - Beginn des Zwischenzuges: 20. 7. 1 ad 1 juv. Laxenburg/N, ebd. am 27. 7. 1 Ex. (EDu). Am 28. 7., 4. 8. und 14. 8. je 1 Ex. an den Güssinger Teichen/B (FSa).

Seidenreiher, Egretta garzetta

Am 25. 6. 1 Ex. am Inn-Salzach-Zusammenfluß (Stauraum Simbach-Braunau/O) von Reichholf und Riehm beobachtet (GER). - 5 Ex. am 30. 6. Breitensee, Marchegg/N (EDu).

Rallenreiher, Ardeola ralloides

1. 6. 1 Ex. Breitenbrunn/B, 1 Ex. Neusiedler Teiche/B (HWi); 3. 6. 2 Ex. Neusiedler Teiche/B (GSp); 21. 7. 1 Ex. Breitenbrunn/B (BLEi).

Nachtreiher, Nycticorax nycticorax

Nachträglich noch ein frühes Beobachtungsdatum, welches gut zu dem gemeldeten (31. 3. Marchegg - vgl. ID 7) paßt: am 30. 3. 3 Ex. auf Silberpappeln am Oberstinkersee, Seewinkel/B (Dipl. Ing. H. Peter). Brutplätze: Marchegg/N: 1. 6. 25 Ex., davon aber nur 6 ad., Breitensee (KMa), 30. 6. 10 Ex., z. T. immat., ebd. (EDu). Anzahl der Bp und Bruterfolg unbekannt. Unterer Inn/C: 1967 nur eine 4 Horste umfassende Kolonie, dagegen 68 2 Kolonien mit 6 bzw. 18 besetzten Horsten. 70 flügge Jungvögel ! (GER). Bodensee/V: 14. 5. noch 15 Ex. Sandinsel Fußach, zwischen 23. 5. und 12. 6. 3-4 Ex. ebd., am 13. 6. 1 ad, ebd. (VB1). Kein sicherer Brutnachweis (VB1). Seewinkel/B: Kein Brutnachweis, jedoch den ganzen Sommer über Beobachtungen: 3. 6. 1 immat. Auerlacke (GSp); 11. 6. 3 Ex. Pimezlacke (JKö); 4. 7. 1 ad. westl. Taden (JRe); 1. 8. 4 juv. Sandgrube Illmitz (JRe). Weitere Beobachtungen: 7. 7. 1 Ex. immat. Überschwemmungsgebiet/W, desgl. am 27. 7.; am 14. 7. um 21.00 Uhr Rufe über Wien 18 (BLEi). - 20. 7. 1 ad. 1 immat. Laxenburg/N (EDu). - 31. 7. 2 immat. Haselteich bei Ilz/St; ab diesem Tag ständig beobachtet, zeitweise sogar 3 Ex.; vorläufig letzte Beobachtung am 15. 9. (HHa).

Zwergdommel, Ixobrychus minutus

Brutvorkommen:
Vorarlberg: 1968 im Rheindelta ca. 15 Bp (VB1).

Kärnten: 2 Ex, zwischen 8. und 21.6. Wörthersee bei Krumpendorf (JRe).
 Niederösterreich (mit Wien): 7.7. 2-3 Ex, Großenzersdorfer Arm (EDu); 14.7.
 1 Ex, Schwaner Teich, Triesterstraße (EDu); 11.6. und 26.6. 1 Ex.
 Mauthnerwasser, Prater (WLe).
 Burgenland: 4.7. ca. 6 Ex, Güssinger Teiche (FSa). Über die Größe des Brut-
 bestandes liegen keinerlei Schätzungen vor.

Rohrdommel, Botaurus stellaris

Sämtliche Meldungen stammen aus dem Bereich des Neusiedlersees/B. Im Seewinkel an fünf Stellen rufende Männchen festgestellt (ABi, BLei, JRe, GSp), die Zahl der tatsächlich vorhandenen MM, dürfte aber mindestens dreimal so hoch sein.

Kormoran, Phalacrocorax carbo

Obwohl die in Frage kommenden Brutplätze an der Donau/N kontrolliert wurden, konnte nirgends ein Bp festgestellt werden (FBö). Lediglich in den Marchauen bei Marchegg/N wurden in der Fischreiher-Kolonie auch einige Kormoran-Paare beobachtet (FBö, WSch). Über den Bruterfolg ist allerdings nichts bekannt.
 Sommerbeobachtungen: 10.6. 1 Ex, ad. Neusiedlersee/B (GSp); 27.7. 1 ad.
 1 immat. Rheindelta/V (VBl).

Weisstorch, Ciconia ciconia

Oberösterreich: Je ein Bp in Altheim und Mauerkirchen (GEr).
 Kärnten: Von 11 Ex, bleiben 2 bei Tröpolach im Gailtal zurück und brüten auf einem Bauernhaus; fliegen Ende August mit den Jungen ab (WWr).
 Niederösterreich: Am 2.6. ein beflogener Horst in Altmanns bei Heidenreichstein (ILu). Bei Marchegg (Baumhorste in der Au !) am 30.6. 7 Ex. (EDu).
 Burgenland: Am 5.5. sah GSp einen Horst auf Telegraphenmast am Kirchsee, Seewinkel.
 Leider noch immer keine Bestandsaufnahmen in N und B !
 Beobachtungen: 2.6. je 2 Ex, Brandteich und Winkelauer Teich, Waldv./N (ILu).
 10.6. 3 Ex, und 11.6. 4 Ex, Zeiselmauer/N (KPau). Anfang Juli 30-40 Ex.
 auf nassen Wiesen nahe Grafenstein/K (WWr). 11.-24.7. 4 Ex, Lauteracher (EDo)
 und Wolfurter Ried (RPe), Rheinebene/V.

Schwarzstorch, Ciconia nigra

Am 19.5. sah EDu 1 Ex, im Pulka-Tal/N und fand tags darauf einen vermutlichen Horst. 12.5. 1 Ex, bei Marchegg/N (AHR). - Den ganzen Sommer über bis 1.8. ein einzelnes Ex, Hörfeld, Bez. Murau/St; vermutlich unverpaartes Männchen (EHa).
 Gegenwärtig in Österreich noch 8-10 Horstplätze, an denen aber nicht alljährlich gebrütet wird.

Löffler, Platalea leucorodia

Neusiedlersee/B: Keine Bestandesschätzungen von den Brutkolonien vorliegend. Im Mai/Juni im Seewinkel als größter Trupp maximal 10 Ex, zusammen an der Grundlacke (1.5. - EDu). Ab dem letzten Julidrittel dagegen hält sich ein Trupp von ca. 120 Ex, ad. und dj. ständig am N-Ufer der Langen Lacke auf (EDu, BLei, KMa).
 An der March bei Marchegg/N wurden im Mai/Juni ständig 2-4 Ex, auf Nahrungssuche beobachtet (EDu, AHR, KMa); diese Tiere flogen jeweils am Nachmittag die March entlang nach S ab.

Höckerschwan, Cygnus olor

Im Rheindelta/V 9 erfolgreiche Paare (VBl). - Ein offenbar umherstreifender am 14.7. am Kirchberger Mühlteich/St (HHa).

Graugans, Anser anser

Seewinkel/B: Nichtbrüter hielten sich hauptsächlich an Fuchsloch- und Langer Lacke auf: 24. 3. ca. 185 Ex. Fuchslochlacke (HWi); 12. 4. ca. 400 Ex. Lange Lacke (ABi); 17. 6. 125 Ex. Fuchslochlacke (GSp). - Die ersten pull. (etwa 8 Tage alt) von MGa am 9. 4. auf dem Illmitzer Zicksee beobachtet. Verteilung der Bp: mind. 24 Illmitzer Zicksee (HWi); 1 Albersee (HWi); 1 nordöstl. Hölle (HWi); 2 Unterstinker (HWi); 1 östl. Unterstinker (HWi); 2 Oberstinker (EDu, HWi); 6 Lange Lacke (HWi); 3 Darscho, 2 Haidlacke (HWi); 2 Fuchslochlacke (JRe). Zu diesen 44 Paaren kommen mind. 20-30 weitere an Lacken, welche nicht kontrolliert wurden oder solche, die der Beobachtung entgangen sind, womit für 1968 im Seewinkel ein Brutbestand von 70-80 Paaren gegeben ist. - Ab Anfang Juli sammeln sich Brutvögel, ihre Jungen und die Nichtbrüter am N-Ufer der Langen Lacke, BLei zählte dort am 2. 7. bereits 700 Ex., am 31. 7. waren an der gleichen Stelle nach BLei und KMa bereits ca. 1300 Ex. versammelt. Am 28. 4. sah ILu 2 Ex. mit pull. am Wolfsteich, Weinv. /N.

Schnatterente, Anas strepera

Seewinkel/B: 25. 5. 1 Paar Ganslacke (ABi); 4 Ex. Oberstinker (EDu); 3. 6. 1 Ex. Auerlacke (GSp). Für 68 liegen keine Bestandsschätzungen vor.

Krickente, Anas crecca

Oberösterreich: 21. 4. und 11. 5. je 1 M. Innstausee Obernberg b. Mühlheim; 16. 6. 2 MM. Innstausee St. Florian/Schärding unterhalb Reichersberg (FGr).
Niederösterreich: 2. 6. 5 Paare mit juv. Schandachteich, 3 Paare Winkelauer Teich, 10 Ex. Bruneiteich, Waldv. (alle ILu).
Vorarlberg: 20. 6. 1, 1 Wolfurter Ried; 25. 7. 12 Ex. ebd. (RPe). Im Rheindelta den Sommer über anwesend, doch keine Brut nachzuweisen (VBl).
Burgenland: 29. 5. ca. 15 Ex. Salzige Seen, Seew. (ABi); 31. 7. 2 Ex. Lange Lacke (BLei, KMa).

Stockente, Anas platyrhynchos

Burgenland: Nach den Bestandserhebungen von HWi und GSp etwa 200-250 Bp zu Beginn der Brutzeit. Im gesamten Bereich des Neusiedlersees dürften aber mind. 500-700 Paare brüten. Am 31. 7. waren auf der Langen Lacke bereits ca. 5500 Ex. versammelt (BLei, KMa).
Niederösterreich: Am 2. 6. 20 MM. Schandachteich sowie 30 MM. Bruneiteich, Waldv. (ILu).
Steiermark: Am 12. 3. führte am Leopoldsteinersee b. Eisenerz eine Ente ein pull.; Mitte März am Seebach eine Ente mit 8 pull. (WWe).
Oberösterreich: Am 19. 3. 7 Paare Innstausee Schärding bei Reichersberg; 11. 5. 7, 1 Innstausee Obernberg b. Mühlheim; 16. 6. 130 Ex., davon ca. 80 MM., Innstau Schärding unterhalb Reichersberg (alle Daten FGr). - 31. 3. 4 Paare Klafferteich, Mühlv.; 4. 5. 8, 1 ebd., 10. 5. 12, 0 ebd. sowie 1 Paar Molterberg, ca. 900 m NN, Gem. Klaffer, Mühlv. (alle Daten EPe).
Vorarlberg: Im Rheindelta zufolge des lange Zeit gleichbleibenden Wasserstandes besonders gutes Brutergebnis: 29 führende Enten (VBl). - An der Bregenzerache zwischen Egg und Bhf. Schwarzenberg 8. - 12. 4. mind. 10 Paare (KMa).
Tirol: Am 14. 4. je ein Paar am Inn bei Imst und Zirl, 2 Paare westl. Kundl (KMa).
Salzburg: 5 Ex. am 22. 6. am Egelsee b. Abtenau (KMa u. a.).

Spießente, Anas acuta

Einzigste Beobachtung aus der Brutzeit: 12. 5. 1 W. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLei).

Knäkente, Anas querquedula

Vorarlberg: Mehrere Paare zeigten im Rheindelta brutverdächtig Verhalten, doch

konnten keine juv. festgestellt werden (VBl).

Oberösterreich: 4. 5. 7, 0 Innstausee Schärding b. Reichersberg; 11. 5. 17, 0 Innstausee Obernberg zwischen Kirchdorf und Mühlheim (FGr).

Kärnten: 23. 5. 1 M. Strußnig-Teich b. Moosburg; 27. 5. 1 M. Völkermarkter Stausee (WWR).

Niederösterreich: 22. 4. 5-7 Ex. Breitensee, Marchegg (BLei); 28. 4. 6, 0 Wolfsteich (ILu); 5. 5. 1, 0 Schönauer Teich, Triesterstr. (EDu); 16. 5. 1, 1 Meiselsdorfer Teich (EDu).

Burgenland: Keine Bestandsaufnahme im Seewinkel. Am 31. 7. 8 Ex. Lange Lacke, 1 Ex. Fuchslochlacke (BLei, KMa) (Julidaten sind im Zusammenhang mit dem sehr frühen Abzug dieser Art von Interesse !)

Löffelente, *Anas clypeata*

Im Rheindelta/V am 29. 5. 2 MM., am 30. 5. 1 W. und am 5. 6. 1 Paar (RPe). VBl sah am 18. 7. eine Ente mit 3 juv. und am 27. 7. wohl dieselbe mit 2 juv. ebd. - Niederösterreich: 5. 5. 1, 1 Wolfsteich (MGa); 23. 5. 3, 2 Breitensee, Marchegg (MG 27. 6. 0, 3 Schönauer Teich, Triesterstr. (EDu). - Aus dem Seewinkel sind für 68 keine Bestandszahlen bekannt.

Kolbenente, *Netta rufina*

RPe sah am 9. 7. 8 Ex. im Rheindelta/V. Erstmals seit 1964 konnten dort wieder juv. festgestellt werden: 10. 7. 1 W. mit 3 juv.; 13. 7. 1 W. mit 4 juv.; 15. 8. 1 W. mit 9 kleinen juv. (A. Blum, VBl).

Tafelente, *Aythya ferina*

Vorarlberg: Im Sommer 68 waren im Rheindelta mehrere Paare anwesend, doch konnte keine Brut nachgewiesen werden (VBl).

Oberösterreich: Am 16. 6. 16 Paare Innstausee St. Florian/Schärding unterhalb Reichersberg (FGr).

Burgenland: 12. 5. 6 Ex. Lange Lacke, 13. 5. 15 Ex. nördl. der Langen Lacke (BLei); 3. 6. 1, 8 Auerlacke (GSp); 2. 7. 15 Ex. nördl. der Langen Lacke (BLei); 31. 7. 26 Ex. Fuchslochlacke (BLei, KMa).

Niederösterreich: Herrnb Baumgartner Teich 5. 5. 6, 6 Ex., Wolfsteich 5. 5. 17, 6 Ex., Katzelsdorfer Teich 5. 5. 6, 5 Ex., Bernhardsthaler Teich 5. 5. 6, 6 Ex., Schönauer Teich 19. 5. 35, 24 Ex. (alle Daten MGa); Bruneiteich 2. 6. 1, 1 Ex. (ILu); Stadtteich Waidhofen/Thaya 1 Bp (Ing. B. Kainz); Schönauer Fischteich/Triesterstr. 5. 5. 20 Ex., 27. 6. 5 Ex., 14. 7. 20 Ex. (EDu)

Moorente, *Aythya nyroca*

Im Seewinkel/B war infolge des niedrigen Wasserstandes der Brutbestand etwas kleiner als in den vergangenen zwei Jahren. Nach den Daten von ABi, JRe, GSp betrug er ca. 30 Paare. Am 3. 6. sah ABi auf der Pimezlacke 2 Ex. mit je 1 juv. - Am 5., 6. und 28. 7. je 1 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa).

Reiherente, *Aythya fuligula*

Rheindelta/V: 11. 5. 4, 0 Ex. Fußacher Bucht (VBl); 27. 7. 1 Ente mit 1 juv. (VBl). Innstauseen/O: 4. 5. 24 Ex., darunter 10 Pärchen, Innstau Schärding bei Reichersberg 11. 5. 166 Ex. Innstau Obernberg; 16. 6. 10, 4 Ex. Innstau Schärding bei Reichersberg (alle Daten FGr).

Nördl. Niederösterreich: 5. 5. 5, 1 Ex. Bernhardsthaler Teich (MGa); 1. 6. 5, 0 Ex. Eulenbacher Teich (MGa).

Seewinkel/B: Wieder Übersommerer. 24. 5. 1, 0 Fuchslochlacke, 1, 0 Auerlacke (BLei). 17. 6. 2, 3 Halbjochlacke, 3, 3 Fuchslochlacke (GSp).

Im Sommer 68 war in Österreich keine weitere Ausbreitung dieser Art festzustellen.

Gänsesäger, Mergus merganser

Vorarlberg: Am 10. 4. 1, 1 und 0, 1 an einem Gebirgsbach (KMa, HWi); 26. 7. 0, 1 an genau der gleichen Stelle (RPe).

Steinadler, Aquila chrysaetos

Steiermark: WSch und HFr kontrollierten fast das ganze Jahr über ein Paar im Bereich des Hochtausing bei Wörschach. Im Februar Balzflüge und Rufreihen (WSch). 66 und 68 soll jeweils ein juv. hochgebracht worden sein, 67 wurde der Jungvogel angeblich ausgehorstet. - Ein Junges im Juli 68 in Horst bei Hinterstein am Pyhrnpaß (WSch). - 13. 8. 1 immat. Klafferkesel-Breite Scharte, Schladminger Tauern (ILu). - Von EHa 4 juv. beringt.

Kärnten: 18. 4. 2 Ex. Dobratsch (WFi).

Salzburg: 23. 6. 2 ad. Lammertal (AAu, KMa).

Angesichts der Tatsache, daß besonders in steirischen Jägerkreisen ständig von einem "Überhandnehmen" des Steinadlers und von einer "Adlerplage" gesprochen wird, und aufgrunddessen auch in zahlreichen Revieren um Abschlußbewilligung angesucht wurde, ist die Bestandsaufnahme besetzter Horste, welche vom Österr. Arbeitskreis f. Wildtierforschung für 1969 geplant ist, von entscheidender Bedeutung.

Mäusebussard, Buteo buteo

Niederösterreich: Besetzter Horst bei Baumgarten an der March (WSch); Beobachtung von einzelnen Ex. oder Paaren zwischen März und Juli bei Josefthal nahe Litschau (ILu), Marchegg (AHR), Fischamend (2 Paare - ABi), Wolfsthal (AHR), Zeiselmauer (AHR), Rauchenwarth (BLEi), St. Pölten (GSp), Albern (GSp), im Lainzer Tiergarten (5 Ex. - ABi).

Burgenland: Bp Zobernbach b. Pilgersdorf (JRe); Beobachtungen von Sauerbrunn (Dr. H. Freundl), der Parndorfer Platte (BLEi, BStr), dem Hansag (GSp). Im Revier Zurndorf fand JRe 2 tote Ex., denen die Fänge abgeschnitten waren (Prämien !) zugleich mit 4 ebenso "behandelten" Waldkäuzen. Bereits früher waren in der Nähe ein toter Seeadler sowie eine noch lebende Rohrweihe mit abgeschlagenem Lauf in Schlageisen gefunden worden. Zur Illustration noch einige Zeilen aus einem Artikel, der in der Nummer vom April 68 in der Jagdzeitschrift "Österreichs Waidwerk" erschienen ist: "... Neben seinen großen Verdiensten bei der Fasanenaufzucht möge das erlegte bzw. gefangene Raubwild und Raubzeug die Hegetätigkeit dieses unermüdlichen Mannes (Anm. KMa: es handelt sich um Herrn Josef Rosner, seit 1958 Berufsjäger der Jagdverw. Zurndorf) ... ins rechte Licht rücken: 14. 000 (!) Stück."

Steiermark: Horst in Oberjassingau-Pretterau, 1000 m NN, bei Eisenerz. 29. 4. Paarung am Strenitzkogel beobachtet (WWe).

Adlerbussard, Buteo rufinus

WLe sah am 22. 6. über dem Osthang des Heuberges/W bei günstigen Lichtverhältnissen einen Bussard, welchen er aufgrund seiner Färbung und des Fehlens einer Schwanzbänderung als Adlerbussard bestimmte.

Sperber, Accipiter nisus

Vorarlberg: Ein Bp bei Rankweil. Die jagenden ad. im März, April und Mai mehrfach über dem Ort und in dessen Umgebung. Am 4. 7. 4 juv. Ex. auf Ast in der Nähe des Horstes. Am 7. und 19. 8. wieder jagende Ex. in Rankweil (EDo). - 14. 4., 19. 7. und 27. 8. je 1 Ex. im Lauteracher Ried (RPe). - 25. 6. 1 Ex. mit Beute im Schwarzachtobel (RPe).

Kärnten: Als Nachtrag zum Sommer 67 sei die Beobachtung von WWr, der am 29. 8. 67 1 W. am Ufer des Glanzsees im Kreuzeckgebiet in 2160 m NN sah, erwähnt.

Niederösterreich: 12. 5. 1 Ex. mit Beute Meiselsdorfer Teich (EDu); 9. 6. 1 Ex. Klosterneuburg-Weidling (BStr); 23. 7. 1 Ex. Greifenstein (EDu).

Habicht, Accipiter gentilis

Vorarlberg: Je ein Paar bei Röthis und Rankweil; am 12. 6. Bettelrufe von juv. in Horst auf Fichte (EDo). Brut bei Langenegg, am 27. 7. betteln juv. nach Futter (RPe). Im März und April 9 Beobachtungen im Lauteracher Ried (RPe).

Steiermark: 23. 3. 1 W. bei Eisenerz (WWe).

Niederösterreich: 3. 3. 1 Ex. Preßbaum, Wienerwald (GSp), 10. 3. 1 Ex. Baumgarten, March (WSch), 10. 3. 1 Ex. Mühlleiten (HWi).

Burgenland: 19. 4. 1 Ex. Schützen (EDu, BLei).

Rotmilan, Milvus milvus

6. 7. 1 Ex. Fußacher Bucht, 14. 7. 2 Ex. Weitried Rankweil (EDo).

Schwarzmilan, Milvus migrans

Vorarlberg: In der Rheinebene und im Pfändergebiet 7 Bp festgestellt (VB1, EDo). Salzburg: 2-3 Ex., vermutlich umherstreifende Nichtbrüter, am 8. 6. nördl. des Wallersees (FWo).

Niederösterreich: Zahlreiche Meldungen verschiedener Beobachter (EDu, MDA, JRe, FBö, HMBi, ABi, AHR, BLei, GSp, KPau) lassen eine grobe Bestands-schätzung zu. Es wurden 10-12 Paare beobachtet, davon ca. 10 östl. Wien und 2 in den Donauauen westl. davon. Berücksichtigt man, daß einige als Brutplatz in Frage kommende Gebiete nicht kontrolliert wurden, sind für 68 15-20 Bp in diesem Bundesland anzunehmen.

Burgenland: 25. 4. 1 Ex. bei Nickelsdorf (JRe); 28. 4. 1 Ex. Illmitz (GSp); 2. 5. 1-2 Ex. Lange Lacke (MDa, WLe); 1. 6. 1 Ex. Hansag (ABi).

Wespenbussard, Pernis apivorus

14. 7. - 5. 8. Weitried Rankweil/V (EDo); 7. 7. Marchegg/N (KMa).

Rohrweiße, Circus aeruginosus

Brutbestand im Seewinkel/B nach Beobachtungen von ABi, JRe, GSp, BStr wie im Vorjahr ca. 10 Paare.

Wiesenweihe, Circus pygargus

Eine einzige Meldung !: 18. 7. 1 juv. Ex. Paulhof, Seew./B (JRe).

Baumfalke, Falco subbuteo

Vorarlberg: Mehrfache Beobachtung an vier Standorten: Lauteracher Ried (EDo, RPe Meiningen (26. 6. Bettelrufe - EDo), Bangs (EDo), Langenegg (RPe).

Niederösterreich (und Wien): Während der Brutzeit beobachtet b. Laxenburg (28. 7. 2 juv. 1 ad. - EDu), Schönau a. d. Donau (EDu), Lobau/W (ABi), Zentralfriedhof/W (EDu).

Burgenland: 25. 5. 1 Ex. Nickelsdorf (JRe), 25. 5. 1 Ex. Rust (GSp), 30. 5. 1 Ex. Illmitzer Wäldchen (GSp), 27. 7. 1 Ex. Neusiedl (GSp).

Wanderfalke, Falco peregrinus

Vorarlberg: An einem der beiden Brutplätze 67 konnte 68 nur 1 M. (den Winter über und das Frühjahr bis 6. 6.) beobachtet werden, welches dort seinen Schlaf- und Fraßplatz hatte (EDo). Am zweiten Platz wahrscheinlich wieder erfolgreiche Brut, wenngleich vom Beobachter keine juv. gesehen (VB1). An zwei weiteren Plätzen jeweils Paare beobachtet (RPe, KMa). - RPe sah am 6. - 8. 4., 13. 4. und 8. 6. je 1 Ex. im Lauteracher Ried, am 26. 5. 1 Ex bei Feldkirch.

Salzburg: Von drei bekannten Brutplätzen liegen keine Meldungen vor. An einer Felswand in der Umgebung von Abtenau im Juni 1 M. (AAu, KMa).

Steiermark: An einem Platz, an dem 67 noch erfolgreich gebrütet worden war, 68 nur 1 Ex. zu beobachten (EHa). 1 Ex. am 27. 7. bei Graz (WWe).

Oberösterreich: Am 25. 4. 1 Ex. bei Klaffer, Mühlv. (EPe).

Würgfalke, Falco cherrug

An einem der niederöst. Brutplätze wurde 68 das Bp angetroffen (WSch, HWi), die anderen Stellen dürften nicht kontrolliert worden sein. - Am 4. 5. 1 Ex. im Hansag bei Taden/B (GSp).

Rotfußfalke, Falco vespertinus

Nachtrag zum ID 7: Einen Tag vor dem im letzten ID angegebenen Erstdatum konnte MA_n bereits 10-11 MM. am Mühlteich in Kirchberg an der Raab/St zwischen 1830 und 1900 Uhr über Wasser und Wiesen auf Insektenfang beobachten. Am 21. 4. sah J. Heister 17 MM. und 2 WW. (!) am Nordrand des Flugplatzes Graz-Thalerhof beim Insektenfang.

Weitere Beobachtungen: 3. 6. 1 M. 2 W. Auerlacke, Seewinkel/B, 17. 6. 1 M. ebd. (GSp). 21. 7. (!) 1 M 1 W. Staatsgrenze bei Halbthurn/B (WLe - Brut ?).

Rötelfalke, Falco naumanni (zusammengestellt von W. Wruß)

In ganz Kärnten ca. 70-100 Bp geschätzt, das ist ungefähr 30-50% des Bestandes von 1966 ! 67 war der Bestand etwas größer als 68. Die Anzahl der Jungen betrug 68 meist nur 1-3, ganz selten 4; im Rekordjahr 66 waren es dagegen 2-4 Junge, manchmal sogar 5. Auf ungefähr denselben Plätzen konnten 1966 249 Ex., 1967 95 Ex. und 1968 68 Ex. beringt werden.

Turmfalke, Falco tinnunculus

Vorarlberg: Mind. 3 Bp am Känzele bei Bregenz (VB1); 14. 4. 5 balzende Paare im Lauteracher Ried (RPe); 4 Bp im Raum Weitried Rankweil-Koblach, 3 Bp an den Steinbrüchen Unter- und Oberklien bei Hohenems, 3 Bp an der Nordseite des Kummenberges bei Götzis (EDo). - Am 7. 8. 17 diesj. Ex. im Weitried Rankweil auf Telegraphendrähten (EDo).

Steiermark: Erfolgreiche Brut in Felswand unterhalb der Ruine Wolkenstein bei Wörschach, 4 Junge fliegen in der letzten Juliwoche aus (HFr).

Niederösterreich: Horste bei Hohenau (9. 6. 4 und 6 juv.), Gänserndorf (9. 6. 4 juv.), Deutsch Wagram (30. 6. 5 juv. - alle Beobachtungen von WSch), Marchegg (23. 6. 4 juv. in ehemaligem Nachtreiherhorst - AHR), Fischamend (GSp).

Burgenland: Bei St. Andrä am 22. 6. 2 Horste mit 3 bzw. 5 juv. (WSch); 12. 5. 1 Horst auf Strohtriste bei Auerlacke, Seew., mit 1 frischgeschlüpftem juv. (GSp). Weitere Horste am Illmitzer Zicksee und in der Hölle, Seew. (ABi).

Alpenschneehuhn, Lagopus mutus

2. Ex. am 3. 7. beim Hochjochferner, 2980 m NN, Öztaler Alpen/T (ILu). 21. 7. Henne mit ca. 8 halbflüggen juv. Lesachtal/K bei 2372 m (JSi).

Birkhuhn, Lyrurus tetrix

Niederösterreich: 2. 6. 1 M Bruneiteich, Waldv. (ILu).

Oberösterreich: 31. 3. 1 M. 5 WW. Klafferteich, 14. 4. 11 MM. Seitelschlag, Gem. Ulrichsberg; 19. 4. 3 MM. 1 W. Angerhäuser, Gem. Schwarzenberg, später bei Seitelschlag 12 MM. (alle Orte im Mühlv. - EPe).

Kärnten: 21. 7. 1 M. Plenge, 2370 m, Lesachtal (JSi).

Auerhuhn, Tetrao urogallus

Oberösterreich: 24. 4. 7 MM., 25. 4. mind. 7 MM. und mehrere WW. Lange Au,

Sandl bei Freistadt, Mühlv. (HRei). 4. 5. 9 MM. 1 W. Sonnenwald, Gem. Aigen/Mkr. (EPe).

Steiermark: 19. 5. 1 M. Tulleck b. Eisenerz, 1500 m (WWe). 20. 7. 1 M und 21. 7. 1 W. mit 6 bereits flüggen juv. Leistalm, Stainach, ca. 1300 m (HFr).

Rebhuhn, *Perdix perdix*

Am 1. 6. ein Paar mit frischgeschlüpften pulli bei Marchegg/N (KMa).

Wachtel, *Coturnix coturnix*

Im Sommer 68 im Lauteracher und Dornbirner Ried/V gehört (VBl). 9. 5. 4 Ex. Seewinkel/B, 27. 6. 1 Ex. Zurndorf/B, 4. 7. 2 Ex. bei Andau/B jeweils gehört (JRe).

Wasserralle, *Rallus aquaticus*

28. 4. 1 Ex. Wolfsteich, Weinv./N (ILu). April, Mai und Juni 1 Ex. an den Neudauer Teichen/St gehört, am 12. 8. dann 3 Ex. (FSa). Vom 4. 7. bis 21. 7. 2-3 Ex. an den Güssinger Teichen/B (FSa). Aus dem alpinen Bereich Österreichs nur eine einzige Meldung: Zwischen 3. 5. und 2. 6. Balzrufe im Hörfeldsumpf, Bez. Murau/St (EHa).

Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana*

9. 7. 1 Ex. ruft nachts bei der Rheinmündung, Bodensee/V (RPe). 25. 7. 1 Ex. Neusiedlerteich/B bei Nahrungssuche (EDu).

Wachtelkönig, *Crex crex*

Im Sommer 68 keine Beobachtungen in der Oststeiermark (HHa - vgl. ID 4). - Am 23. 5. 1 Ex. Marchufer/N (MGa). - Am 30. 6. 3 rufende Ex. bei Bangs/V (EDo), ferner Sommerbeobachtungen von je 1 Ex. im Lauteracher und Dornbirner Ried/V (VBl). Nach den Untersuchungen von EDo blieb der Brutbestand im Raum Meinungen-Brederis, Rheinebene/V, in den letzten drei Jahren gleich (4 rufende Ex.), 1965 hatte der Beobachter noch 5 rufende Ex. feststellen können.

Teichhuhn, *Gallinula chloropus*

Im Rheindelta/V 6 führende Ex. gesehen (VBl); Krummauer Moor b. Admont/St 3. 6. mehrere Ex. (WWe); - 1. 6. frischgeschlüpfte pulli bei Marchegg/N (KMa); 7. 7. 4 ad., 3 große juv. und 4 pulli Großenzersdorfer Arm, Lobau/W (EDu).

Bläßhuhn, *Fulica atra*

Rheindelta/V nach unvollständiger Zählung 125 führende Ex.; Schätzung 150 erfolgreiche Paare (VBl). - 4. 5. Laaerberg/W 1 Ex. mit 3 sowie 1 Ex. mit 1 pull. (ABi); 3. 6. Auerlacke, Seew./B ca. 80 ad. mit zahlreichen pull. (GSp).

Großtrappe, *Otis tarda*

31. 3. 3 M. 10 W. östl. Andau/B (WLe); 4. 4. 33 Ex. nahe Andau/B (JRe); 5. 4. 4 Ex. Hansag b. Taden/B (JKö); 12. 4. 1 Hahn im Raum Kittsee-Pama/B geschossen (nach GSp); 19. 4. 6 balzende MM. und 14 WW. Hansag b. Andau/B (GSp); 21. 4. 3 Ex. zwischen Zurndorf und Deutsch Jahrdorf/B (! - WFe); 1. 6. 1 M. im Hansag/B (ABi).

Kiebitz, *Vanellus vanellus*

Aus dem westlichen Österreich liegen für 68 teils sehr genaue Bestandsangaben vor. So meldet VBl aus dem Bodenseegebiet/V: 108 Bp Rheindelta, 2 Bp Lauteracher Ried, 2 Bp Schweizer Ried, 1 Bp Dornbirner Ried, 4 Bp Lustenauer Ried. Im Weitried Rankweil nach EDo 8 Bp. - Im Flachgau/S nach FWo 70-80 Bp. - Die Beobachtungen

von 10 Ex. am 4. 5. am Stausee Schärding/O bzw. 64 Ex. am 11. 5. am Stausee Obernberg-Mühlheim/O (FGr) betreffen offenbar Nichtbrüter, die Art brütet aber auch am Stausee Schärding, ebenso auf Wiesen und Feldern um Viehausen bei Reichersberg. FGr stellte in den letzten Jahren entlang des Inn eine Zunahme und Ausbreitung fest (z. B. Taufkirchen/Pram, Suben, St. Marienkirchen b. Schärding, Sigharting); wie auch andernorts brütet hier der Kiebitz zunehmend erfolgreich in Getreidefeldern. - Am Furtnersteich/St in 1000 m NN 6 Bp, neue Brutplätze im Bez. Murau/St in 960 m (EHa - vgl. Lungau-Vorkommen ID 3, p. 9). - Aus den Niederungsgebieten Ostösterreichs, wo eine Bestandsaufnahme kaum durchführbar ist, wären wenigstens Schätzungen erwünscht. Die Meldungen zeigen lediglich, daß sich um Mitte Juni Jungvögel mit Artgenossen zu großen Trupps zusammenschließen (z. B. Seewinkel - JRe, EDu, GSp).

Flußregenpfeifer, Charadrius dubius

Der Brutbestand im Seewinkel/B scheint in Jahren mit durchschnittlichem Wasserstandsverlauf am geringsten, in Extremjahren am stärksten zu sein. In den sehr nassen Jahren 1965 und 66 wurden die überschwemmten Äcker besiedelt, im extrem trockenen Frühjahr 1968 die ausgetrockneten schottrigen Lackengründe. Bruten: Schottergrube Podersdorf 2 Bp, Grundlacke 3-4 Bp (13. 6. 20 Ex. ! - EDu), Baderlacke 1 Bp, wahrscheinlich Bruten an Holden-, Pimez-, Ganslacke und den traditionellen Brutplätzen Illmitzer Zicksee und Lange Lacke (ABi, EDu, BLei). Mehrere Brutmeldungen aus Vorarlberg: 2 Bp Rheinmündung, 1 Bp Achenmündung (VBl), 1 erfolgreiches Bp auf Kiesbank am Rhein bei Bangs (EDo). Weitere Brutnachweise aus Kärnten: 1 ad. und 1 juv. Gurkmündung (VWr), Salzburg: erfolgreiche Brut im Kasernengelände Siezenheim (Oberst F. Lacchini), Niederösterreich: 1 Bp Schottergrube bei Zeiselmauer (KPau). Bemerkenswerte Einzelmeldungen aus dem Juni (1 Ex. Bruneiteich b. Thaures/N-ILu) und Juli (Großwilfersdorf/St - HHa, FSa).

Seeregenpfeifer, Charadrius alexandrinus

Brutverteilung im Seewinkel/B: 1 Bp Pimezlacke (ABi), 2 Bp Ganslacke (MGa), mind. 1 Bp. Grundlacke (BLei), 1 Bp Schottergrube Podersdorf (AFe), 5 ad. + 2 pull. Oberstinker (GSp). Mehrere Paare an Podersdorfer und Fuchslochlacke, die Hauptkonzentration am Illmitzer Zicksee, Gsigsee, an der Langen Lacke; dagegen nur mehr 3 Bp am Ostufer des Neusiedlersees, wohl infolge der fortschreitenden Vergrasung (AFe).

Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus

Erfolgreiche Brut in den Seetaler Alpen/St, weitere Brutnachweise aus dem Gebiet erbracht, 11 Beringungen (EHa).

Kiebitzregenpfeifer, Fluvialis squatarola

Nur eine Hochsommermeldung: 9. -12. 7. 1 Ex. Sandinsel, Rheindelta/V (RPe).

Bekassine, Gallinago gallinago

Genau Brutbestandsaufnahmen aus dem Bodenseegebiet und aus Salzburg: 15 Bp Rheindelta, ca. 3 Bp Lauteracher Ried (VBl), 13-16 Bp Salzburg (FWo). Balzende Ex. an der Pimezlacke, Seew./B (BLei) und bei Breitensee, Marchegg/N (BLei) sowie am 2. 6. am Bruneiteich/N (ILu). Brutverdacht weiters im Hörfeld, Bez. Murau (bis 10. 6. 1 balzendes Ex. - EHa) und am Innstausee Schärding bei Reichersberg/O (FGr). Ab Anfang Juli umherstreifende Ex.: 9. 7. 8 Ex. Sandinsel und 21. 7. 23 Ex. Sumpfwiesen bei Hard/V (RPe); 30. 7. 1 Ex. Großwilfersdorf/St (HHa).

Waldschnepfe, Scolopax rusticola

Bei Rankweil am 2. 7. 2 Ex., 28. 7. 3 Ex. (EDo).

Großer Brachvogel, Numenius arquata

Die Brutbestände zeigen fast überall eine bedenkliche Abnahme, obwohl sich die Art gebietsweise auf Brutten in Kulturland umzustellen beginnt (z. B. 9. 4. Vierergelege in Winterweizen bei Gramatneusiedl/N - WFe). - Die Bestandserhebungen in der Rheinebene/V ergaben für 68: 25 Bp Rheindelta, 3 Bp Lauteracher Ried, 1 Bp Schweizer Ried, 4 Bp Dornbirner Ried, 1 Bp Lustenauer Ried (VBl), nur mehr 1 Bp (!) im Weitried Rankweil (EDo). - Der Bestand an den Seen und in den Mooren des Salzburger Flachgaus betrug nach den Angaben von FWo 19-20 Bp. - Brutverdacht besteht neuerdings wieder für das Ostufer des Neusiedlersees (ABi). Anfang Juli bereits Umherstreifende: 5. 7. 1 Ex. ruft über Güssinger Teich (FSa), 31. 7. 2 Ex. Lange Lacke, Seew. (BLei, KMa).

Uferschnepfe, Limosa limosa

Am 23. 6. wurden im Seewinkel/B 1514 Ex. dieser Art gezählt (HWi). Der größte Einzeltrupp: 20. 7. ca. 700 Ex. nahe Paulhof (WLe). Das Sommermaximum im Rheindelta/V betrug dagegen nur 18 Ex. am 21. 7. auf überschwemmten Wiesen bei Hard (RPe). Nur wenige Brutmeldungen liegen vor, sieht man von Einzelmeldungen aus Seewinkel und Hansag ab (so etwa 3 erfolgreiche Bp im Rheindelta - VBl, RPe).

Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus

Im Neusiedlerseegebiet/B durchlaufend beobachtet; so am 23. 6. 27 Ex. im Seewinkel (HWi), im Verlauf des Juli nur einzelne, dann am 31. 7. wieder 11 Ex. an drei Lacken (BLei, KMa). Rheindelta/V: Je 1 Ex. am 16. 7. (VBl) und 21. 7. (RPe).

Rotschenkel, Tringa totanus

Das Brutvorkommen am Wallersee/S ist erloschen (FWo). Brutverdacht am Bruneiteich/N: Am 2. 6. 2 Ex. (ILu). - Bereits im Juni die ersten umherstreifenden Ex.: 5. 6. 1 Ex. Neudauer Teiche/St (BWei). - Julidaten außerhalb des Neusiedlerseegebietes: zwischen 10. und 20. 7. 2-6 Ex. Rheindelta/V (VBl, EDo, RPe).

Grünschenkel, Tringa nebularia

Aus dem Neusiedlerseegebiet fehlen Sommerdaten, im Rheindelta wurden dagegen am 5. 7. 1 Ex. (VBl), 12. 7. 5 Ex. (RPe), 18. 7. 3 Ex. (VBl) und 19. 7. 6 Ex. (RPe) beobachtet.

Waldwasserläufer, Tringa ochropus

Eine weitere Junibeobachtung (vgl. ID 7): 27. 6. 1 Ex. Lauteracher Ried (RPe). Verstärktes Auftreten dann wieder ab dem zweiten Julidrittel: 10. 7. Rufe um 23, 40 Uhr über Wien (BLei); 12. und 19. 7. 3 Ex. Rheindelta/V, 21. und 30. 7. 2 Ex. Lauteracher Ried (RPe); 21. 7. 1 Ex. bei Ilz/St (HHa).

Bruchwasserläufer, Tringa glareola

HWi zählte am 23. 6. 12 Ex. im Seewinkel/B, im Juli sank die Zahl der dort Überwinternden noch weiter. Dagegen während des ganzen Juli in beachtlicher Anzahl im Rheindelta/V zu beobachten: 7. 7. 21 Ex. (EDo), 12. 7. 58 Ex., 21. 7. 71 (!) Ex. bei Hard (RPe). - Am 28. 7. 1 Ex. bei Ilz/St, 30. 7. 1 Ex. bei Großwilfersdorf/St (HHa)

Teichwasserläufer, Tringa stagnatilis

Eine Beobachtung von 3 Ex. am 19. 4. an den Neudauer Teichen/St (BWei) rundet das Bild des starken Aprileinfluges der Art ab. Erstmals auch eine Hochsommerbeobachtung: am 31. 7. 1 Ex. Fuchslochlacke, Seew./B (BLei, KMa).

Flußuferläufer, Tringa hypoleucos

Nur wenige Junibeobachtungen: 16. 6. 1 Ex. Innstausee St. Florian-Schärding/O (FGr), 23. 6. 1 Ex. Seewinkel/B (HWi).
Brut: ca. 5 Paare Rheindelta/V (VBl). 26. 5. 2 ad. + 4 pull. (noch im "Nest") sowie 8 weitere ad. bei Fürstenfeld/St! (FSa). - Wie alljährlich dann zahlreiche Julidaten (Rheindelta/V am 31. 7. z. B. 70 Ex. - VBl; Haselteich b. Ilz/St - HHA; Eisenerz-Seeau/St - WWe; Laxenburger Teich/N - EDu; Seewinkel/B - EDu).

Zwergstrandläufer, Calidris minuta

21. 7. 1 Ex. Murstausee Gralla/St, südl. von Wildon (MAn).

Temminckstrandläufer, Calidris temminckii

31. 7. 2 Ex. Illmitzer Zicksee, Seew./B (BLei, KMa).

Alpenstrandläufer, Calidris alpina

6. 7. 2 Ex. Rheindelta/V (RPe); 31. 7. 6 Ex. Lange Lacke, Seew./B (BLei, KMa).

Kampfläufer, Philomachus pugnax

Im Neusiedlerseegebiet am 23. 6. nur 129 Übersommerer (HWi), am 31. 7. dagegen wieder 60 Ex. Oberstinker, 5 Ex. Illmitzer Zicks., 8 Ex. Lange Lacke, 100 Ex. Hutweidelacke, 300 Ex. Fuchslochlacke (BLei, KMa). 4. 7. 4 MM Güssinger Teich/B (FSa). 12. 7. 2 MM. Sandinsel Fußach/V (RPe).

Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta

Brutbestand im Seewinkel/B 60-65 Paare, ziemlich gleichmäßig verteilt; auffallende Massierung nur an der Wörthenlacke: am 21. 4. 48 Ex., dicht besetzte Kolonie auf kleiner Insel (BLei).

Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius parasiticus

19. 7. 1 Ex. ad., helle Phase, Hagenauer Bucht, Innstau Simbach-Braunau/O (GEr); vermutlich das gleiche Ex. am 25. 7. von Pointner und Windsperger an der Innbrücke Simbach-Braunau beobachtet (nach GEr).

Heringsmöwe, Larus fuscus

2. 7. 1 ad. Wörthenlacke, Seewinkel/B (BLei).

Silbermöwe, Larus argentatus

Immat. Großmöwen, Larus argentatus/fuscus

Murstausee Gralla/St: am 21. 7. 1 ad. Silberm. (mit gelben Beinen) und 1 immat. (MAn Seewinkel/B: 17. 6. 34 Ex. Oberstinkersee (GSp); 31. 5. 58 Ex., davon 26 ad. Silbermöwen, Stinkerseen (BLei, KMa); 25. 7. 4 Ex. Lange Lacke (EDu).
Rheindelta/V: am 7. 7. 12 immat. (VBl, RPe); die Zahl steigt ab diesem Zeitpunkt stark an und erreicht am 17. 7. mit 52 Ex. ihr Maximum (VBl); dann bis zum 2. 8. Absinken auf 11 Ex. (VBl).

Sturmmöwe, Larus canus

Rheindelta/V: 3 Bruten mißlingen (Erstbrüter ?), jeweils 1 Ei wurde verlassen.
Die Gelege befanden sich einmal auf Erdhaufen, zweimal auf angeschwemmten Baumwurzeln. Möglicherweise war in der Fußacher Bucht ein Paar schließlich doch erfolgreich (VB1).
Innstauseen/O: am 12.6. 2 ad. Ex. am Inn-Salzach-Zusammenfluß unter Lachmöwen (GER, Pammer).
Seewinkel/B: 4.5. 1 ad. Ex. Zicksee b. Illmitz (MDa).

Schwarzkopfmöwe, Larus melanocephalus

Am 11.5. 1 Ex. ad. an der Rheinmündung, Bodensee/V (VB1, EDo); 23.5. 1 ad. Sandinsel Fußach; 27.5. 1 immat. 4.6. 1 ad. 2 immat.; 8.6. 5 immat.; 11.6. 1 ad. ebd. (VB1).

Lachmöwe, Larus ridibundus

Vorarlberg: Schätzung der wichtigsten Kolonien ergab 1380 Paare; insges. wohl mehr als 1500 Bp ! (VB1).
Oberösterreich: 4.5. 80 Ex. Innstausee Schärding bei Reichersberg; auf Insel kleine Brutkolonie zu sehen, 2 brütende Vögel auf Weidenstrünken knapp über Wasser. Diese Kolonie war in den vergangenen Jahren bedeutend größer (FGr).
Niederösterreich: 2.6. ca. 100 Ex. Bruneiteich b. Thaur, Brut ? (ILu).
Burgenland: 31.7. ca. 1000 Ex. Lange Lacke (BLEI, KMa).

Zwergmöwe, Larus minutus

Rheindelta/V: Etwa 26 immat. Ex. übersommern (VB1, EDo). Am 6.7. 2 ad. (RPe), am 8.7. 3 ad. (VB1).
Seewinkel/B: 17.6. 1 immat. Auerlacke (GSp); 20.7. 5 immat. Lange Lacke (WLe).

Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger

10.6. 8 Ex. Neusiedlersee/B (GSp); 12.6. 10 Ex. Wörthersee/K (JRe); 15.6. ca. 30 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa); 17.6. 61 Ex. Seewinkel/B (GSp); 4.7. 3 Ex. Neusiedlersee/B (GSp); 6.7. 14 Ex. Rheindelta/V (RPe); 25.7. 2 Ex. und 31.7. 18 Ex. Seewinkel (EDu, BLEI, KMa).

Weißbartseeschwalbe, Chlidonias hybrida

4.7. 1 ad. Güssinger Teiche/B (FSa) - für 1968 die fünfte Beobachtung in Österreich !

Raubseeschwalbe, Hydroprogne caspia

1.7. 1 Ex. und 3.7. 2 Ex. Hagenauer Bucht, Innstausee Ering-Frauenstein/O (GER); 20.7. je 1 Ex. in der Fußacher Bucht, Rheindelta/V (EDo) und auf der Grundlacke, Seew./B (WLe).

Flußseeschwalbe, Sterna hirundo

Rheindelta/V: Bregenzer Ache 40 erfolgreiche Paare, davon 19 durch Nachgelege; Hard 15 Paare; Sandinsel 18 Paare, fast alle wegen Störung ohne Erfolg; Rheinholz ca. 100 Paare (VB1). Am 21.5. 4 ca. 3 Tage alte juv. (VB1).
Seewinkel/B: Am 11.6. 2 Gelege auf der Pimezlacke; beim ersten 1 pull. frisch geschlüpft, 1 Ei gepickt; das zweite Gelege wird am 12.6. noch bebrütet (JKö). Von den anderen Brutplätzen keine Meldung.
Am 2.6. stellte ILu 5 Paare am Bruneiteich b. Thaur/N fest.

Hohltaube, Columba oenas

Zu den im ID 7 gemeldeten Beobachtungen kommen nur zwei weitere von bekannten Brutplätzen: Praterau/W und Laxenburg/N (EDu).

Ringeltaube, Columba palumbus

WSch fand am 24. 3. im nördlichen Albrechtsfeld/B eine Kolonie mit ca. 50 (!) Nestern in einem überschwemmten Pappelwäldchen. - EDu beobachtete noch am 23. 7. 1 Ex. beim Nestbau.

Türkentaube, Streptopelia decaocto

In Dornbirn seit 1964 Brutvogel (2 Bp), 1968 mind. 4 Bp. Erstmals auch in Meiningen/V in einem Paar brütend (EDo). - In Eisenerz/St am 27. 3. ein Gelege auf Dachboden entdeckt (WWe).

Kuckuck, Cuculus canorus

7. 7. flüggeltes juv. wird in Lobau/W von Drosselrohrsänger gefüttert (EDu). - Im Juli in Hofing bei Ilz/St Bachstelzenpaar als Kuckuckswirt (HHa).

Schleiereule, Tyto alba

Am 13. und 31. 5. an zwei verschiedenen Beobachtungsplätzen in der Rheinebene/V (EDo).

Zwergohreule, Otus scops

Ab 11. 5. ein Pärchen bei Neudau/St (BWei).

Uhu, Bubo bubo

Steiermark: 12. 1. erste Balzrufe, 15. 1. 1 Ex. an Leitungsdraht verunglückt, 27. 5. erfolgreiche Brut (EHa). - An einem zweiten Platz erstmals seit 8 Jahren wieder festgestellt (WWe).

Sperlingskauz, Glaucidium passerinum

WSch fand wiederum drei Bruthöhlen zwischen Stainach und Liezen/St in 1100, 1400 und 1650 m NN. Sie enthielten am 2. / 3. 6. 3 (ca. 4 Tage alt), 4 (ca. 16 Tage alt) und 4-5 (ca. 1 Woche) Junge. Höhlenbaum war jedesmal eine Fichte, die Bruthöhlen befanden sich in 8-9, 7 und 5 m Höhe, ihre Öffnung war zweimal gegen Ost, einmal gegen Süd gerichtet. -

14. 6. 1 rufendes Ex. Laternsertal/V, ca. 1500 m NN; 28. 7. 1 rufendes Ex. sowie Sichtbeobachtung ober Dornbirn in ca. 1500 m NN (EDo).

Steinkauz, Athene noctua

Vorarlberg: Beobachtungen während der Brutzeit im Lauteracher Ried (EDo, RPe), in Rankweil (EDo), bei Koblach (EDo), in Langenegg (RPe).

Niederösterreich: Beobachtungen während der Brutzeit beim Schönauer Teich, Triesterstr. (EDu), bei Hohenau (Stadel - WSch), Bruck/Leitha (Kastanienallee - WSch). BNW bei Marchegg: am 23. 5. 4 ca. 3 Tage alte Junge in der Wandverkleidung eines Stadels, W. hudert, mehrere Sperlinge als Vorrat im Nest (WSch).

Burgenland: Beobachtungen während der Brutzeit: Panzergraben Neusiedl, Steinbruch Gols, Gattendorf (Kopfweide), Wilhelmshof b. St. Andrä (alle von WSch), Neudegg, Seew. (WWa). BNW: 22. 6. in Nußbaum bei Wallern 4 ca. 20 Tage alte Junge. 22. 6. in Kapelle bei Parndorf 2 ad. mit 2-3 bereits flüggeltes juv. (beide von WSch).

Waldkauz, Strix aluco

- Vorarlberg: Wie im Sommer 67 auch 68 erfolgreiche Brut in Kirchturm (VBl, RPe).
Am 15. 4. im Frutzauenwald (72,5 ha) 1 rufendes Ex., am 17. 4. im Vorderwald Rankweil (568 ha) 2 rufende Ex. (EDo). 20. 7. 1 juv. im Fußacher Ried (EDo).
- Steiermark: 6. 6. bettelnder juv. bei Eisenerz, ca. 700 m (WWe).
- Niederösterreich (mit Wien): 9. 5. 1 toter, ca. 3 Wochen alter juv. bei Baumgarten/March (BLei). Im Mai brüten 2 WW. in etwa 40 m voneinander entfernten Kunsthöhlen am Wilhelminenberg, werden von einem M. versorgt ! Brut-erfolg: im ersten Kasten 1 juv. 3 abgestorbene Eier (Kasten vom Sturm beschädigt), im zweiten 3 juv. (WSch).
- Burgenland: Am 21. 3. bei Zurndorf unter Hochsitz 4 tote Ex. mit abgeschnittenen Läufen ! (JRe).

Waldohreule, Asio otus

- Vorarlberg: 15. 4. 2 rufende Ex. im Frutzauenwald (72,50 ha); 17. 4. 5 rufende Ex., im Vorderwald Rankweil (568 ha; EDo). 6 Bp im Lauteracher Ried (RPe).
Noch am 12. 8. rufen im Wolfurter Ried 2 bereits flügge juv. (RPe).
- Oberösterreich: 30. 7. juv. bei Eberschwang (DGr).
- Steiermark: 3. 6. 5 eben flügge juv. bei Fürstenfeld (FSa). Im Juni 4 juv. Wörschacher Moos, Ennstal (WSch).
- Niederösterreich: 27. 4. um 10,00 Uhr Balzrufe bei Fischamend (EDu). 18. 5. Nest mit 4 Eiern in Hollunderstrauch bei Zeiselmayer (KPau). 23. 5. Gänserndorf 2 juv., Silberwald b. Deutsch Wagram 3 Eier, Gelege zerstört, Deutsch Wagram ebenfalls Gelege von 3 Eiern zerstört, Obersiebenbrunn 1 juv.; 26. 5. Schwechat 1 juv. (alle Daten WSch).
- Burgenland: Aus dem Seewinkel 14 besetzte Nester gemeldet (JRe, WSch, WWa, HWi).
Jungenzahl: viermal 3, zweimal 2. WWa beobachtete einen Horsttausch zwischen Waldohreule und einem 30 m entfernt brütenden Turmfalkenpaar; eine Woche nach der Beobachtung des Tauschs lagen die Waldohreulen-Eier zerbrochen auf dem Boden unter dem ehemaligen Turmfalkenhorst, während der Turmfalke im ehemaligen Eulenhorst weiterbrütete. - Eines der beobachteten Nester befand sich in kaum 2 m über dem Boden (JRe).

Sumpfohreule, Asio flammeus

Im Seewinkel/B während des ganzen März noch an mehreren Stellen Durchzügler (MDa, BLei, HWi), ab April nur mehr im Hansag zu beobachten. Im Hansag zwischen Tadtten und Andau mindestens 3, vielleicht sogar 4 Bp (GSp, ABi, JRe, HWi). - 3. 5. 1 Ex. Weitried Rankweil/V (EDo).

Rauhfußkauz, Aegolius funereus

- Vorarlberg: 14. und 28. 6. je 1 rufendes Ex. im Laternser Tal auf ca. 1300 m; 28. 7. 1 rufendes Ex. oberhalb Dornbirn auf ca. 1500 m NN (EDo).
- Steiermark: 3. 6. Bruthöhle in Wörschachwald bei ca. 1100 m NN in Tanne (Schwarzspechthöhle in 14-15 m Höhe, gegen Süd exp.), W. schaut bei Kratzen an Stamm heraus. 5. 6. Bruthöhle in Hochwald am N-Fuß des Grimming in 700 m (!!), befindet sich 10 m hoch in einer Tanne, Inhalt 4 ca. 20 Tage alte juv. (WSch).
- Oberösterreich: 25. 4. 3 MM. rufen in der Langen Au, Sandl bei Freistadt, um 03,15 U. (HRei).

Alpensegler, Apus melba

Zwischen 7. und 26. 7. täglich 10-12 Ex. an besonnten Wiesenhängen bei Hinterbichl/OT; brutverdächtig im Dorfertal bei Hinterbichl. Am 21. 7. 2 Ex. auf der Plenge (2372 m), Lesachtal/K (JSi).

Eisvogel, *Alcedo atthis*

Während der Brutzeit (Mai/Juni) an zwei Stellen in V (EDo), an einem Platz in N (EDu) und in zwei Brutpaaren in der Oststeiermark beobachtet (FSa).

Bienenfresser, *Merops apiaster*

WFe kontrollierte alle ihm bekannten Brutplätze in N und B, fand jedoch nur einen der Plätze besetzt. Das einzige Brutpaar, von MGA bereits am 26.5. beobachtet, fütterte am 14.7. juv. in der Bruthöhle; am 27.7. standen die juv. unmittelbar vor dem Ausfliegen (WFe).

Blauracke, *Coracias garrulus*

18.5. 2 Ex. bei Feldbach/St, 1 davon in Holzbeton-Bruthöhle, welche in einzelner Birnbaum in ca. 5 m Höhe aufgehängt war; am 23.6. in dieser Höhle von J. Subaric 4 juv. beringt (MAN). - 27.6. 3 Ex. bei Nickelsdorf/B (JRe). - 21.7. 2 Ex. Parn-dorfer Platte/B (BLei).

Wiedehopf, *Upupa epops*

1965, 66 und 68 brütete ein Paar auf dem Dachboden einer Kirche nahe dem Klopeiner See/K, nur wenige Meter von 1-5 Paar Rötelfalken entfernt (WWr). - 23.7. 1 Ex. Greifenstein/N (EDu).

Grauspecht, *Picus canus*

Am 9.3. sitzt 1 W. im Steinbruch Unterklien/V ca. 10 min. auf einem Felsvorsprung und arbeitet mit Schnabel, streicht beim Auftauchen von Rabenkrähen ab (VBl).

Schwarzspecht, *Dryocopus martius*

Brutzeitbeobachtungen in Ostösterreich von Halbtorn/B (EDu), Schützen (BLei), Sauerbrunn/B (Dr. Freundl), Laxenburg/N (ABi), Rappoltenkirchen/N (JRe).

Blutspecht, *Dendrocopos syriacus*

18.3. - 6.4. Sauerbrunn, Rosaliengeb./B (Dr. Freundl); April mehrmals M. und W. Wien 18 (WWa); 12.5. 1 M. Kreuzberg, 1 Ex. Engelsdorf b. Eggenburg/N (EDu); 20.6. 1 W. mit flüggem juv. in Fürstenfeld/St (FSa); 13.8. 1 flügger juv. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa).

Weißrückenspecht, *Dendrocopos leucotos*

WWe kennt drei Brutreviere in der Umgebung von Eisenerz/St.

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus*

Vorarlberg: 14.6. bis 28.7. viermal im Laternsertal in 1300-1500 m NN beobachtet (VBl, EDo).

Steiermark: juv. um den 12.6. am Präbichl (Erzbergstraße, 1230 m) ausgeflogen; Höhle 4 m hoch in Fichte. Vorjährige Nisthöhle am Tulleck (vgl. ID 3) 68 nicht bezogen (WWe). 2.8. 2 Ex. in Lärchenhochwald Steinfeldalm b. Liezen (HFr, WSch). 19.8. 1 ad. füttert 1 juv. in ca. 1100 m bei Wörschach (HFr, WSch).

Kärnten: 17.6. 1 Ex. in ca. 1257 m bei Rautalm, Lesachtal (JSi).

Wendehals, *Jynx torquilla*

31.5. 1 Ex. Koblach/V, 30.6. 1 futterbettelndes Ex. ebd. (EDo). - 6.6. 1 Ex. Anger, Bez. Weiz/St (HHa).

Heidelerche, Lullula arborea

16. 4. bis 14. 8. 1 Paar Staudach b. Hartberg/St (FSa). 1. bis 9. 6. fünfmal 1-2 singende Ex. Kampsteiner Schwaig/N 1400 m NN (AHR). 2. 6. 1 singendes Ex. bei Josefthal, 2 Ex. bei Gopprechts, Litschau/N (ILu).

Haubenlerche, Galerida cristata

In Neudorf b. Ilz/St am 6. 6. 3 Ex., 6. 7. 1 Ex., 17. 8. 1 Ex. (HHa). - Weitere Beobachtungen aus der Brutzeit von Neusiedl am See/B, Parndorf/B und Wien 21 (JRe).

Feldlerche, Alauda arvensis

6. 7. 1 Ex. singt bei 2550 m oberhalb von Vent, Ötztaler Alpen/T (ILu).

Uferschwalbe, Riparia riparia

Niederösterreich: Brut bei Zeiselmauer: 9. 5. 4 Ex.; 14. 5. 2 Ex. beginnen an künstlich angelegtem Steilufer zu graben; 25. 5. eine Niströhre fast fertig; 26. 5. ein weiteres Ex. beginnt zu graben; 27. 5. 2 Niströhren fertig, insges. 5 Ex. zu beobachten; 20. 7. Junge der 1. Nisthöhle verlassen diese, die der zweiten liegen tot darunter (6 Ex.). Etwa 2,5 km von diesem Brutort entfernt eine große Kolonie mit ca. 100 Höhlen (KPau). - 23. 6. ca. 100 Ex. bei Schönau an der Donau (EDu).

Oberösterreich: 11. 5. 23 Nisthöhlen bei Obernberg (FGr).

Steiermark: jeweils bei Schlechtwettereinbruch mit Rauch- und Mehlschwalben über dem Furtnersteich zu beobachten (EHa).

Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris

Vorarlberg: Bei Hohenems am 31. 3. 18 Ex. (VB1). Am 26. 5. dort 2, am 21. 6. 3 fertige Nester. 28. 7. 3 juv. in Nest ebd. gefüttert (VB1). Bei Rankweil am 15. 4. 14 Ex. (EDo). Neuer Brutplatz bei Bregenz (VB1).

Osttirol: Zwischen 7. und 13. 7. 6 Ex. bei Hinterbichl beobachtet, ein Nest gefunden. Bei Annäherung an Felswand greift 1 Ex. im Sturzflug an (JSi).

Kärnten: 18. 4. 3 Ex. und 4 Ex. Dobratsch, Schütt (WFi).

Steiermark: 18-20 Bp am Puxerloch erfolgreich (EHa).

Rauchschwalbe, Hirundo rustica

6. 7. ca. 500 dj. Kalsdorf b. Ilz/St (HHa). - 8. 8. Nest mit 3 beinahe voll befiederter⁴ juv. unter einer Brücke bei Zurndorf/B; zwei andere Nester unter der gleichen Brücke leer (JRe).

Schafstelze, Motacilla flava

5. 5. 4 Ex. Bernhardsthaler Teich/N (MGa); 23. 5. 1 Ex. Untersiebenbrunn/N (MGa). Maskenstelze im Rheindelta/V (vgl. ID 7): 24. 6. Nest mit 4 juv. (soweit sichtbar); 29. 6. 2 juv. außerhalb des Nestes, 1 totes juv., 1 unbefr. Ei; 1 M. mit 3 flüggen juv. am 1. 7. (VB1).

Gebirgsstelze, Motacilla cinerea

26. 6. Nest mit 5 Eiern in Blumau b. Fürstenfeld/St (FSa); am Frutzbach b. Rankweil/V auf 7 km 5 Bp (EDo).

Brachpieper, Anthus campestris

20./21. 5. 1 M. im Balzflug singend bei Eggenburg/N (wie 1967; EDu); 25. 5. 1 Ex. Weingarten bei Ehf. Zurndorf/B (JRe); 27. 6. 2 Ex. Sandgrube b. Nickelsdorf/B (JRe).

Neuntöter, Lanius collurio

16.5. Nest mit 2 Eiern bei Illmitz/B (JRe); 25.5. 5 Paare auf kleinem Raum bei Bhf. Zurndorf/B brütend: 1 Nest mit 6 Eiern, 2 Nester mit je 5 Eiern, 2 Nester noch leer (JRe); 30.5. 2 Paare brüten in Sandgrube bei Illmitz/B: 1 Nest mit 5 Eiern, 1 mit 4 Eiern und 1 juv. (JRe); 3.6. Nest mit 5 ca. 6-7 tägigen juv. bei St. Andrä/B (ABi). - Bei Hinterbichl/OT sah JSi die Art zwischen 7. und 26.7. überall häufig und fast immer mit flüggen juv.; am 16.7. ein Nest mit 3 Eiern; höchster Beobachtungsort Hinterbichl, 1331 m.

Schwarzstirnwürger, Lanius minor

Burgenland: Unterstinkersee (Weingärten) 16.5. 1 Ex. (JRe) Paulhof 18.5. 3 Ex. (JRe), 16.6. 1 Ex. (GSp), 4.7. 2 Ex. (JRe)
St. Andrä 25.5. -3.6. 1 Ex. immer an gleicher Stelle (ABi); 11.6. Paar bei Nestbau (JKö).
Frauenkirchen-St. Andrä (Straße) 25.5. 1 Ex. (ABi)
Tadten 21.7. 3 Ex. (WLe)
Andau-Halbturm 21.7. 4 Ex., 1 weiterer tot (WLe)
Zurndorf 25.5. 1 Ex. (BStr)

Niederösterreich: Leitzersdorf (Birnenallee) 8.6. 4 Ex. (ILu)
Zeiselmauer 21.5. 4 Ex. an Brutplatz, 25.5. nur mehr 2 Ex., 2.7. Nest mit flüggen juv., 2 toten juv. und 1 tauben Ei (KPau).
Steiermark: Mutzenfeld b. Ilz 11.6. Nest sehr hoch auf freistehender Eiche (HHa).

Rotkopfwürger, Lanius senator

Aus ganz Österreich nur eine einzige Brut gemeldet: 29.6. 5 flügge juv. in der Rheinebene/V (EDo).

Raubwürger, Lanius excubitor

17.6. 2 ad, 4 juv. Rheinebene/V (RPe) - einzige Brutmeldung aus Österreich im Sommer 68.

Wasseramsel, Cinclus cinclus

Beobachtungen aus Ostösterreich:

Steiermark: 26.6. 1 eben flügges juv. Blumau b. Fürstenfeld (FSa).

Niederösterreich: 12.5. Pärchen bei Nest Hagenbachklamm, St. Andrä-Wördern (Prof. A. Jilka); 16.5. 2 Ex. füttern eben flügge juv. b. Zeiselmauer (KPau); 20.6. 1 Ex. Helenental b. Baden (EDu).

Burgenland: 14.4. 1 Ex. Zobernbach b. Pilgersdorf (JRe).

Alpenbraunelle, Prunella collaris

5.7. 1 Ex. singt bei 2900 m oberhalb Breslauer Hütte, Ötztaler Alpen/T (ILu). -

11.7. 1 Ex. singt bei 2700 m Schobergruppe/OT (ILu).

Rohrschwirl, Locustella luscinioides

Vom 28.4. bis 4.7. sang 1 Ex. im Schilf des Furtnersteiches/St. BNW konnte nicht erbracht werden. Letzte Beobachtung dort vor 94 Jahren durch P. Bl. Hanf (Frau I. Präsent nach EHa; HHa, Posch). - 4.7. 5 Ex. singen an den Güssinger Teichen/B (FSa). - 14.7. 1 Ex. Schönauer Teich, Triesterstr./N (EDu).

Schlagschwirl, Locustella fluviatilis

26.5. 1 Ex. singt in der Donau-Au westl. Greifenstein/N (EDu); 27.6. 1 Ex. singt an Komitatskanal b. Zurndorf/B (JRe).

Feldschwirl, *Locustella naevia*

Vorarlberg: 2 Ex. am 21.5. im Weitried Rankweil (EDo).

Niederösterreich: 9.5. 1 Ex. singt b. Baumgarten/March (BLEi); 11.5. 1 Ex. s. westl. Obersiebenbrunn (KMa, HWi); 12. und 20.5. 2 Ex. Meiselsdorfer Teich (EDu).

Burgenland: 1. und 25.5. 1 Ex. s. beim Neusiedler Teich (EDu); 24.5. 1 Ex. s. b. St. Andrä (BLEi); 30.5. 1 Ex. s. b. Taden (BLEi).

Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus*

In Niederösterreich während der Brutzeit in Laxenburg (3-4 s. - EDu), am Meiselsdorfer Teich (2 s. - EDu), beim Schönauer Teich, Triesterstr. (1 s. - EDu), am Laaerberg/W (1 s. - ABi). An den Neudauer Teichen/St wie im Vorjahr ca. 4 Paare brütend (BWei).

Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris*

13.6. Nest mit 5 Eiern Altenmarkt b. Fürstenfeld/St (FSa).

14.6. Nest mit 4 Eiern bei Fürstenfeld/St (FSa).

29.6. 4-5 Ex. an kleinem Bach b. Leitzersdorf/N (EDu).

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus*

26.5. 1 Ex. singt in dichtem Gebüsch (!) in der Donau-Au bei Kritzensdorf/N (EDu).

Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus*

3.6. 1 Ex. s. b. Admont/St (WWe). 19.6. 5 juv. in Nest an Güssinger Teichen/B (FSa).

Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla*

4.5. Nest mit 5 Eiern Zentralfriedhof/W, 1 ad. verleitet (ABi). 19.5. Nest mit 5 juv., ca. 7. Tag, in 1,20 m Höhe über Boden, Marchegg/N (KMa). 6.6. Nest mit sitzendem W. in ca. 7 m Höhe bei Anger/St (HHa). - 2.6. die erste diesj. in Marchegg/N gefangen (KMa).

Klappergrasmücke, *Sylvia curruca*

3.6. Nest mit 5 juv. ein Meter hoch in Wacholderstrauch, Kampstein/N bei ca. 1300 m NN (AHR).

Dorngrasmücke, *Sylvia communis*

18.5. Nest mit 4 juv., etwa 7. Tag, in Krautschicht knapp über Boden, bei Marchegg/N (KMa). 1.6. Pärchen füttert flügge juv., die bereits halblangen Schwanz haben, bei Marchegg/N (KMa).

Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*

25.5. Nest mit 2 Eiern (Gelege offenbar noch nicht vollständig) bei Zurndorf/B (JRe). 12. - 27.5. 3 Ex. s. bei Eggenburg/N (EDu). 14.7. Quäken von flüggen juv. bei Marchegg/N, außerdem 1 selbst. diesj. gefangen (KMa).

Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli*

5.5. 8-10 s. Ex. Hohe Wand/N (EDu). 5.6. Nest mit 6 Eiern Bez. Murau/St (EHa). 6.6. Laternserstraße/V 7 s. Ex. auf 3 km (EDo). 20.6. 2 ad. s. bei Baden/N, außerdem 1 Nest mit 4 juv. und 1 Ei (EDu). 7. - 13.7. zahlreiche Ex. Hinterbichl-Maurertal/OT in lockerem Lärchenwald mit Berberitzen-Unterholz singend, am 8.7. Nest mit 3 ca. 8-tägigen juv. (JSi).

Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix

21.6. 1 Ex. b. Ilz/St. - 23.6. Nest mit 5 ca. 7 tägigen juv. an 45° geneigtem Hang in lockerem Buchenwald b. Wallingalm, 900 m NN, Lammertal/S (ALi, KMa).
20.7. 1 flügges juv. wird im Dorngraben b. Weidlingbach/N gefüttert (EDu).

Grauschnäpper, Muscicapa striata

25.5. Balzfüttern, Zentralfriedhof/W (EDu). 13.6. Nestbau, Lobau/W (ABi). 13.6. Nest mit juv. im Torbogengerippe des neugotischen Hauptportals der Stiftskirche Admont/St, Warte des einen Altvogels unmittelbar daneben (LAsch). 15.6. 2 Ex. füttern, Nest unter Barackendach, Tull b. Eisenerz/St, 710 m NN (WWe).

Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis

9.6. ein Pärchen am vorjährigen Brutplatz, Leopoldsteinersee b. Eisenerz/St; am 11. und 13.6. noch im nahen Wald zu beobachten, am 18.6. nicht mehr dort, wahrscheinlich durch starke Beunruhigung (Schottergewinnung) vertrieben (WWe). 18.6. 1 M. an der Dornbirner Ache/V !! (RPe). 30.6. 1 Ex. bei Marchegg/N (EDu). 20.7. 2 flügge juv. Dorngraben b. Weidlingbach/N (EDu).

Zwergschnäpper, Ficedula parva

26.5. 2 vorj. Ex. bei Weidlingbach/N (EDu). 1.6. 2 singende Ex. Neuwaldegg/W (EDu). 20.7. 2 flügge juv. werden gefüttert, Dorngraben b. Weidlingbach, Wienerwald/N (EDu).

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata

Niederösterreich: Fischamend (12.4. 1 M. - GSp), Laaer-Berg (28.4. 3 M. 1 W. - ABi), Schönauerteich, Triesterstr. (7.4. 2 s. M., 14.7. 2 juv. - EDu), Enzersfeld (18.5. Paar mit 2 juv. - JRe), Grossschweinbarth (22.5. 1 Paar - JRe), Marchegg (KMa), Eggenburg (11.5. 1 M. s. - EDu).
Burgenland: Sandeck, Illmitz, Alter Seedamm b. Albersee, Panzergraben Neusiedl (alle ABi), Nickelsdorf (27.6. 2 Paare - JRe).

Braunkehlchen, Saxicola rubetra

Niederösterreich: Marchegg (26.5. 4 juv. in Nest, 13.6. bereits ausgeflogen - AHr, 30.6. 4-5 Ex. s. am Damm - EDu), Meiselsdorfer Teich (11.5. 3 Ex. - EDu), Teich b. Groß Radischen (2.6. ein Paar - ILu).
Burgenland: 25.5. 1 Paar Sandgrube b. Zurndorfer Bhf. (JRe). 29.5. 1 Ex. s. Salzige Seen (ABi). 1.6. 3 M. 2 W. Hansag; ein Nest mit 5 juv. ca. 4-tägig und 1 Ei, ein weiteres Nest mit 4 8-9-tägigen juv. und 1 Ei (ABi).

Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

24.4. Nest in Nistkasten, welcher am Balkon eines Wohnhauses im 3. Stockwerk, Prater/W, befestigt ist, fast fertiggestellt; 29.4. im gleichen Nest bereits 2 Eier (WFe).

Nachtigall, Luscinia megarhynchos

8. und 18.6. je 2 singende Ex. an der Dornbirner Ache/V (RPe). - 4.5. 10 singende Ex. Zentralfriedhof/W (ABi). - 10.6. 1 Ex. b. St. Andrä/B, Brutverdacht (JKö).

Blaukehlchen, Luscinia svecica

3.4. 1 Ex. St. Andrä/B (JKö); 12.-15.4. 1 Ex. s. am Ortsrand von Illmitz/B, oft von Hausdach aus (ABi); 28.4. 1 Ex. Unterstinkersee, Seew./B (GSp); 28.3.-13.6. 3 Ex. s. bei Neusiedler Teich/B (EDu).

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

Alpine Vorkommen: 3. 7. 2 Paare mit flüggen juv. Hochjochospiz, Ötztaler Alpen/T (ILu); 7. 7. 1 M. füttert flügges juv. beim Riffelsee, 2250 m NN, Ötztaler Alpen/T (ILu); 7. 7. ein Paar mit flüggen juv. bei Taschachalm, Ötztal. Alpen/T (ILu); 9. 7. mehrere Paare, einige mit Futter in Schnabel und heftig warnend, Umbaltal-Clarahütte/OT (JSi); 11. 7. 1 Ex. ruft oberhalb der Lienzer Hütte bei 2000 m, Schöbergruppe/OT (ILu); 12. 7. mehrere Ex. und 1 Paar am Nest, Dorfertal/OT zwischen Ochsener- und Johannishütte. Nesteingang so schmal, daß Hineingreifen unmöglich (JSi); 25. 7. 1 Paar bei Obstanzersee, 2300 m, Kartitsch/OT (JSi); 16. 8. 5 ad. und juv. oberhalb Kerschbaumer Alm, bei 2150 m, Lienzer Dolomiten/OT (ILu).

Flachlandvorkommen: 11. -27. 5. 1 M. singt bei Eggenburg/N (EDu); 25. 5. und 27. 6. 1 Ex. bzw. 1 Paar Sandgrube b. Nickelsdorf/B (JRe); 25. 5. 1 Ex. Sandgrube bei Zurndorf/B (JRe); 25. 5. 1 M. Sandgrube b. Grundlacke, Seew./B (EDu).

Steinrötel, Monticola saxatilis

23. 6. 1 ad. M. im Gebiet des Hohen Freschen/V auf ca. 1850 m. Sitzt auf Krüppelfichte eines Grates und fliegt dann in tieferliegendes Blockfeld (VBl).

Misteldrossel, Turdus viscivorus

Im Mühlviertel/O zwischen Mitte April und Mitte Mai bei Hinteranger (Gem. Schwarzenberg), Haagerau und Oberhaag (Schlägl), Berg (Rohrbach), Molterberg (Klafter), Sonnenwald und Grünwald, ca. 1000 m NN (Aigen/Mkr.), beobachtet (EPe). - 17. 8. ca. 30 Ex. bei Klösterle/V, ca. 1600 m NN (RPe).

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

Vorarlberg: 9. 4. Brut im Lauteracher Ried/V (RPe). Zwischen 8. und 13. 4. im Bregenzerwald zwischen Egg und Schwarzenberg an neun Stellen beobachtet, davon an drei (bei Schwarzenberg, an Bregenzerache bei Andelsbuch und bei Stadel) Brutverdacht (intensives Warnen, Zwitscherflug) (KMa).

Oberösterreich: 28. 4. 3 Ex. Ziegelteich b. Schlägl, 11. 5. 7 Ex. Schlägl, brütend (EPe). 11. 5. 1 Ex. Au b. Kirchdorf/Inn, warnt (FGr).

Niederösterreich: 2. 6. 2 Ex. Schandachenteich, 2 Ex. Radischenteich, Waldv. (ILu). 30. 6. 3 Ex. bei Marchegg !! (EDu).

Singdrossel, Turdus philomelos

9. 4. Nest mit 4 Eiern Gießhübl/W (ABi); 20. 4. Nest mit einem Ei und leeres Nest, auf dem Vogel sitzt, Bisamberg/N (ABi); 27. 4. 1 neues Nest, noch leer, 1 Nest mit 1 Ei, 1 Nest mit 4 Eiern, anscheinend verlassen, Zentralfriedhof/W (ABi). - 8. -21. 6. ein Paar nistet in Garten eines Hauses in Krumpendorf/K; am 17. 6. erstes Ei, dann am 18., 19. und 20. 6. je ein weiteres gelegt; am 20. Brutbeginn (JRe). In diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß die Singdrossel auch in Wien in allen Parks und Gärten mitten in der Stadt brütet, wenn auch in viel geringerer Zahl als die Amsel, während etwa in Salzburg bis jetzt keinerlei Verstädterungstendenzen entdeckt werden konnten. Wie verhält es sich damit in Graz, Linz ?

Ringdrossel, Turdus torquatus

24. und 25. 4. mind. 3 MM. und mehrere WW. im Rosenhofpark von Sandl b. Freistadt/O (HRei). 23. 5. 1 Ex. Grünwald, Aigen im Mühlkreis/O (EPe). 16. 6. 1 Paar mit 3 flüggen juv. Brunnalm b. Veitsch/St, ca. 900 m NN (FSa).

Bartmeise, Panurus biarmicus

2. 5. erster Trupp mit Jungvögeln bei Neusiedl am See/B (GSp).

Schwanzmeise, Aegithalos caudatus

17. 3. 2 Paare beim Nestbau in Kiefern, ca. 4 m hoch, Ellender Wald/N (WFe). 24. 4. Nestbau an Dornbirner Ache/V (RPe).

Beutelmeise, Remiz pendulinus

30. 3. 1 Ex. arbeitet an der Grundentwicklung eines Nestes im Überschwemmungsgebiet/W; dieses Nest ist am 21. 4. fast fertiggestellt, das M. arbeitet an der Innenausstattung (Pappelwolle); am 11. 5. enthält es fünf etwa zweitägige juv. Ein zweites Nest, am 21. 4. im Bau, ist am 11. 5. verschwunden, ein drittes Nest am 11. 5. im Bau befindlich (ABi). - An einem am 11. 5. im Überschwemmungsgebiet/W entdeckten Nest wird am 18. 5. noch gebaut (AHR). - 1. 5. Nestbau b. Marchegg/N (WFi), 1. 6. erste eben flügge juv. im gleichen Gebiet (KMa). - 23. 5. Nest bei Untersiebenbrunn/N, 3 juv. schauen heraus (MGa). - 13. 4. 2 Ex. an halbfertigem Nest bei Schönau an der Donau/N (EDu). - 26. 5. halbfertiges Nest bei St. Andrä/B, am 3. 6. noch immer unfertig (ABi), am 11. 6. fast fertig (JKö). - 4. 7. 2 ad. mit ca. 4 flüggen juv. Güssinger Teiche/B, 9. 7. ebd. 2 flügge juv. (FSa). - 14. 7. 6 und 1 juv. Kirchberger Teiche/St (FSa, HHa).

Weidenmeise, Parus montanus

Einige Beobachtungen zeigen, daß die ostösterreichischen Flachlandpopulationen nicht nur auf die Donauauen beschränkt sind: 16. 3. 1 Ex. s. nahe Anninger-Weg, Wienerwald/N (EDu); 23. 5. 2 Ex., davon 1 s., Schloßpark Pottendorf/N (HWi); 27. 7. 1 Ex. ruft im Schloßpark Laxenburg/N (EDu).

Tannenmeise, Parus ater

1. - 3. 6. 3 Nester mit juv. am Kampstein/N zwischen 1200 und 1300 m NN; eines davon befindet sich in 1 1/2 m Höhe in Fichte, das zweite in stark angefaultem Wurzelstock, das dritte in Steinhäufen (AHR).

Mauerläufer, Tichodroma muraria

Vorarlberg: 9. 4. 1 Ex. Felsabstürze des Klausbergs bei Bhf. Schwarzenberg, Bregenzerwald (KMa). Von 22. 3. bis 4. 7. ständig 1-2 Ex. bei Rankweil in ca. 600 m NN beobachtet, lassen am 27. 5. Kolkraben an, 1 Ex. füttert am 4. 7. (EDo). Bei Hohenems zunächst 1 Ex. (R. Ortlieb, EDo), dann nichts mehr beobachtet - wahrscheinlich wurde Gelege ausgenommen.

Steiermark: 17. 3. erster Gesang an Puxerwand, dort BNW (EHa).

Osttirol: 9. 7. 1 Ex. nahe Clarahütte, 2038 m NN, Umbaltal; 12. 7. 4 Ex. bei ca. 1900 m im Dorfertal (JSi).

Waldbaumläufer, Certhia familiaris

20. 3. 1 Ex. s. in Laxenburg/N (EDu). 19. 4. 2 Ex. s. im Tierpark Schützen/B (EDu, BLei).

Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla

10. 4. 1 Ex. s. in Obstgarten von Schwarzenberg, Bregenzerwald/V, ca. 700 m NN (KMa), 19. 4. 4-5 Ex. s. im Tierpark Schützen/B (EDu, BLei).

Graumammer, *Emberiza calandra*

- Vorarlberg: 2. 3. 2 s., 15. 5. ca. 20 s. Ex. im Weitried Rankweil (EDo). 13. 3. 1 Ex. Lauteracher Ried (RPe).
- Steiermark: Scheint sich in der Oststeiermark stark auszubreiten: bei Ilz am 18. 5. 1 Ex. am Sportplatz, am 19. 5. 1 Ex. Riegersdorf-Kalsdorf, 22. 5. und 3. 6. 1 Ex. Mutzenfeld, 22. 6. 3 s. Ex., 26. 6. 2 s. Ex. neben weiteren Einzelbeobachtungen in Ilz, zuletzt dort am 12. 7. Am 19. 5. 1 Ex. Altenmarkt-Jobst b. Fürstenfeld, 20. 6. 1 Ex. Gr. Hartmannsdorf (alle Daten von HHa). In Speltenbach b. Fürstenfeld am 23. 5. 3 Ex. s., 10. 6. 2 Ex. s., 3. 7. 1 Ex. s.; Penzendorf bei Hartberg 25. 5. und 28. 5. 2 Ex. s.; 29. 5. bis 2. 7. 1 Ex. s. (alle Daten von FSa). 14. 6. -17. 6. in Viehweiden am Furtnerreich; interessant war, daß das singende Männchen ein Kuckuckswelbchen dreimal verfolgte und in die Flucht schlug. Für das Gebiet gilt die Graumammer als sehr seltener DZ (HHa, EHa).
- Burgenland: 24. 3. 2 Ex. s. im Panzergraben b. Neusiedl (ABi). 12. -15. 4. 5-6 Ex. s. in Umgebung von Illmitz (ABi). 15. 6. 2 Ex. s., 19. 6. 1 Ex. s. Güssinger Teiche (FSa).
- Niederösterreich: 6. 4. 2 s. Ex. bei Zeiselmauer (KPau). 28. 4. 2 Ex. bei Bernhardsthaler Teich (ILu). 28. 4. 2 Ex. s., 4. 5. 1 Ex. s. Laaerberg/W (ABi). 12. 5. 2 Ex. s. b. Eggenburg (EDu). 8. 6. 2 Ex. s. b. Leitzersdorf (ILu).

Goldammer, *Emberiza citrinella*

15. 5. 6 s. Ex. bei Meiningen/V (EDo) (in V hat der Brutbestand in den letzten Jahren stark abgenommen).

Zaunammer, *Emberiza cirulus*

- Am 16. 6. ein singendes M. am Nußberg/W von ILu entdeckt!! EDu, welcher daraufhin nachforschte, konnte am 22. 6. sogar 2 singende Ex. ebd. feststellen.

Ortolan, *Emberiza hortulana*

28. 4. 2 s. Jungersberg/B (HWi). 28. 4. 1 s. Breitenbrunn/B (HWi). 13. 5. 2 Ex. nördl. Eggenburg/N (EDu). 8. 6. 6 Ex. s. bei Leitzersdorf/N (ILu). 29. 6. ca. 10 s. oder rufende bei Leitzersdorf/N (EDu).

Zippammer, *Emberiza cia*

27. 6. 3 singende, 4-5 rufende Ex. Hohe Wand/N; 14. 7. ebd. 2 rufende Ex. (EDu).

Rohrammer, *Emberiza schoeniclus*

2. 5. Nest mit 5 Eiern nördl. Illmitz/B (JRe). 28. 5. Nest mit 5 5-6 tägigen juv. Pimezlacke, Seew./B (ABi).

Zitronengirlitz, *Carduelis citrinella*

14. 7. 1 ad. füttert mehrere flügge juv., Stuben am Arlberg/V, ca. 1500 m NN (VBl).

Girlitz, *Serinus serinus*

4. 5. Nest mit 3 Eiern in 1. 70 m Höhe am Zentralfriedhof/W (ABi).

Birkenzeisig, Carduelis flammea

10.7. Innergschlöß/OT, ca. 1700 m, ein Nest mit 5 Eiern und ein weiteres Nest mit 4 fast flüggen juv. in Lärchen; brütendes W. wird von M. gefüttert (JSi). - 14.7. flügge juv. werden im Lechtal/V in ca. 1750 m gefüttert (VBl). - 5.8. flügge juv. werden auf der Grasseckalm am Fuß des Hohen Mölbing/St gefüttert (HFr). - 25.8. Lüner Krinne/V in ca. 2100 m zahlreiche umherstreifende Trupps, maximal ca. 50 Ex. (VBl).

Hänfling, Carduelis cannabina

12.-15.4. fast fertiges Nest an Langer Lacke, Seew./B, W. mit Innenausstattung beschäftigt (ABi). 27.4. Nest mit 1 Ei Zentralfriedhof/W (ABi). 28.4. 2 Nester mit 5 bzw. 2 Eiern bei Enzersfeld/N (JRe). 2.5. Nest mit 4 Eiern nördl. Apetlon/B (JRe).

Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra

HFr und WWe melden aus dem Ennstal b. Wörschach/St bzw. aus der Umgebung von Eisenerz/St übereinstimmend im Sommer 68 wieder Zunahme dieser Art.

Gimpel, Pyrrhula pyrrhula

29.7. Nest mit 5 Eiern 1,20 m hoch in Fichte am Kampstein/N in ca. 1150 m NN; am 13.8. waren 4 juv. geschlüpft, 1 Ei taub (AHr).

Schneefink, Montifringilla nivalis

16.6. Nest mit laut bettelnden juv. in Felswand auf der Rax/N, ^(KMa) 23.6. 6 Ex. Hohe Veitsch/St (ILu); - 23.6. 2 Ex. mit Balzflügen im Freschen- gebiet/V, ca. 1850 m, über windigem Grat (VBl). - 3.7. 1 Ex. Balzflug beim Hochjochferner, 2980 m, - 4.7. 6 Ex. zwischen Hochjochospiz, Vernagthütte und Breslauer Hütte, 5.7. 6 Ex. bei Breslauerhütte, auf Hüttendach Balzflug und Gesang, Ötztaler Alpen/T (ILu). - 4.7. 1 Ex. Schwarzenstein-Stadelstein, Eisenerzer Alpen/St, 1700 m (WWe). - 21.7. 2 Ex. Plenge, 2372 m, Lesachtal/K (JSi). - 25.7. 2 Ex. Obstanzersee/OT, 2300 m (JSi). - 17.8. 4 Ex. bei Karlsbader Hütte, Lienzer Dolomiten/OT (ILu).

Pirol, Oriolus oriolus

10.6. 1 M. bei Krumpendorf/K (JRe).

Eichelhäher, Garrulus glandarius

21.7. 8 Ex. auf Kirschbäumen zwischen Oggau und Schützen (BLei).

Dohle, Coloeus monedula

18.5. in 12 Nisthöhlen bei Wolfsthal/N 44 juv., zusätzliche Höhlen nicht erreichbar (WSch). - Im Juli bei Wörschach/St Bettelrufe von juv. am nordseitigen Ennsufer gehört (HFr).

Saatkrähe, Corvus frugilegus

8.8. ca. 250 Ex. auf Feld bei Zurndorf/B (JRe).

Rabenkrähe, Corvus corone corone

31.3. brütet bereits im Lauteracher Ried/V (RPe).

Nebelkrähe, Corvus corone cornix

Langsame, aber ständige Zunahme bei Eisenerz/St (WWe).

Kolkrabe, Corvus corax

4 Horste bei Eisenerz/St 1967 und 68 besetzt. Juv. fliegen anfangs Mai aus (WWe). - 24.2. Nestbau Rickenbachtobel/V, 26.3. ad. fliegt mit Futter (RPe). - 25.8. 2 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 8 1-26](#)