

# Mitteilungen

des entomologischen Vereines

# POLYXENA

Sitz: Wien IX. Nussdorferstr. 75.  
Vereinsabende jeden Donnerstag.

1. Jahrgang.

Erscheint jeden ersten Donnerstag des Monats.

N<sup>o</sup> 7.


## Bemerkenswerte Abweichungen.

*Argynnis latonia ab. valdensis.*

Alle Rechte vorbehalten!!

Am 8. September fand imprivatlich  
gibt Herr Hornich, in Scheiblings-  
Kirchen eine prachtvolle Obser-  
vation von *Arg. latonia* L. Form  
Abbildung der Ober- u. ab auf  
Unterseite wie für bringen  
die Zeichnungen der Ober-  
flügel sind so zusammen-  
mangeflohen, daß mir die  
Flecke von dem Grunde ist.

Infolge eines technischen  
Fehlers während des Druckes  
missatung die Abbildung.  
Dieselbe wird bei Gelegen-  
heit wiedergegeben werden.



lirt verformen, jedoch auf den  
Vorder- wie auf der Hinterflü-  
gel; außerdem ist auf der  
Flur in der Mittelzelle fünf  
abuse der Zügel.

Obst der Unterseite fließen  
die Flecke teilweise zu drei-  
fen zusammen.

Diese prachtvolle Observation  
trägt den Namen valdensis.  
Hy.

## Zur Lebensweise und Nüch der *Aectia maculosa* W. V.

Als ich im Sommer die Form sehr auffällig im Süd-Nordwest des Tirol zu bester, bewässigt sich  
der Name *maculosa* eine ungewöhnliche Erscheinung - Die Zeit der Reife, auf der Länge der Zeit.  
*maculosa* ist, es sind alle malen sich die Larven in den reifsten Jahren sind.  
die mächtige feller fliegt in den Monaten Juni, Juli auf Schwärmen und trockenem Rasen,  
die sind mit *Senecio vulgaris* (Potentilla verna L.) bewachsen sind, welche Pflanze die Lar-  
ge sehr bevorzugt, sie von dem Vorhandensein sie ist vollkommen abhängig macht.  
für den Wiener Sommer kommen in Schwärmen die Schwärme bei Gieshübel, mit Sechsteils.  
dort sowie die Larven in Lobau, mit bei Lang-Ennsdorf, es sollen aber auf *Chilopoda* man-  
chen Sommer auf auf Diernberg und Freudenstein bei Miedling welche gefunden werden sind

Der Thymusdrüsen folgt bei Luge, unter Guckhülften porair, und von mir dem Pflanzen, erbrungen, wofür er sich nicht eignet, und können Duffhagen stark reizend empfunden. Erst hat Ober...

Die, nach ungerade 14 bis 18 Tagen, je nach der Reifezeit, und pflanzlichen Reifezeit sind die...

Die Reifezeit dieser Samen ist von dem Reifezeit der Samen, und von dem Reifezeit der Samen...

Die Reifezeit dieser Samen ist von dem Reifezeit der Samen, und von dem Reifezeit der Samen...



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1\\_7](#)

Autor(en)/Author(s): Kysela Emanuel

Artikel/Article: [Zur Lebensweise und Zucht der Arctia maculosa W.V.. 2-4](#)