

Mitteilungen

des entomologischen Vereines

POLYXENA

Sitz: Wien VII. Neubaugürtel 24-26.

Vereinsabende jeden Donnerstag.

1. Jahrgang.



Erscheint jeden ersten Donnerstag des Monats.

N^o 9.

Bemerkenswerte Aberrationen.

Alle Rechte vorbehalten!

Reinigt die Güter des Herrn
 Offiziers Ladil, der im Juni
 ge. feldman. Linsen, eine bepa.
 und glückliche Junge hat, für
 von im Jahre, für die große
 in der feldman. Linsen.
 Aberrationen zu bringen, die
 so beim Leben vorkommen.
 Fig. 1. Lat. neptis L. ab.
 Die Vorderflügel sind fast
 vollständig gelblich, der Hals
 dunkel, auffallend, fast
 normal; auf der Hinterflü.
 geht die innere Linie
 nach außen vorzukommen,
 die bekannt. Hinterflügel ebenfalls, gegen die Wurzel bloß flügellos. beide
 Linien, mit der Wurzel abwärts vorzukommen, die in der Mitte der Flügel, nicht von
 bei Jugend auf bis zu V breit, unterbreiten. Ich benenne die beiden Gattungen mit
 Rücksicht darauf, daß sie sehr selten vorkommen, nicht, habe ich mir jetzt die für
 nicht vor.



Die Hinterflügel sind fast
 V breit, unterbreiten (wie bei
 Lat. puera oder fulminea.)
 Fig. 2. Lat. puera Girona
 ab. Vorderflügel gelblich,
 beim auffallenden Lichte stark
 in flügellosem Zustande,
 fünfzig fünfzigem Lichte
 abnorm, fast flügellos von
 großer Schwärze mit drei
 Linien der Costalrandes vor-
 zeigt. Inmunde fast weiß,
 nur gegen die Kopfseite
 mit Flügeln in munterer
 Größe und Farbe stark gelb.
 N. J.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1_9](#)

Autor(en)/Author(s): Kysela Emanuel

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Aberrationen. 1](#)