

Aufzählung von Pilzen aus der Umgebung von Hallstatt.  
(Jänner 1952)

- Amanita muscaria L. Am Boden, Klauswald bei Hallstatt, IX.
- Boletus elegans Schum. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- B. viscidus L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Calvatia caelata Morg. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- Cantharellus cibarius Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Clavaria aurea Schäff. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- C. formosa Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Echerntal bei H., XI.
- Clitocybe geotropa Bull. Klauswald bei H., X.
- Cl. gilva Pers. Am Boden, Klauswald bei H. IX. Besonders grosse Exemplare, Hutdurchmesser 11cm.
- Cl. laccata Scop. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- Collybia velutipes Curt. An Stämmen, Hirschbrunn bei H., X.
- Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus L. Echerntal bei H., XI.
- C. (Phlegmacium) fulmineus Fr. Am Boden, Klauswald bei H. IX.
- C. (Dermocybe) raphanoides Pers. Auf dem Boden, Klauswald bei H., IX.
- C. (Telamonia) rigidus Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- C. (Dermocybe) spec. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- C. (Hydrocybe) spec. Auf Waldboden, Malerweg bei H. X.
- C. (Phlegmacium) spec. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- C. (Dermocybe) subferrugineus Batsch. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- C. (Dermocybe) venetus Fr. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Craterellus infundibiliformis Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Cr. lutescens Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Cyathus striatus Huds. Auf morschem Holz, Burgstall bei Pürgg, X.
- Fomes annosus Fr. An dürren Stämmen von Salix grandifolia, Hirschbrunn bei H., X. An Fichtenstrünken, Klauswald bei H. IX.
- F. unguilatus Schäff. An Fichtenstrünken, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI. Klauswald bei H., IX.
- Galera tenera Schäff. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- G. spec. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Geaster fimbriatus Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Gyrocephalus rufus Jacq. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Hebeloma crustuliniforme Bull. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- H. longicaudum Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.

- Helotium Rerbarum* Fr. Auf durren Stengeln (einer Composite), H., XI.  
*Hygrophorus (Limacium) agathosmus* Fr. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.  
*H. (Hygrocybe) conicus* Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*H. (Hygrocybe) eburneus* Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*H. (Limacium) erubescens* Fr. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.  
*H. (Limacium) hypothejus* Fr. Auf Waldboden unter *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.  
*H. (Limacium) lucorum* Kalchbr. Auf Waldboden unter *Larix*, Malerweg bei H., X.  
xH. (*Limacium*) *pustulatus* Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*H. imbricatum* L. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.  
*H. repandum* L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Echerntal bei H., XI.  
*Inocybe geophylla* Sw. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.  
*I. sindonia* Fr. Am Boden, Klauswald bei H., IX.  
*Lactarius camphoratus* Bull. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.  
*L. deliciosus* L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.  
*L. pyrogalus* Bull. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*L. scrobiculatus* Scop. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.  
*L. vellereus* Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.  
*Lenzites sepiaria* Jacq. An Fichtenstämmen, Klauswald bei H., IX.  
*Lepiota procera* Scop. Auf Waldboden, Burgstall bei Pürgg, X.  
*Lycoperdon gemmatum* Batsch, auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Marienruhe bei H., X, Echerntal bei H., XI.  
*L. pyriforme* Schöff. An Stümpfen, Echerntal bei H., XI.  
*Marasmius confluens* Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*M. perforans* Huds. Auf Fichtennadeln, Klauswald bei H., IX, Echerntal und Grubfeldweg bei H., XI.  
*M. prasmiosmus* Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Besonders grosses Exemplar, Stiel 17cm lang.  
*Mycena calopus* Fr. An *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.  
*M. pura* Pers. Am Boden, Klauswald bei H., IX.  
*M. rosella* Fr. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.  
*M. stannea* Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.  
*Naucoria spec.* Zwischen Moos an durren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X, auf Waldboden, Malerweg bei H., X.  
*Paxillus atrotomentosus* Batsch, an durren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.  
*Penisphora gigantea* Masee, an Rinden, Hirschbrunn bei H., X.  
*Phialea cyathoides* Gill. Auf durren Stengeln (einer Composite) H., XI.

- Pholiota caperata* Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- x*Ph. lucifera* Lasch. An *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.
- Ph. radicata* Bull. Auf dem Boden, Klauswald bei H., IX.
- x*Pleurotus porrigens* Sacc., Syll. Fung., vol. 5 (1887) 314. - Carl. Rea, Brit. Basidiom. (1922) p. 449. - *Calathinus porrigens* Quélet., Enchirid. fung. (1886) p. 46. Auf Strünken im Klauswald bei H., X. Entspricht der Abb. in Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Pl. 259A. Nach Carl Rea l.c. in Schottland gemein, auf dem europäischen Kontinent selten.
- Polyporus imberbis* Bull. Auf morschem Holz, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
- Polystictus hirsutus* Schrad. Auf morschen Zweigen von *Fagus silvatica*, Marienhöhe bei H., X, an Hirnschnitten abnorm gewachsen, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI, an dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
- P. unicolor* Fr. An dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
- P. versicolor* L. An Buchenstrünken, Klauswald bei H., IX.
- x*Poria rhodella* Sacc. Syll. Fung. vol. VI (1888) p. 302, Carl. Rea, Brit. Basidiom. (1922) 601, Bourdot et Galz., I. Hymen France (1922) 622, nr 973. - *Polyporus rhodellus* Fries, Syst. mycol., vol. I. (1822) p. 380. Auf morschen Fichtenstämmen in grösserer Ausdehnung, Klauswald bei H., X. Entspricht der Abb. in Bull., Hymen. de France, tab. 442, fig. D und Fries, Icon. sel. Hymen., vol. II, tab. 189, fig. 2. Nach Bourd. et Galzin, l.c. wäre es möglich, dass letztere Abb. zu *Poria purpure* Hall. gehört.
- Oudemansiella mucida* Hoehn. syn. *Armillaria mucida* Schrad. Auf Stämmen von *Fagus silvatica*, Marienhöhe bei H., X.
- Russula Queletii* Fr. Echerntal bei H., XI. Neben normal gefärbten auch Blässlingeweiss (weiss).
- Stropharia aeruginosa* Curt. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X, in einer ringlosen Form (f. *exannulata* Ulbr.); Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
- Trametes cinnabarina* Jacq. Auf dürren Ästen, Grub bei H., X.
- T. gibbosa* Pers. An Strünken von *Picea*, Sommeraukogel bei H., X.
- T. rubescens* Schw. An dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
- Tremella lutescens* Pers. An dürren Ästen, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
- Tricholoma terreum* Schff. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Ustulina vulgaris* Tul. Auf morschem Holz, Klauswald bei H., IX.

- - - - -

Die mit X bezeichneten Arten sind bemerkenswert und selten. Herr Hofrat Dr. Karl Keissler führte die Bestimmungen durch, wofür ihm die Bot. Station Hallstatt herzlichsten Dank ausspricht.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [126](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Festschrift Hofrat Dr. Karl Keissler Nr. 3. Aufzählung von Pilzen aus der Umgebung von Hallstatt, \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 126\) 1-3](#)