

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT .Nr. 130.AUFZÄHLUNG VON PILZEN AUS VERSCHIEDENEN TEILEN DES SALZ-KAMMERGUTES MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEEG

1953

In den Arbeiten Nr. 117. und 126. wurden Pilzfunde aus dem Bereiche von Steeg am Hallstättersee und Hallstatt mitgeteilt, die in den Jahren 1950 und 1951 gemacht worden waren. In der vorliegenden Liste finden sich Funde aus den Jahren 1951 und 1952. Auch hier sind es hauptsächlich Hutpilze, überhaupt Makropilze, doch werden auch einige Mikropilze angeführt. Ein Grossteil der Funde wurde von Herrn Hofrat Dr. Karl Keissler gemacht, der auch die Bestimmung aller Arten durchführte. Herrn Hofrat Dr. Keissler sei auch an dieser Stelle für seine mühevollen Arbeit, die unsere Kenntnisse über die Pilzvorkommen im inneren Salzkammergut wesentlich bereichert, der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Über den 578 m hohen Arikogel bei Steeg wurde in der ersten Pilzliste (Aufzählung von Pilzen aus der Umgebung von Steeg am Hallstättersee (Arbeiten, Nr. 117.) für die Monate Juli bis September ein allgemeiner Pilzaspekt bekannt gegeben. Im Juni 1950 war infolge grosser Trockenheit kein Pilzaspekt. Im Jahre 1951 konnte für den Arikogel für die Monate Juli bis September kein Aspekt erstellt werden, da trotz der günstigen Feuchtigkeitsverhältnisse die Hutpilze so selten waren, dass von einem Pilzaspekt nicht gesprochen werden konnte.

Ähnlich war es auch im Jahre 1952, in dem allerdings im Juli grössere Trockenheit herrschte. Ein eigentlicher Pilzaspekt kam nicht zustande. Dagegen konnte im Bereiche der Koppenalm bei Obertraun im September ein ausserordentlicher Aspekt von *Armillaria mellea* Fr. nachgewiesen werden.

Zunächst seien einige bemerkenswerte Vorkommen von Hutpilzen angeführt:

*Boletus luridus* Schaeff. wuchs im August 1952 in der Nähe des Franz-Joseph-Denkmal bei Bad Ischl an einer mit Humus bedeckten Steinwand; im gleichen Monat am oberen Jägersteig des Sarsteins in ungef. 1200 m in grösserer Menge.

Imocybe-Arten August 1952 in ziemlicher Menge und reicherer Artenauswahl in den Schluchten des Einserkogels bei Steeg z. T. unter Krummholz bis hoch hinauf.

*Russula foetens* Pers. August 1952 als Pilzaspekt auf einer Waldwiese nächst der Haller-Alm bei Goisern.

*Tricholoma conglobatum* Vitt. Ein Exemplar am Arikogel (Sept. 1952) bildete einen grossen Klumpen, aus dem 20 Stiele mit Hüten hervorwuchsen.

Liste der beobachteten Arten

Ein der Art vorgesetztes X bedeutet seltene Art. Wo nicht anders bemerkt, ist Karl Keissler der Finder. P: Josef Pilz. M: Friedrich Mor-ton.

- Amanita mappa* Batsch. Wälder um Steeg. VIII, 1951. Am Arikogel ein Stück ohne Ring ferner ein Stück mit sehr kleinem Hut ( $\emptyset$  3cm) u. langem Stiel (13cm).
- A. phalloides* Fr. Leisling (bei Steeg), VIII, 51.
- X *Amphisphaeria Spegazziana* Sacc. An Borke von *Pirus communis*, Goisern. VIII, 51. Sporen einreihig elliptisch, zweizellig, mit 2 Öltropfen, hell, Paraphysen einfach.
- Anthira penicillata* Fr. Zwischen Moos und Waldmulm in den Wäldern der Hochsieg bei Hallstatt, XI, 52. Schwefelgelbes, steriles Myzel, das als zu *Clavaria* gehörig angesehen wird. (M.).
- Auricularia mesenterica* Dicks. An einem Buchenstrunk, Ruine Wildenstein. VIII, 52.
- Bolbitius titubans* Bull. Moderholz, Echerntal. VIII, 51. (M.).
- Boletus appendiculatus* Schöff. Mischwald Arikogel. IX, 51.
- B. badius* Fr. Wegböschung in Fichtenwald bei Obertraun. IX, 51.
- B. bovinus* L. Fichtenwald Pötschenhöhe. VIII, 51; Auwald bei Obertraun, IX, 51.
- B. chrysenteron* Bull. Mischwald Herndlberg bei Goisern. VII, 52.
- B. edulis* Bull. Fichten- u. Mischwälder Umgebung Steeg.
- B. elegans* Schum. Pürgg, Burgstall, Waldboden. X, 51. (M.).
- B. flavidus* Fr. Einserkogel, zwischen Krummholz. VIII, 52.
- XB. *pachypus* Fr. Mehrfach bei Steeg. Trat im Sommer 52 häufiger in einer abweichenden Form auf. Mit Stiel ohne jeden roten Farbenton. Stiel gelblich gefärbt. Erinnert daher etwas an die var. *candicans* Fr., die einen gelblich-weissen Stiel ohne Rot, allerdings auch einen weisslichen Hut besitzt.
- B. purpureus* Fr. Haller-Alm. 1000m. VIII, 52. Diese Exemplare waren auf der Hutober- und Unterseite und auf dem Stiel auffallend dunkelrot gefärbt.
- B. regius* Krombh. Arikogel, unter *Fagus*. VII, 52.
- XB. *rubescens* Troy. Finstere Stellen im Leisling. IX, 52. (P.). Die Röhren werden bei Druck nicht blau sondern grün.
- XB. *tridentinus* Bres. Soleweg bei Steeg unter Krummholz. IX, 52. (P.); unter *Picea* am Wege von Pürgg nach Klachau. VIII, 51. (M.).
- B. variegatus* Swartz. Mischwald im Leisling. VIII, 52.
- B. viscidus* L. Waldboden im Echerntal. IX, 51. (M.).

- Bremia Lactucae* Reg. Auf lebenden fol. von *Helichrysum bracteatum* im Garten des Herrn J. Pilz in Au 52. IX, 51. Der Parasit trat auf einmal in der ganzen Kultur auf und war fast auf jedem Blatte zu finden. Im Herb. der bot. Abt. des Naturhist. Museums in Wien liegt dieser auf Compositen beobachtete Pilz in 3 Exemplaren auf obiger Nährpflanze auf; *Fungi exs. suec. Upsala*, Nr. 693. *Sydow, Mycoth. germ.* Nr. 2106; *Sydow, Phyc. et Protom.* Nr. 26.
- Calocera viscosa* Pers. Auf einem Fichtenstrunk am Fuss des Sarsteins bei Steeg. VIII, 51. -- An Strünken Gosauschmied. IX, 51. -- Auf *Picea*-Strünken am Siriuskogel. VII, 51. -- An einem *Taxus*-Strunk in Goisern. VIII, 51.
- Clavaria aurea* Schäff. Mischwald Arikogel. VIII, 51. Selten.
- XCl. *subtilis* Pers. Ebenda. VIII, 52.
- Cladosporium entoxyllum* Corda. An gefällten, entrindeten Baumstämmen am Zinken bei Aussee, reichlich. VII, 51.
- Cl. *herbarum* Lk. Auf dürren Grasblättern, an dünnen Stengeln von *Chenopodium album*. Ischl. VII, 51.
- Clitocybe flaccida* Sow. Fichtenwälder im Leisling. VIII, 52.
- Cl. *geotropa* Bull. Auf Waldboden Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.). Mässig grosse Stücke. Keissler fand X. 44. ebendort unter *Picea* eine Anzahl grosser Exemplare der verwandten Cl. *candida* Bres. in schönen Kreisen.
- Cl. *gilva* Pers. Mischwald Leisling. VIII, 51. (P.). Auch sonst mehrfach.
- Cl. *sp.* Auf einem Strunk Hochsiegwald. XI, 52. (M.).
- Coleosporium Sonchi* Lev. An lebenden fol. von *Adenostyles alpina* im Koppental. VIII, 51; Fuschlsee (P.).
- Collybia acervata* Fr. Zwischen Gras unterm Schafberggipfel 1700m (P.); Einserkogel bei Steeg. VIII, 51.
- C. *cirrhata* Schum. Auf fol. zwischen Resten von Hutpilzen im Leisling, einzeln. VIII, 51; an Hutpilzresten Gosauschmied, einzeln. IX, 51; Lauffen, VIII, 51.
- C. *longipes* Bull. Fichtenwald Sarsteinfuss bei Steeg, einzeln. VIII, 51.
- C. *velutipes* Curt. Auf abgestorb. *Fagus* am Kirchberg bei Hallstatt. XII, 51. (M.).
- XConiosporium *melanodes* B. et Br. An welkenden Blüten von *Phlox paniculata* in Au bei Steeg. VVV, 52. Dieser Pilz trat mit grosser Regelmässigkeit an den welkenden, noch an der Pflanze befindl. Blüten in Gesellschaft von *Periconia spec.* und *Cladosporium herbarum* Lk. auf.
- XCoprinus *albulus* Quel. In einem Gemüsebeet in Au. IX, 52.
- XC. *hiascens* Fr. An einem Strunk von *Acer pseudopl.* bei Goisern. IX, 52.
- XCortinarius (*Dermocybe*) *anomalus* Fr. ssp. *azureus* Konr. et Maubl. *Icon. sel. fungor.* (1930), Tab. 155. In einer Schlucht des Einserkogels bei Steeg zwischen Krummholz. VIII, 52.
- C. (*Hydrocybe*) *armeniacus* Schäff. Mischwald Leisling. IX, 52. (P.).

- C. (Phlegmacium) camphoratus Fr. Mischwald Leisling, VIII, 52.  
C. (Dermocybe) cinnamomeus L. Waldboden Burgstall von Pürgg 51. (M.)  
Waldboden Hirschau bei Hallstatt, XII, 51. (M.).  
C. (Phlegmacium) glaucopus Schäff. Fichtenwald Sarsteinfuss bei Steeg  
Vereinzelt, VIII, 51.  
C. (Telamonia) hinnuleus Sow. Mischwald Fuss des Zwölferkogels, VIII 51  
Mischwald Leisling, einzeln, VIII, 51. (P.).  
C. (Telamonia) iliopodius Bull. Fagetum Bärenpfad Wessenbachtal bei  
Goisern VIII, 52 (P.); Arikogel VIII, 52. Entspricht ziemlich dem  
Bild in Cooke, Ill. Brit. Fungi, Pl. 839; doch ärber.  
C. (Telamonia) incisus Pers. Schlucht des Einserkogels zwischen  
Krummholz, VIII, 52.  
C. (Inoloma) muricinus Fr. Rehkogel bei Goisern, auf Waldwiesen in  
grossen Trupps, VIII, 52.  
XC. (Phlegmacium) odorifer Fr. Fetzelm. Piceetum am Fuschlsee, einzeln.  
IX, 51. (P.); Mischwald Arikogel, IX, 51. Dieser auffallend nach Anis  
riechende Pilz wurde von Keissler am Fusse des Grimming bei  
Trautenfels und St. Martin am Grimming gefunden.  
XC. (Dermocybe) orellanus Fr. Schlucht Zwölferkogel bei Steeg, zwischen  
Krummholz, VIII, 52. Stimmt gut mit dem Bild in Konr. et Maubl. Icon  
sel. fung. vol. II (19307, tab. 148, während die Abbildungen bei Cooke,  
Ill. Brit. Fungi, Pl. 787. Boud. Icon. fung. vol. I, Pl. 115, und Bresandola,  
Icon. mycol. Tab. 649. nicht entsprechen.  
C. (Hydrocybe) rigens Pers. Mischwald Arikogel, VIII, 51. Vereinzelt.  
C. (Hydrocybe) subferrugineus Batsch. Mischwald Fuss des Zwölferkogels  
bei Steeg und Gosauzwang, VIII, 51. Vereinzelt; Waldboden im Echorn-  
tal IX, 51. (M.); Piceetum beim Fuschlsee, IX, 51. (P.).  
C. (Inoloma) violaceus L. Mischwald, Leisling, VIII, 51. Einzeln. (P.);  
Herndlberg.  
Craterellus clavatus Pers. Mischwald Leisling häufig, VIII, 51. (P.);  
Rehkogel, VIII, 51.  
C. cornucopioides L. Fagetum Leisling, IX, 52. (P.)  
Crepidotus mollis Schäff. Auf Fichtenholz Hirschau bei Hallstatt.  
XI, 51. (M.).  
XCyathicula serrata Sacc. Auf entrindeten Buchenästen am Mänegg bei  
Steeg, VIII, 52.  
Cyathus olla Batsch. Auf Erde zwischen Rudbeckia (wohl Holzreste im  
Boden!) im Garten Au 52. VII, 51. (P.).  
C. striatus Huds. Auf alten Brettern Garten Au 52. VII, 51. (P.); auf  
morschem Holz Burgstall von Pürgg, X, 51. (M.).  
Cylindrosporium Ranunculi Sacc. An lebenden fol. von Ranunculus  
acer am Arikogel, VII, 52.  
Cytospora sp. An dünnen Wipfeln von Fagus-Gebüsch auf der Joch-  
wand bei Goisern, VII, 52.  
Dacryomyces chrysocomus Puls. Auf einer Bank aus Fichtenholz, am  
Arikogel, vereinzelt, VIII, 51.

- Dichaena faginea* Fr. An lebenden Stämmen und Zweigen von *Fagus* am Arikogel. VI, 52. Im Konidienstadium. Früher zu den Flechten gerechn.
- Discosia antocreas* Fr. An welkenden Keimblättern von *Acer pseudopl.* Arikogel. VII, 52. Das Auftreten auf den Cotyledonen bemerkenswert.
- Diatrypella* sp. An Zweigen von *Fagus* am Bärenpfad im Weissenbachtal. VIII, 52. (P. ♂).
- Epichloe typhina* Tul. An lebenden Halmen von *Brachypodium silvaticum* am Arikogel. VII, 52.
- Erisyphe communis* Fr. An leb. Blättern von *Lunaria rediviva* in der Lämmermayr-Höhle bei Hallstatt in Massen. XI, 52. (M.).
- Exidia plicata* Kltzsch. An dürrer Zweigen an der Traun bei Goisern. IX, 52.
- Flammula flavida* Schäff. Auf Moderholz Fuss des Zwölferkogels bei Steeg vereinzelt. VIII, 51; auf *Fagus* am Kirchberg bei Hallstatt. XI, 51. (M.).
- Fomes applanatus* Pers. *Picea*-Strünke bei Ischl. VII, 51; Herndlberg. VIII, 51. (M. et P.).
- F. dryadeus* Pers. Auf abgestorb. *Fagus* am Kirchberg bei Hallstatt. XII, 51. Alt, etwas abnorme Wuchsform. (M.).
- F. fomentarius* Fr. Auf *Fagus* Hallstatt Hallberg. V. 52. (M.); an lebend. *Fagus*-Stamm bei Ischl. VIII, 51.
- Fusarium uredinicola* J. Müll. An *Cronartium asclepiadeum* auf *Cynanchum vincetoxicum* im Koppental. VIII, 51.
- Galactinia succosa* Berk. Auf Erde Herndlberg. VIII, 51. (M. et P.).
- Galera maiophila* Lasch. Zwischen Moos, Untersee bei Steeg vereinz. VIII, 51.
- G. tenera* Schäff. Zwischen Gras im Wald. Arikogel. VIII, 51. Einzeln.
- Geaster nanus* Pers. Mischwald Arikogel. XII, 51. (P.).
- Grandinia crustosa* Fr. An morschem Buchenholz. Arikogel. VII, 52.
- Gymnosporangium Sabiniae* Dicks. An lebenden Blättern von *Pirus communis* bei Ischl vereinzelt. VII, 51; sonst selten im Gebiet.
- Gyrocephalus rufus* Jacq. Waldboden Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.).
- Helotium citrinum* Fr. Auf Buchenholz bei Fuschl. IX, 51. (P.).
- H. trabinellum* Karst. Auf *Picea*-Strünken zwischen Lauffen und Ischl. VIII, 51.
- Helvella elastica* Bull. Fichtenwald Gosauschmied. IX, 51.
- Hemiarcyria rubiformis* Rost. Fichtenstrunk am Sarsteinfuss, einzeln. VII, 51; Fichtenstrünke Echerntal. IX, 51. (M.).
- Hormiscium* sp. An *Puccinia Violae* auf *Viola biflora*. Koppenschluht bei Aussee. VIII, 51.
- Hydnum connatum* Schulz. Mischwald Leisling, einzeln. VIII, 51. (P.).
- H. fuligineo-album* Schmidt. *Piceetum* Leisling, einzeln. VIII, 51.
- H. graveolens* Fr. Mischwald Leisling. VIII, 52.
- H. laevigatum* Sw. Waldboden Echerntal. IX, 51. (M.).
- H. nigrum* Fr. *Piceetum* oberer Jagdsteig am Sarstein, 1000m.

- H. scrobiculatum* Fr. Mischwald Leisling vereinzelt, VIII, 51. Eigene Art oder var. des *H. zonatum* Batsch?
- H. suaveolens* Scop. Piceetum Soleweg Steeg-Goisern. VIII, 52.
- Hygrophorus (Limacium) agathosmus* Fr. Waldboden Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.).
- H. (Hygrocybe) obrusseus* Bull. Mischwald am Herndlberg, einzeln. VIII, 51 (M. et P.); zwischen Gras am Arikogel VII, 51.; zwischen Gras am Fusse des Schafberges bei St. Wolfgang vereinzelt, VII, 51. (P.); am Fusse des Zinken bei Aussee vereinzelt VV 5
- Hypholoma hydrophilum* Bull. An einem Strunk im Leisling. VIII 51.
- X *Hypocrea citrina* Fr. Auf Walderde (wohl auf faulenden Pilzresten) Herndlberg. VIII, 51. (M.)
- Hypomyces lateritius* Tul. Unter *Picea* an *Lactarius deliciosus* am Fusse des Zwölferkogels. VIII, 51.
- Imocybe praetervisata* Quel. Zwischen Gras im Krummholz einer Einsenkogelschlucht bei Steeg, VIII, 52.
- I. pyriodora* Pers. Mischwald Arikogel. IX, 52. Rot anlaufend und nach Birnen riechend.
- I. relicina* Fr. Mischwald Leisling, mehrfach. VIII, 51. Riecht deutlich metallisch.
- I. scabella* Fr. Mischwald Arikogel, vereinzelt. VII, 51. Der angegebene Mehlgeruch fehlt.
- I. sindonia* Fr. Mischwald Arikogel. VIII, 52.
- I. umbrina* Bres. Piceetum Sarsteinfuss bei Obertraun. VII, 51.
- Irpex* sp. Auf modernd. *Larix* Hochsiegwälder IX, 51. (M.)
- Lachnea Miria* Gill. Auf mit Erde vermengtem Kalkschutt in grösseren Flecken in Au. VIII, 51; einzeln auf Erde im Leisling, VII, 51; zwischen Moos im trockenen Gerinne des Totenbachls am Südende des Hallstätter Sees. IX, 51. (M.).
- Lactarius aurantiacus* Fl. Dan. Mischwald Fuss des Zwölferkogels, einzeln. VIII, 51.
- L. biennius* Fr. Wald Soleweg Steeg-Goisern. VIII, 52.
- L. ligniotus* Fr. Mischwald Herndlberg. VIII, 51. (M. et P.).
- L. piperatus* Scop. Mischwälder am Leisling, häufig. VIII, 51. (P.). Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem er fehlte. Siehe Arbeit Nr. 117 unter *L. vellereus* Fr.
- L. volemus* Fr. Mischwald im Leisling. VII, 51.
- Lentinus cochleatus* Pers. In Massen an einem *Picea*-Strunk beim Gosauschmied. IX, 51. An einem Fichtenast abnormes Einzelexemplar mit muschelförmiger Gestalt.
- Lenzites abietinus* Bull. An Fichtenstrünken Lauffen. VII, 52. (P.); auf Fichtenholz Krezberg bei Hallstatt, X, 51. (M.).
- L. trabea* Pers. Auf *Picea*holz Hochsiegwälder. XI, 51 (M.).
- Leotia gelatinosa* Hill. Fagetum Bärenpfad Weissenbachtal bei Goisern. VIII, 52. (P.).
- Lepiota acutesquamosa* Weinm. Piceetum Raschberg bei Goisern in grossen Stücken. VIII, 51. (P.).

- Lepiota amianthina* Scop. Waldboden Hochsiegwälder. XI, 52. (M.).  
*L. erminea* Fr. Im Gras unter *Acer pseudoplatanus*, Untersee bei Steeg. Vereinzelt. VIII, 51.  
*L. procera* Scop. Mischwald Raschberg. Einzel. VIII, 51. (P.); Waldboden Burgstall von Pürgg. IX, 51. (M.).  
XL *Leptoglossum bryophyllum* Pers. Zwischen Moos Fuss des Einserkogels. VIII, 52.  
*Leptonia incana* Fr. Gras, Arikogel. Einzel. VIII, 51.  
*L. sarcita* Fr. Mischwald Arikogel. VIII, 52.  
XL *scabrosa* Fr. Arikogel, Nadelwald, zw. Steinen. IX, 52; Mischwald beim Gosauzwang. VIII, 52.  
XL *Turci* Bres. Arikogel, Nadelwald, zw. Steinen. IX, 52.  
XL (ex aff. *Turci* Bres.). Mischwald Gosauzwang. VIII, 51.  
*Lycoperdon gemmatum* Batsch. Waldboden Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.).  
*L. pyriforme* Schäff. Mischwald Leisling, einzeln. VIII, 51 (P.); auf Baumstrünken von *Picea* Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.); *Picea*-Strünke Echerntal. IX, 51. (M.).  
*Marasmius perforans* Hoffm. Auf Fichtennadeln in den Wäldern der Hochsieg. XI, 51. (M.).  
*M. per peronatus* Bolt. *Piceetum* am Soleweg Steeg-Goisern. VIII, 52.  
*M. rotula* Scop. An Fichtenstrünken Untersee. VII, 52.  
*M. scorodonius* Fr. *Piceetum* Leisling, einzeln. VIII, 51.  
*Marssonina Juglandis* Sacc. An lebenden fol. von *Juglans regia*, überall in der Gegend von Steeg bis Ischl, ganze Bäume befallend, die allmählich ihre fol. verlieren.  
*Merulius tremellosus* Fr. Auf *Fagus* Kirchberg bei Hallstatt. XII, 51. M.  
*Monosporium agaricinum* Bon. Auf Resten einer *Fomes*-Art auf Fichtenstrünken in Pürgg. VIII, 52. (M.).  
XM *Mycena anodis* Bull. Einserkogel. VIII, 52.  
*M. avenacea* Fr. Mischwald Leisling u. Arikogel, einzeln. VIII, 52.  
XM *chlorantha* Fr. Einzel an Fichtenstrunk Gosauschmied. IX, 51.  
*M. epipterigia* Scop. Waldboden Wälder der Hochsieg. XI, 51. (M.).  
*M. galericulata* Scop. Auf Strunk im Leisling, VIII, 51; Weissenbachtal bei Goisern, VIII, 51. (P.); Strunk Hochsiegwälder, XI, 51 (M.).  
*M. leptocephala* Pers. Mischwald Arikogel. VIII, 52.  
XM *lineata* Bull. Grund eines Fichtenstrunkes Obertraun. Selten. IX, 51.  
*M. pura* Pers. *Piceetum* Sarsteinfuss bei Steeg, einzeln. VIII, 51; Mischwald Leisling. VIII, 51 (P.).  
*M. stannea* Fr. Mischwald Leisling, einzeln. VIII, 51; unter Krummholz Schlucht des Einserkogels.  
*M. tintinnabulum* Fr. *Piceetum* oberer Jagdsteig am Sarstein, 1000m; Fichtenstrünke Ruine Wildenstein. VIII, 52.  
*M. vitilis* Fr. Zwischen Moos Mischwald Arikogel. VIII, 51. Ausgezeichnet durch den ungemein langen und dünnen Stiel.  
*Naucoria* sp. Auf Waldboden Hochsiegwälder. XII, 51. (M.).  
*Nolanea proletaria* Fr. *Piceetum* Manegg. VIII, 51. Vereinzelt.

- Oidium erisypoides* Fr. Auf lebenden Blättern von *Thesium alpinum*, unterm Schafberggipfel, 1700m(P.); auf grünen fr. von *Lunaria rediviva* im Dürrenkessel, WVV 51 (M.); an lebenden fol. von *Alchemilla vulgaris*, Almwid. bei St. Leonhard, WVV, 51. (M.); an lebenden fol. von *Veronica laurica* und *Aquilegia vulgaris* Koppental; auf leb. fol. von *Senecio sarracenicus* beim Füschlsee, IX, 51 (M.); an leb. fo von *Verbascum* sp., Hallstatt, XI, 51 (M.)
- Omphalia fibula* Bul. ? an Felsen Moos am Ufer des F. Inngsees 11. 51 (M.).
- XO. *scyphoides* Fr. Zwischen Mös Mischwald im Teisling, einzelt WVV
- Ophiobolus porphyrogenus* Sacc. An kürzeren Stengeln von *Digitalis ambigua*, Sarsteinfuss bei Obertraun. VIII, 51
- Ovularia obliqua* Quél. An leb. fol. von *Rumex obtusifolius* an Au. V 52
- Panus rudis* Fr. An einem Strunk bei Goisern. Einzelt, 51. an einem Strunk von *Acer pseudoplatanus* Sarsteinfuss bei Steeg, WVV
- P. stipticus* Fr. Fiecca-Strunk, Ruine Wildenstein. VII 52
- Panaeolus campanulatus* Fr. Mischwald im Teisling an verschützten Stellen. Vereinzelt. III 51
- Paxillus atrotomentosus* Batsch. Flechtenstrünke am Raschberg, an großen Stücken mehrfach. VIII, 51. (P.).
- P. involutus* Batsch. Auf nackten Wegschotter Obertraun. IX, 51.
- Peronospora arborescens* De Toni. Lebende fol. von *Papaver somniferum*. Au, X, 51.
- P. nivea* Schroet. An leb. fol. von *Pimpinella saxifraga* Arakoge? III, 51.
- Phallus impudicus* L. Mischwald im Teisling. VIII, 51, vereinzelt.
- Phlebia merismoides* Fr. An menschem Zweig von *Fraxinus* an Weissenbach bei Goisern. VII, 52.
- X*Pholiota duna* var. *xanthophylla* Bres. *Tungii* Trid., vol. II, p. 52. Tab. 159 et *Iconogr. mycol.* Tab. 689. An einem Strunk von *Acer pseudop.* Köppenwinkelalm. IX, 52. Stimmt gut auf obige Art nur war der Hutrand trübrotviolett und der Stiel nicht keilig sondern faserig gestreift. Wie Bresadola schreibt, sind die Lamellen zuerst lebhaft schwefelgelb, dann später grellbraun. Der Ring ist aber nicht weiss, sondern ähnlich dem Hutrand trübviolett. Wegen der Färbung an Ring und Hutrand könnte eine neue var. angenommen werden.
- Ph. squarrosa* Fl. Dan. Am Grund eines lebend. Birnbäumens, St. Agatha bei Goisern. IX, 52. In einem Büschel von 30 Stück.
- Ph. unicolor* Fl. dan. An Moderholz im Echerntal. IX, 51. (M.)
- Phragmidium Rubi* Wint. An leb. fol. von *Rubus sulcatus* und *R. candidans* bei Lauffen. VIII, 52
- Ph. subcorticium* Wint. An lebend. fol. von *Rosa arvensis*. Jochwand bei Goisern. VII, 52.
- X*Phyllosticta aliena* Sacc. Auf leb. fol. von *Evonymus europaeus*. Au bei Steeg. VIII, 51.
- Ph. cruenta* Kick. An welkenden fol. von *Polygonatum officinale* an der Traun bei Aussee. Selten. VIII, 51.
- X*Ph. lathyrina* Sacc. et Wint. Auf welkenden fol. von *Lathyrus silvester*. Alpengarten bei Aussee. IX, 51

- Phytopathora infestans* De Bary. An leb. fol. von *Solanum tuberosum* in Au. VIII, 51.
- Plasmopara nivea* Schroet. An leb. fol. von *Aegopodium podagraria* in Au. VIII, 51.
- Pleurotus ostreatus* Jacq. An einem Ahornstrunk in der Schmaranz bei Goisern. VII, 51. (P.).
- XPl. *pulmonarius* Fr. Auf *Fagus* am Kirchberg bei Hallstatt. IX, 52. (M.). Entspricht der Abb. in Boudier, Icon. mycol. Tab. 293. Die Beschreibung in Ricken, Vademecum f. Pilzfreunde, 2. Aufl., 1910, p. 65. ist nicht zutreffend. Auf der Hutoberseite sind rote Flecken, durch Bakterien hervorgerufen zu sehen, was bekanntlich bei *Pl. ulmarius* Bull. häufig der Fall ist; ferner ein Anflug von olivbrauner Farbe durch den saprophytischen Pilz *Cladosporium* (gleichfalls wie bei *Pl. ulmarius* Bull.) oft zu sehen.
- Pluteus leoninus* Schäff. Mischwald am Herndlberg bei Goisern. VIII, 52).
- XPl. *pellitus* Pers. Buchenstrunk in Lauffen. VII, 52. (P.); Arikogel, VIII, 52. *Pl. Roberti* Fr. dürfte von obiger Art spezifisch nicht verschieden sein (wohl nur var.); etwas kleiner und mehr starr als *Pl. pellitus* Pers. Das Ex. vom Arikogel ist sehr klein (Hutdurchmesser 2 cm); dem Hut fehlen aber die haarigen Schuppen in der Mitte, dabei ist der Pilz sehr weich. Es kann sich also trotz der Kleinheit nicht um *Pl. Roberti* handeln.
- Pl. cervinus* Schaeff. Auf einem Strunk im Leisling, vereinzelt. VIII, 51; an einem Fichtenstrunk am Herndlberg. VIII, 5. (M. et P.). Lamellenschneide, wie oft am Fichtenholz, schwarz.
- X*Polyporus ciliatus* Fr. Zwischen Krummholz in einer Schlucht des Einserkogels. VIII, 52. Poren blassbraun, nicht zimtbräunlich wie Ricken, Vademecum anführt.
- P. hispidus* Fr. An *Fagus* am Arikogel. VIII, 52.
- X*P. Schweinizii* Fr. Auf Erde, Mischwald Arikogel vereinzelt. VIII, 51; auf Waldboden am Kirchberg bei Hallstatt, XII, 51. (M.).
- Polystictus hirsutus* Schrad. Auf *Fagus* beim Fuschlsee. IX, 51.
- X*P. tomentosus* Fr. Auf Erde im Buchenwald am Weg zur Gassneralm im Katergebirge. VIII, 52. In Saccardo, Syll. fungor. für Frankreich angegeben. Die Abb. in Quel., Champign. du Jura et Vosg. I, tab. 17, fig. 1. konnte ich leider nicht einsehen. Das Bild in Britzelm., Hymen. Augsb. etz. Tab. 634. fig. 141 stimmt einigermaßen. Dagegen stellt dessen Tab. 611. fig. 66. etwas ganz anderes dar.
- P. unicolor* Sacc. An morschem Buchenholz Arikogel und Ruine Wildenstein. VIII, 51.
- Poria medulla-panis* Fr. Auf Moderholz Wälder der Hochsieg. XI, 51. (M.).
- P. obliqua* Bres. An Buchenzweigen im Leisling. VII, 52. (P.).
- X*P. purpurea* Fr. Auf Moderholz beim Kessel (Hallstatt). IV, 52. (M.). Der *P. rhodella* ähnlich aber derber und dunkler.
- Psalliota arvensis* Schäff. Mischwälder Leisling. VIII, 51. (P.).

- Puccinia Aegopodii* Link. An leb. fol. von *Aegopodium adagraria* am Arikogel. VII, 52.
- P. Arenariae* Schroet. Garten in Au an leb. fol. von *Dianthus sinensis*. Trat epidemisch auf versch. *Dianthus*-Arten auf (P.).
- XP. *Bellidiastri* Wint. An fol. von *Aster bellidiastrum*, Koppenschlucht bei Aussee. IX, 52.
- P. Cirsii* Lasch. Auf leb. fol. von *Cirsium oleraceum* am Sarsteinfusse bei Steeg. Uredosporen. VIII, 51.
- P. coronata* Corda. An leb. fol. von *Rhamnus frangula*, Arikogel, VII, 52.
- P. Hieracii* Mart. An leb. fo von *Hieracium silvaticum* am Siriuskogel. VII, 51; ebenso in Lauffen. VIII, 51.
- P. Pimpinellae* Link. An leb. fol. von *Pimpinella saxifraga* am Zinken. VII, 51.; an fol. von *P. magna* am Hallberg bei Hallstatt. V. 52. (M.).
- P. Primulae* Duby. An leb. fol. von *Primula elatior* am Arikogel. VII, 52.
- P. Prenanthis* Fuck. An leb. fol. von *P. purpurea* am Siriuskogel, VII, 51.; Lauffen, VIII, 51.
- P. Phragmitis* Körn. An leb. fol. von *Phr. communis*, Hollereck, Traunsee. VIII, 52 (M.).
- P. Violae* D. C. An leb. fol. von *V. odorata*. Lauffen VIII, 51
- Pustularia Stevensoniana* Renm. Auf Anthracit in einem gedeckten Raum des Elektrodenwerkes Steeg. VII, 52. (P.). Der Anthrazit war offenbar verschmutzt.
- XRamularia *Coleosporii* Sacc. Auf *Coleosporium Cacaliae* Otth. an leb. fol. von *Adenostyles alpina*. Obertraun. IX, 51.
- R. variabilis* Fuck. Auf leb. fol. von *Verbascum Thapsus* in Au. VII, 52.
- Russula aurata* With. Unter *Picea* am Sarsteinfusse bei Steeg und Untersee, VIII, 51.; Mischwald im Leisling einzeln; Fichtenwald beim Gosauschmied. IX, 51.
- R. decolorans* Fr. Mischwald Arikogel. VIII, 52.
- R. elegans* Bres. Unter *Picea Herndlberg*. VIII, 51. (M. et P.).; Arikogel VIII, 51.
- R. elephantina* Fr. Mischwald im Leisling. VIII, 51. Fichtenwald beim Gosauschmied, einzeln. IX, 51.
- R. emetica* Schöff. Mischwald im Leisling, einzeln. VIII, 51.
- R. emetica* ssp. *fragilis* Sing. Mehrfach im Gebiete, auch violette oder fast weisse Stücke.
- R. lactea* Pers. Fichtenwald Gosauschmied, einzeln. IX, 51.
- R. nauseosa* Pers. Mischwald Leisling, vereinzelt. VIII, 51.; Fichtenwald am oberen Jagdsteig am Sarstein, 1000m.
- R. nitida* Pers. Mischwald Leisling, vereinzelt. VIII, 51.
- R. ochracea* Schw. Mischwald Arikogel, selten. VIII, 51.; Rehkogel bei Goisern. VIII, 51.
- R. olivacea* Schöff. Mischwald am Zwölferkogel, einzeln. VIII, 51.
- R. olivascens* Fr. Mischwald im Leisling, einzeln. VIII, 51.
- R. puellaris* Fr. Mischwald Herndlberg und Leisling, einzeln. VIII, 51.; Fichtenwald Gosauschmied., vereinzelt. IX, 51.

- Russula Queletii* Fr. Waldboden Burgstall von Pürgg. X, 51. (M.).  
Blässlinge, ganz weiss.
- R. roseipes* Secr. Mischwald Arikogel, selten. VIII, 51.
- R. rubra* Krombh. In Krummholz in einer Schlucht des Einserkogels.  
VIII, 52. Einzelne Stücke auch mit weisslichem Hute, Mitte etwas  
grünlich. Singer, Monogr. d. Gattung *Russula* (*Hedwigia*, Bd. 66, 1926,  
p. 240) gibt Hut selten ganz weisslich, Stiel zuletzt an der Basis  
schmutzig aschgrau an. Auch Mischwald Arikogel und Herndlberg.  
VIII, 51.
- R. sanguinea* Bull. Unter *Picea* am Sarsteinfusse bei Steeg, einzeln.  
VIII, 51; Mischwald Arikogel, selten. VIII, 51.
- R. virescens* Fr. Mischwald Arikogel. VIII, 51. Hut schmutzig weiss-blass.  
Nach Singers Monographie, p. 248-Färbung im Alter.
- Schizoxylon Berkeleyanum* Fuck. In welkenden Flecken lebender fol.  
von *Viola biflora*. Koppenschluht. VIII, 51. Sehr auffallend ist die  
Unterlage!
- Scolecotricnum graminis* Fuck. Auf leb. fol. von *Calamagrostis mon-*  
*tana* am Fusse des Zinken, mehrfach. VII, 51.
- X *Septoria Bellidiastri* Allesch. An welkenden fol. von *Aster bellid.*  
Koppenschluht bei Aussee. IX, 52.
- S. Chelidonii* Desm. An leb. fol. von *Ch. maius*. Ischl. VII, 51.
- S. Hyperici* Desm. An leb. fol. von *H. quadrangulum*, Arikogel, VII, 51.
- S. Orchidearum* West. var. *Listerae* Keissler in Beih. Bot. Centralbl.  
38, 1930, Abt. II, p. 424. Syn. *S. Listerae* Allesch. An leb. fol. von *L.*  
*ovata* am Sommersbergersee. VII, 52.
- S. scabiosicola* Desm. Auf leb. fol. von *Knautia*-Arten, mehrfach im Geb.
- Sphaerotheca Castagnei* Lev. An Stengeln von *Ulmaria vulgaris* in  
Goisern. VII, 51.
- Sporocybe resinae* Fr. An Fichtenharz beim Gosauschmied. IX, 51.
- Sporotrichus* sp. Am Saftfluss von *Acer pseudoplat.* Untersee. VII, 52.  
Bildet einen feinen, weissen Überzug an der braunen Saftflussmasse;  
es sind hyaline Hyphen sichtbar, die seitlich weisse, längliche,  
abgerundete Konidien tragen.
- Stemonitis fusca* Rost. Auf morschem Fichtenholz Arikogel. VIII, 51.
- Trametes cinnabarina* Jacq. Fichtenstrunk Koppental. VIII, 51.
- T. gibbosa* Pers. *Acer pseudoplatanus*-Strunk Untersee. VIII, 51.
- T. Pini* Thore. Fichtenstrünke Vorderer Gosausee und Manegg. VII, 52.
- T. rubescens* Schw. An *Acer pseudopl.* in der Ramsau bei Goisern. VIII, 51.  
(P.); auf *Alnus viridis* am Hirschbrunn bei Hallstatt. IX, 51. (M.).
- Tremella mesenterica* Retz. Auf Moderholz Leisling, einzeln. VIII, 51. P.
- Tremellodon gelatinosum* Pers. Leisling auf Strünken, einzeln. VIII, 51.
- Tricholoma albobruneum* Pers. Waldboden Echerntal. IX, 51. (M.).
- Tr. argyraceum* Bull. Unter *Picea* im Echerntal. IX, 51. (M.); Mischwald  
Leisling, VII, 52. Riesenexemplar mit Hut 12 cm Durchmesser.
- X *Tr. cinerascens* Bull. Mischwald Arikogel und Einserkogel. VIII, 52.
- Tr. grammopodium* Bull. Mischwald Arikogel. VIII, 51. Fast weiss.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: [130](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Aufzählung von Pilzen aus verschiedenen Teilen des Salzkammerguts mit besonderer Berücksichtigung von Steeg, \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 130\) 1-12](#)