II P038P

Hochachtungsvollst gewidmet
vom Verfasser.

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT; Nr. 153.

AUFZÄHLUNG VON PILZEN AUS VERSCHIEDENEN TEILEN DES SALZKAMMERGUTES MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEEG

1954

In den Arbeiten Nr. 117, 126 und 130 wurden Pilzfunde von Steeg am Hallstätter See sowie aus dem weiteren Bereiche des Salzkammergutes aus den Jahren 1950-1952 veröffentlicht. Diesmal erfolgt eine ähnliche Liste mit Funden aus dem Jahre 1953. Es sind darin Makromycetes und Mikromycetes enthalten, wobei erstere die Hauptmasse bilden.

Über den 578 m hohen Arikogel bei Steeg wurde in der ersten Pilzliste (Arbeiten, Nr. 117) ein Pilzaspekt für die Monate Juli bis September 1950 gegeben. In den Jahren 1951 und 1952 fehlte ein solcher in der gleichen Zeit. Dasselbe war auch im Jahre 1953 der Fall. Dagegen gab es im August 1953 am Gosauhals bei Steeg im Piceetum einen Aspekt von Marasmius peronatus Bolt., ferner an einer beschränkten Stelle im Piceetum des Jägersteiges am Sarstein bei Steeg einen Aspekt von Geaster fimbriatus Fr., endlich im Piceetum am Zwölferkogel nächst Eisenlehen bei Steeg einen Aspekt von Cortinarius (Dermocybe) orellanus Fr.

Besonders sei auch noch auf die alpinen Kümmerformen von Hutpilzen auf magerem Sunstrat am Zwölferkogel bei Steeg aufmerksam gemacht, wie sie bei einzelnen Cortinarius-Arten, Craterellus lutescens, Hygrophorus chlorophanus, Inocybe lanuginosa u.a. sowie am Feuerkogel bei Ebensee bei Clitocybe gilva zu sehen waren. Derlei Zwergformen wurden auch anderwärts in den Alpen beobachtet.

Schliesslich seien noch einige bemerkenswerte Pilzfunde bes. hervorgehoben:

Oidium erisyphoides Fr. epidemisch auf einer Begonia-Kultur in Steeg.

Pseudopeziza Astrantiae Niessl förmlich epidemisch am Zinkenkogl bei Aussee.
Ramularia evanida Sacc.reichlich an Gentiana asclepiadea auf der Pötschenhöhe.
Puccinia Arenariae Schroet.an Dianthus barbatus epidemisch im Garten des Herrn J.Pilz in Au 52 bei Steeg.
Russula emetica ssp.fragilis Sing.mit Prolifikation.
pseudodelica Lge.
Tricholoma psammopus Kalchbr.
Trametes odorata Wulf.abnorme Wuchsform im Dunklen.
Collybia radicata Bull.sonderbare Wuchsform.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein X nach dem Namen bedeutet SELTEN.

Amanita verna Bull.X Fichtenwald Zwölferkogel nächst Eisenlehen bei Steeg und Soleweg bei Hallstatt.VII.
Anthina dichotoma Fr.X An dürren fol.von Helleborus niger im Koppen bei Obertraun.VIII.
Auricularia sambucina Mart.An Stämmen von Sambucus nigra,Arikogel VIII.(J.Pilz);auf Holz im Glashaus Au 52; auf horizontaler Unterlage gewachsen,daher abnorme Wuchsform,rund mit zentral.Stiel.
Boletus appendiculatus Schaeff.Karbach-Eisenau am Traunsee.VIII. (Morton).
B.granulatus L.Neben Latschen in grösserer Zahl;Feuerkogel;VII.
Bostrychonema alpestre Ces.An lebenden fol.von Polygonum viviparum.Schönbergalm.VII.
Botrytis Bassiana Fm.An Rhizotrogus solstitials(Junikäfer).Au bei Steeg.VII.
Calloria sp.Auf morschem Zweig von Fagus;Arikogel.VIII.
Cercospora Mercurialis Bow.Auf leb.fol.von Mercurialis perennis. Schönbergal.VII.
Clitocybe gilva Pers.Zwischen Latschen am Feuerkogel;VII.Der Höhenlage (1550m)entsprechend,klein,Hut $1\frac{1}{2}$ cm dm.(Morton).
Cl.incilis Fr.?.Schlucht des Einserkogels bei Steeg;moosbewachs.
Fichtenstrunk Soleweg bei Hallstatt.VII.
Cl.pruinosa Lasch.Piceetum Sarstein und Gosauhals bei Steeg;Hut rissig,grau mit weissem Reif.
Coleosporium Campanulae (Pers.).An leb.fol.von Campanula sp.Au.VII.

Collybia butyracea Bull.Waldrand Zinkenkogel bei Aussee.VIII.Ganz blass wie Bresadola,Icon.mycol.Tab.200.

C.platyphylla Pers.Piceetum am Sarstein bei Steeg.VIII.

C.radicata Relh.X.Holz Herndlberg bei Goisern.VIII.Auffallend blasse,glatte,sehr kurzstielige,z.Z.büschelig wachsende Form.

C.velutipes Curt.Auf Salix,Hollereck am Traunsee.(Morton);Strunk Untersee,anfangs VIII.

Coniosporium Physciae Sacc.Am Thallus und an den Apothecien von Xanthoria parietina.Arikogel.VII.

Coprinus comatus Fl.Dan.Herndlberg.VIII.

C.disseminatus Pers.Zwischen Moos an Stämmen.Am Traunsee bei der Eisenau.VII.(Morton).

C.plicatilis Curt.Im Gras am Arikogel.VIII.

C.subtilis Fr.Auf Erde eines Gartengeschirres.Au.IX.(Pilz).Hut gewölbt,rosa,trocken bräunlich,etwas flaumig;0.2 cm.Lamellen braun,entfernt,mit weisser Schneide.Stiel weiss,1.5 X 2 cm. Entspricht der Taf.23,Fig.6,(die kleinen Stücke)in Ricken,Die Blätterpilze.

C.velaris Fr.Morsches Holz am Zwölferkogel nächst Eisenlehen.VIII.

Cortinarius anthracinus Fr.Auf Holz;Arikogel.VIII.

C.(Telamonia)gentilis Fr.Auf einem Pfahl in Au.VIII.Entspricht dem Bild in Cooke,Ill.Brit.Fungi,Tab.806.Nur haben die Lamellen blutrote Flecken und die Schneide derselben ist gezähnt.In dieser Hinsicht gemahnen die Stücke an C.(Dermocybe)fucatophylla Lasch.,eine etwas ungenügend bekannte Art,die in Britzelmayer,Hymenomyc.,Tab.399,fig.330 abgebildet ist;doch ist der Stiel bei den Stücken von Au gegürtelt.

C.(Telamonia)hemitrichus Pers.Piceetum Zwölferkogel nächst Eisenlehen.VIII.

C.(Hydrocybe)isabellinus Batsch.Im Sphagnetum am Sarstein bei Steeg.VIII.Entspricht dem Bild in Cooke,Ill.Brit.Fungi, Tab.829.

C.(Phlegmacium)multiformis Fr.Drosera-Moor am Hollereck am Traunsee.X.(Morton).

C.(Dermocybe)orellanus Fr.Piceetum Zwölferkogel beim Eisenlehen. VIII.An einer grösseren Stelle in solcher Menge,dass der Pilz einen Aspekt hervorrief.

C.(Dermocybe)sanguineus Wulf.Auf magerem Waldboden ,Schlucht des Zwölfers.VIII.Sehr klein;Hut 0.5 cm;Stiel 3 X 0.3 cm.Es sind die Kümmerformen alpiner Standorte,wie solche auch am Schneeberg vorkommen.

C.(Hydrocybe)subferrugineus Batsch.Auf magerem Waldboden,Schlucht des Zwölferkogels.VIII.Sehr klein,Hut 2cm,Stiel sehr kurz.

C.(Phlegmacium) turmalis Fr.Fichtenwald Zwölferkogel beim Eisenlehen.VIII.Sieht dem C.multiforme Fr.sehr ähnlich,hat sehr deutlcih mehrere Gürtel am Stiel und einen sehr schmierigen Hut.

C.(Dermocybe)venetus Fr.Piceetum am Gosauhals.VIII.

Coryne sarcoides Tul.An Hirnschnitten von Fagus im Weissenbachtal bei Goisern.IX.(Pilz).

Craterellus lutescens Pers.Piceetum am Sarsteinfuss und Schluchten des Zwölferkogels.VIII.Auf magerem Waldboden.Klein,Hut 2 cm. Stiel2 X 0.3 cm.

Cytospora pseudoplatani Sacc.An dünnen Zweigen von Acer pseudopl. Arikogel.VII.

Dasyscypha cerina Fuck.An Buchenzweigen am Arikogel.IX.

Flammula liquiritiae Pers.Auf Fichtenholz im Leisling.VI.(Pilz).

Fomes applanatus Perüs.Ah Fagus bei der Koppenbrüllerhöhle.X.(M).

F.igniarius (L.).Karbach-Eisenau am Traunsee.VIII.(Morton).

F.ungulatus Schaeff.Auf Larix-Strunk am Hallberg,Hallstatt.III.(M)

Galera mniophila La.Sphagnetum im Ödenseemoor bei Kainisch.VII.(M)

Geaster fimbriatus Fr.Jägersteig des Sarstein,Piceetum.VIII.Auf einer kleinen Fläche gegen 100 Stück.

Geopyxis cupularis Sacc.X.Im Fagetum des Krapfgrabens bei Goisern und Obertraun.VII.Auf Holzzementplatten in Au.VII.(Pilz).Auf letzterem Standort sonderbares Substrat,offenbar zersetzte Holzteilchen im Zement als Nahrungsquelle.Sehr klein.

Grandinia papillosa Fr.Auf Buchenholz am Arikogel.VII.

Helotium scutula Karst.Auf abgestorbenen Stengeln von Helenium atropurpureum in Hallstatt 150.X.(Morton).

Helvella esculenta Pers.Auf faulend.Holz im Leisling.X.(Pilz).

Hydnum spadiceum Pers.X.Piceetum am Gosauhals.VIII.

Hygrophorus chlorophanus Fr.Schluchten des Zwölferkogels.VIII. Zwerghaft.Hut ½ cm;Stiel 2 X ½cm.Im Schotter einer Rinne.- Im Sphagnetum des Ödenseemoores.VII.(Morton).

H.(Limacium)melizeus Fr.Piceetum Arikogel.VIII.

Hypomyces lateritius Tul.An Lactarius sanguifluus am Sarstein.VIII. Für L.deliciosus in Liste II(1953)bereits angeführt;hier auf einer verwandten Art.

Hypholoma appendiculatum Fr.Auf Erde am Hirschbrunn,Hallstatt. VIII.(Morton).

H.Candolleanum Fr.Ebenda,VIII.(Morton).

H.capnoides Fr.Wiese bei Aussee.IX.

H.sublateritium Fr.An Stümpfen am Sarstein bei Steeg.VIII.

Hypoxylon coccineum Bull.An Buchenstämmen im Koppen unweit Obertraun.VIII.An Hirnschnitten von Fagus im Weissenbachtal bei Goisern.IX.(Pilz).

Inocybe descissa Fr.Auf Waldboden am Soleweg bei Hallstatt;VII.

Irpex obliquus Fr.(Syn.Poria obliqua Schrad.).Auf Splitterholz von Larix am Hallberg,Hallstatt.III.(Morton).

Lachnea hemischphaerica Gill.Zwischen Moos auf Erde am Arikogel,VIII.

L.hirta Gill.Auf Erde zwischen Moos beim Hirschbrunn.VII.(Morton).

Lactarius sanguifluus Paul.Piceetum am Sarstein bei Steeg.VIII. Dieser auf Kalk auftretende Pilz aus der Verwandschaft des L. deliciosus Fr.wurde heuer das erste Malin nur einem Stück gefunden,das vom Parasiten Hypomyces lateritius Tul befallen war.

L.zonarius Bull.Piceetum auf der Pötschenhöhe.IX.Waldboden am Herndlberg .VIII.

Lasio sphaeria ovina Ces.et De Not.An morschem Fagus-Holz im Koppental bei Obertraun.VIII.

Lenzites cinnamomeus Fr.Auf Corylus am Kramerstein im Gosautal.X. (Pilz).Dürfte dieser seltene Pilz sein;stimmt ziemlich auf Fries,Icon.Hymen.Tab.177,nur mehr rotbraun und flach.

Leotia gelatinosa Hill.Unter Fagus am Zwölferkogel beim Eisenlehen. VIII.Ein Stück mit seitl.aussprossendem zweiten Köpfchen.

Lepiota acutesquamosa Weinm.Fagetum im Rettenbach bei Ischl.IX.

Leptostroma Arurunci Fr.An dürren Stengeln von Aruncus silvestris am Soleweg bei Hallstatt.VII.

Libertella faginea Des.An Rinde von Fagus silvatica im Koppental bei Obertraun.VIII.

Lycoperdon echinatum Pers.Auf Waldboden am Sommeraukogel am Hallstätter Salzberge.X.(Morton).

Marasmius androsaceus Fr.Piceetum am Sarsteinfuss bei Steeg.VIII.

M.erythropus Bres.X.Auf einem Strunk zwischen Moos im Leisling. VII.(Pilz).Passt auf Bresadola,Icon.mycol.,Tab.496.Diese Art wird von Ricken,Vademecum f.Pilzfreunde,2.Aufl.als indentisch mit M.lupuletorum Weinm.angesehen.Vergl.Index,p.341).

M.peronatus Bolt.Piceetum am Gosauhals bei Steeg.VIII.An einigen Stellen in grosser Menge,fast aspektbildend.Oft rissig,Hut 8 cm;Stiel 9 cm.

Melampsora Larici-Caprearum Kleb.Auf fol.von Salix Caprea am Hirschbrunn bei Hallstatt.IX.(Morton).

M.Laricis-eritea Kleb.f.eoitaa Kleb.An lebenden fol.von Salix glabra auf der Schönbergalm.VII.(Morton).

Monosporium agaricinum Bon.Auf Clitocybe gilva am Fuss des Grubberges bei Hallstatt.VIII.

Mycaena capillaris Schum.Auf faulenden Buchenblättern am Gosauhals. VIII.

M.tintinabulum Fr.An Picea-Strunk am Hirschbrunn.V.(Morton).

Naucoria remulenta Fr.Auf Larix in Hallstatt 150.X.(Morton).

Oidium erisiphoides Fr.Auf Begonia-Blättern in Au bei Steeg.VII.Trat in einer Begonia-Kultur massenhaft auf,alles vernichtend.

Ovularia obliqua Oud.An leb.fol.von Rumex alpinus auf der Schönbergalm.VII.(Morton).

Oudemabsiella mucida Höhn.(Syn.Armillaria mucida Fr.).Auf Holz am Gosauhals.VIII.

Panaeolus retinugis Fr.X.Auf Erde bei der Wetterstation am Hollereck am Traunsee.X.(Morton).

Peronospora alta Fekl.An leb.fol.von Plantago maior am Arikogel.VII.

Pleurotus limpidus Fr.X.Auf Strunk am Gosauhals.VIII.Etwas gallertig,geruchlos;Hut schmutzig gelblich,1-4 cm,wie ohne Stiel. Lamellen gelblich gefärbt,in einem Punkt zusammenlaufend.Entspricht dem Bild in Fries,Ic.selt.Hymenocetum,Tab.88,Fig.3.

Phlebia merismoides Fr.Auf Fichtenholz in Hallstatt 150.X.(Morton).

Pholiota aurivella Batsch.Auf Buchenscheitern in Hallstatt.VII.(M).

Ph.marginata Batsch.Auf Fichtenstrunk am Hirschbrunn.VII.(Morton). An Wurzeln einer lebenden Fichte auf der Schönbergalm.VII.

Phragmidium fusiforme Schroet.An leb.fol.von Rosa alpina im Koppen bei Obertraun.VIII.

Ph.Sanguisorbae Schroet.An leb.fol.von Sanguisorba officinalis in Rindbach bei Ebensee.VI.(Morton).

Phyllosticta Zahlbruckneri Bauml.An leb.fol.von Dianthus sinensis in Au 52.VII.

Polyporus adustus Willd.An Salix sp.am Hollereck.IX.(Morton).Resupiant ausgebildet.

P.elegans Bull.var.nummularius Bull.Auf Buchenzweigen am Sarstein bei Steeg.VIII.

P.osseus Kalchbr.Auf Splitterholz von Larix am Hallberg(Hallstatt). VII.(Morton).Oben darauf gewachsen,daher abnorm kreisförmig gestaltet.

P.ovinus Schaeff.Piceetum am Sarstein bei der Gosaumühle;Pötschenhöhe.VIII.

Polystictus hirsutus Schrad.Auf Abies-Strunk in Karbach-Eisenau am Traunsee.VIII.(Morton).

P.velutinus Pers.An Fagus bei der Koppenbrüllerhöhle.X.(Morton).

P.versicolor (L.).Auf Abies-Strunk in Karbach-Eisenau.VII.(Morton).

Pseudopeziza astrantiae Niessl.Am Fuss des Zinkens bei Aussee.IX. Massenhaft,eine förml.Epidemie an Astrantia maior.

P.Trifolii Eckl.An leb.fol.von Trifolium pratense ,Arikogel.VII.
Puccinia arenariae Schroet.An leb.fol.von Dianthus barbatus in Au 52.VII.Trat fast epidemisch auf,ähnlich wie im Vorjahr an D. sinensis.(Siehe Mitt.Nr.130:10).
P.coronata Corda.An leb.fol.von Rhamnus cathartica,bei Hallstatt. IX.(Morton).
P.Laserpitii Lindr.X.An leb.fol.von Laserpitium latifolium am Soleweg bei Hallstatt.VII.
P.Malvacearum Mont.Auf leb.fol.von Althaea rosea in Au 52.VIII.(Pilz).
P.obtusata Fisch.An leb.fol.von Phragmites communis am Hollereck. XI.(Morton).In Massen.
P.Phragmitis Koern.An leb.fol.von Phragmites ebenda.VIII.(Morton).
P.Porri Wint.Auf fol.von Allium carinatum am Fuss des Grubberges.VIII.
P.Sesleriae Sacc.An leb.fol.von Sesleria coerulea am Arikogel.VII.
Ramularia evanida Sacc.Pötschenhöhe.IX.An fol.von Gentiana asclepiad ea reichlich zu sehen,zumeist nur mehr in Flecken vorhanden.
R.Heraclei Sacc.An leb.fol.von Heracleum Sphondylium in Au.IX.
Russula aeruginosa Lind.Piceetum Sarsteinfuss bei Gosaumühle.Entspricht dem Bild in Schäffer,Pilze Mitteleuropas,Russula, Taf.IV.,fig.15.
R.emetica ssp.fragilis Sing.Fagetum am Grubbergfus s.VIII.Mit Prolifikation;auf dem Stiel wächst seitlich ein Stiel mit kl. Hut heraus,der mit d.Hutrand des eigentl.Pilzes verwachsen ist.
R.lutea Huds.Piceetum Sarsteinfuss bei Gosaumühle.VIII.Entspricht dem Bilde in Pilze Mitteleuropas,Schäffer,Russula,Taf.XIII,Fig.43.
R.olivaceus Pers.Piceetum Sarsteinfuss bei Obersee.VIII.;Leisling VIII.(Pilz).Wie Pilze Mitteleuropas,Schaeffer,Russula,Taf. XII,Fig.ro,Stück links zuoberst.--Am Zwölferkogel bei Steeg VIII.Wie l.c.Taf.XII,Fig.38,oben.3.Bild von links.
R.pseudodelica Lge.X.Mischwald am Soleweg bei Hallstatt.VII.;einzeln. Entspr.genau der Abb.in Pilze Mitteleuropas,Schäffer,Russula Taf.II,Fig.6.
R.Turci Bres.Piceetum Zwölferkogel nächst Eisenlehen.VIII.Wie l.c. Taf.XIII,Fig.42.
Schizophyllum commune Fr.An Fagus beimKoppenbrüller.X.(Morton).
Septoria oenotherae West.An leb.fol.von Oenothera biennis,Obertraun VIII.
Stereum hirsutum Willd.Picea-Strunk in Karbach-Eisenau.VIII.(Morton).
Thelephora terrestris Ehrh.Schlucht Zwölferkogel.VIII.
Trametes gibbosa Schrad.Picea-Strunk am Hundsort bei Hallstatt.III. (Morton).
Tr.odorata Wulf.Holz im Innern des Brunnens in Au 52.VIII.(Pilz). Abnorm;von einem resupinatem Fruchtkörper erheben sicj hornartige Zapfen.

Tr.rubescens Schw.An Fagus beim Koppenbrüller.X.(Morton).
Tricholoma argyraceum Bull.Drosera-Moor am Hollereck.X.(Morton).
Tr.luridum Schaeff.Piceetum Zwölferkogel beim Eisenlehen.VIII.
Tr.melaleucum Pers.Piceetum Pötschenhöhe.IX.
Tr.psammopus Kalchbr.Auf Holz am Sarsteinfuss bei Steeg.VIII.Typisch für Larix.Holzart konnte nicht festgestellt werden,ob Larix oder Picea.Wie in Ricken,Blätterpilze Deutschlands,Bd.II., Taf.96,Fig.2.
Tr.personatum Fr.Baumstrunk einseitig in starken Gruppen bei Eisenlehen.VIII.Fagetum Weissenbachtal bei Goisern.IX.(Pilz).
Trogia crispa Pers.Auf Holz Fuss des Gosauhalses.VIII.
Tuberculina persicina Sacc.An Coleosporium Petasitis an P.officinal. Obertraun.VIII.
Ulocolla saccharina Pres.Auf Holz am Herndlberg(Goisern).VIII.
Uromyces scutellatus Lev.An lev.fol.von Euphorbia dulcis in Obertraun.VIII.
Xylaria polymorpha Pers.Auf Holz Gosauhalsfuss.VIII.
Zignoella pulviscula Sacc,X.Hirnschnitt von Fagus im Weissenbachtal.IX.(Pilz).

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Literaturnachtrag

Demelius,P.,Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora von Aussee.(Mitt. natw.Ver.f.Steiermark,48(1901):282-288).

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNGEN.

In der Aufzählung von Pilzen 1953(Arbeiten Nr.130) haben sich folgende Fehler eingeschlichen:
S.2.Z.14 von oben lies Spegazziniana statt Spegazziana.
S.2.Z.17 von oben lies Anthina statt Anthira.
S.3.Z.14 von oben liess entoxylinum statt entoxylnum.
S.4.Z.8. von oben liess Weissenbachtal statt Wessenbachtal.
S.4.Z.21 von oben liess 1931 statt 19307.
S.4.Z.22 von oben lies Bresadola statt Bresandola.
S.5.Z.21 von unten lies mniophila statt maiophila.
S.6.Z.15 von oben lies Inocybe statt Imocybe.
S.6.Z.22 von unten lies hirta statt Miria.
S.6.Z.16 von unten lies blennius statt biennius.
S.7.Z.6.von oben lies bryophilum statt bryophyllum.
S.7.Z.10 von oben setze vor scabrosa ein L.

S.7.Z.12 von oben setze vor Turci ein L.
S.7.Z.13 von oben setze vor (ex ein L.
S.7.Z.20 von oben hat per zu entfallen.
S.7.Z.18 von unten lies adonis statt anodis.
S.8.Z.21 von unten lies dura statt duna.
S.9.Z.1.von oben lies Phytophthora statt Phytopatora.
S.9.Z.16 von unten lies Schweinitzii statt Sschweinitzii.
S.10.Z.20 von oben lies Rehm statt Renm.
S.11.Z.23 von oben lies Keissler statt Keissller.
S.11.17 von unten lies Sporotrichum statt Sporotrichus.
S.11.Z.5 von unten lies albobrunneum statt albobruneum.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 153

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: Aufzählung von Pilzen aus verschiedenen Teilen des Salzkammergutes mit besonderer Berücksichtigung von Steeg, (Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 153) 1-9