

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT. Nr. 254.

Botanische Beobachtungen in Kaltern, Altenburg und Oberplanitzing

Von Regierungsrat Dr. Friedrich MORTON

BEITRÄGE ZUR FLORA DES UEBEREITSCH III

1964

In folgenden werden einige Aufnahmen mitgeteilt, die im Jahre 1957 gelegentlich verschiedener Begehungen gemacht wurden. Die immer mehr um sich greifende Vernichtung der Natur macht es notwendig, alles festzuhalten!

Aufnahme Nr. 2179.

KALTERN. Hügel gegenüber dem Bahnhof. Bodenneigung: 20-25 Grade.
Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 4.5.1957.
Wald mit Buschgehölzen.

Acer campestre	f	2	1
Ajuga reptans	fl	1	2
Alliaria officinalis	fl	1	2
Anemone trifolia	fl	2	3
Arabis Turrita	fr	1	1
Asarum europaeum	f	1	3
Asplenium Trichomanes	fr	1	2
Berberis vulgaris	fl	.	1
Celtis australis Buschwerk	f	2	1
Cornus sanguinea	f	2	1
Corylus 200-300	f	3	3
Crataegus oxyacantha	f	1	1
Evonymus latifolia	f	2	1
Fragaria elatior	ffl	1	2
Fraxinus Ornus Büsche	f	2	1
Galium cruciatum	fl	1	3
Geranium Robertianum	f	1	1
Hedera Boden und auf Bäumen	f	4	3
Hepatica nobilis	f	1	2
Hieracium silvaticum	flKn	1	1

Lamium Orvala		flKnfl	1	2
Ligustrum vulgare	200	f	2	1
Luzula albida		fl	1	2
Melica nutans		fl	2	2
Parietaria officinalis		f	1	2
Prunella vulgaris		f	1	3
Robinia Pseudacacia	Ø 10-20	f	3	2
Rosa sp.		f	1	1
Rubus sp.		f	1	1
Salvia glutinosa		f	1	2
Sambucus nigra	-300	erste flKn	2	1
Taraxacum officinale		fr	1	1
Tilia grandifolia	Ø 10-12 u. Büsche	f	2	1
parvifolia	Büsche	f	2	1
Viburnum Lantana	verblühte	fl	1	1
Vinca minor		f	2	1
Viola silvestris		f	1	1

Aufnahme Nr. 2179.

Zwischen Mitteldorf und Oberplanitzing. Exposition: Ost. Grösse der Aufnahme fläche: 20 mal 20 m. Aufnahme tag: 4. 5. 1957. Flüchtige Aufnahme.

Acer campestre	Ausschlag	f	1	1
Castanea sativa	Ø 5-10	f	4	3
Corylus Avellana		f	2	2
Crataegus Oxyacantha		f	1	1
Fragaria vesca		ffl	1	2
Galium cruciatum		fl	1	2
Geni germanica		flA	2	2
Gramina steril		f	3	
Hedera		f	1	1
Hieracium silvaticum		R	1	2
Pimpinella major		f	1	1
Altes Laub			3	

Aufnahme Nr. 2180.

Nach Oberplanitzing; vor dem verfallenden Turme. Exposition: SE. Boden neigung: 10-15 Grade. 15% Blöcke. Aufnahme tag: 4. 5. 1957.

Ajuga reptans		ffl	1	1
Amelanchier ovalis		f	.	1
Carpinus Betulus		f	2	1
Castanea sativa	Ø -16	f	4	3
ein Stock mit Ø 100 und zahlr. Trieben				

Cephalanthera alba		fl	1	1
Corylus 100-300		f	2	1
Cytisus hirsutus		fl	1	1
Erica 10		f	1	1
Euphorbia Cyparissias		fl	1	2
Fragaria vesca		f	1	1
Galium cruciatum		fl	1	2
Genista germanica		fl	1	1
Gramine steril		f	2	
Hepatica nobilis		f	1	2
Hieracium cf silvaticum		R	2	2
Larix ø 10-18		f	2	2
Picea 20-30		f	1	1
Pinus silvestris -ø 20		flfr	2	2
Poa vivipara		fl	1	2
Polypodium vulgare kümmerlich		fr	.	1
Potentilla rupestris		fl	1	1
Pteridium aquilinum		fA	.	2
Pulmonaria angustifolia		R	1	1
	verblühte	fl	1	1
Quercus Robur ø 20		f	2	1
Rosa rectis		f	1	1
Silene nutans		fl	.	1
Taraxacum officinale		fr	1	1
Tilia randifolia 100		f	.	1
Trifolium montanum		ffl	1	2
Veronica Chamaedrys		f	1	1
Castanea-Laub			4	

Aufnahme Nr. 2185.

Wald unterhalb des Bahnhofes Altenburg. Exposition. SE. Boden-
neigung: 5-10 Grade. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20.

Aufnahmetag: 5.5.1957. _ _ _ _

Cyclamen purpurascens		f	1	1
(irruher: europaeum)				
Fagus silvatica -ø 15		f	5	
5-15		f	1	1
Hedera		f	1	1
Hepatica nobilis		f	1	1
Sanicula europaea		f	.	1
Laubdecke 5-10!			5	

Ein dichter, sehr artenarmer Buchenbestand.

Aufnahme Nr. 2186.

Wald zwischen Altenburg und Kaltern. Exposition: Ost. Boden-
neigung: 20 Grade. Aufnahmetag: 5.5.1957.

Amelanchier ovalis	50-80	f	1	1
Anemone trifolia		fl	1	3
Anthyllis Vulneraria ssp.				
rubriflora		fl	1	1
Berberis	150	f	1	1
Coronilla Emerus	100-150	fl	2	2
prachtvoll entwickelt!				
Cytisus purpureus		fl	2	2
Erica	15	f	3	3
			(5)	(5)
Fagus	Ø 10-15	f	2	3
	100-150	f	3	3
	25-75	f	2	2
	20	f	1	2
Fragaria vesca		fl	1	1
Fraxinus Ornus	Ausschlag	ffl	2	1
Picea	10	f	.	1
Pinus silvestris	100	f	1	1
Polygala Chamaebuxus		fl	1	1
Quercus Robur	Ausschlag	f	1	1
Saponaria ocymoides		fl	1	1
Sorbus aucuparia	100-150	f	2	2
Viburnum lantana	100	fl	2	1

Dieses Pagetum, das üppigen Nachwuchs zeigt, hat als be-
merkenswerte Arten die prachtvoll entwickelte Coronilla Emerus,
sudeuropäisch-pontisch, Anthyllis Vulneraria ssp. rubriflora,
sudeuropäisch und Cytisus purpureus, illyrisch-transalpin.

Aufnahme Nr. 2187.

Wald südlich Kaltern, gegen den Waldrand hin. Exposition: Nordost
Bodenneigung: 5 Grade. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m.
Aufnahmetag: 5.5.1957.

Acer campestre	30	f	1	1
Anemone trifolia	kummerlich	ffl	1	2
Castanea sativa	50	f	.	2
Crataegus oxyacantha	20	f	1	1
Daphne mezereum	30	f		1

Fagus	Ø -30	f	5	4
	10-20 cm	f	3	3
Fragaria vesca		f	1	1
Hedera		f	1	1
Hepatica nobilis		f	1	2
auch die fa. marmorata				
Lamium Orvala		f	.	1
Lathraea squamaria		fl	1	2
Ligustrum vulgare	20	f	1	1
Lilium Martagon kümmerlich		f	1	2
		flKn	.	1
Listera ovata		f	1	1
Majanthemum bifolium		f	1	3
		fl	.	1
Pinus silvestris	-Ø 30	fr	2	1
Prenanthes purpurea		f	.	1
sehr kümmerlich				
Rosa agrestis	30	f	1	1
Salvia glutinosa		f	1	1
Sanicula europaea		f	1	1
		flKn	1	1
Tamus communis		f	1	1
Taraxacum officinale		f	1	1
Viburnum Lantana	30	f	1	1
Viola silvestris		f	1	1
Fagus-Laub	5 cm		4	
x-x-x-x-	- - - - -			

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [254](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Botanische Beobachtungen in Kaltern, Altenburg und Oberplanitzing. Beiträge zur Flora des Ueberetsch III. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 254\) 1-5](#)