



Sphingidae =
Schwärmer



Bombyces =
Spinner



Sphingiden = Schwärmer u. Aegeriden = Glasflügler

Die verschiedenen Gattungen und Arten der Schwärmer, Aegeriden (Sesien) wie auch die der in unserem Gebiet vorkommenden Zygaenen waren in den diesjährigen Sammelperioden mit nur sehr kleinen Beständen vertreten. Die Gründe und Ursachen hierfür sind verschiedener Natur. Einer der Gründe mag wohl in den vielen Schlechtwettereinbrüchen des Vorjahres - worunter unser regenreicher Bezirk besonders zu leiden hatte - zu suchen sein. Viele Tiere kamen nicht zur Entwicklung, andere wiederum konnten nicht oder nur dann kopulieren, wenn die Zeiten zur Kopulationsmöglichkeit bereits auf ein Minimum herabgemindert waren. Die Eiablagen blieben gering. Ein weiterer Umstand dieser Entwicklung war die große Trockenheit des heurigen Frühjahres, welche einen nicht unwesentlichen Einfluß auf Fauna und Flora verursachte. Der Falterbestand des Jahres 1967 mußte bei einer Vielzahl von Arten gering bleiben.

Folgende Daten wurden vermerkt:

Sphinx (Herse)

convolvuli L. 2.10.1967 Neuzeug/Letten i. Steyrtal (Hainböck)

Sphinx

ligustri L. 17.6.1967 Reichraming i. Ennstal,
Brunnbachtal, ca. 600m (Müllner)

28.6.1967 Steyr/Unterhimmel (Hainböck)

pinastri L. 6.6.1967 Garsten b. Steyr (Hainböck)

Deilephila (Chaerocampa)

elpenor L. 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 650m (Lichtenberger)

porcellus L. 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 650m (Lichtenberger)

Smerinthus

coellata L. 6.7.1967 Neuzeug/Letten i. Steyrtal (Hainböck)

populi L. 8.6.1967 Neuzeug/Letten i. Steyrtal (Hainböck)

Macroglossa (Hemaris)

soabiosae Z. 27.5.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 600m (Lichtenberger)

27.5.1967 Hinterstoder/Stodertal (Wimmer)

fuciformis L. 15.5.1967 Reichraming i. Ennstal,
Weissenbachtal 1.500m (Lichtenberger)

Synanthedon (Sesia)

vespiformis L. 8.5.1967 } e.l., Brunnenschutzgebiet Steyr
28.5.1967 } (Wimmer)

guliciformis L. 21.4.1967 e.l., Umgebung Steyr (Wimmer)

Ferner schreibt Kollege Tröml: Auf einem Areal von ca. 100 Quadratmeter fanden sich 8-10 Birkenstümpfe von etwa 3,5 - 6,5 cm Durchmesser, aus welchen ich am 11.4.1967 1 Raupe, am 13.4.1967

4 Raupen und 2 Puppen und am 18.4.1967 2 Raupen und 6 Puppen löste. Eine Puppenwiege befand sich zwischen Rinde und Holz, alle anderen lagen in Holz gebettet und mußten aus einer Tiefe von 0,5cm bis 3cm geschnitten werden. Leider verletzte ich manche Raupe und Puppe, so daß ich zuletzt nur 6 Stücke der Art bekam. Der Fundplatz war der Wolfenerwald b. Steyr. Folgende Schlüpfdaten habe ich vermerkt:

11.5.1967)
14.5.1967) e.l.; Wolfenerwald b.Steyr (Tremml)
15.5.1967)

Synanthedon (Sesia)

formicaeformis Esp.

26.5.1967 e.l.; Umgebung Steyr (Wimmer)

Siehe auch den Beitrag des Kollegen Otto Auer, Linz

Die Aegeriden (Sesien) des Großraumes Linz und Umgebung an anderer Stelle dieses Berichtes.

Zygaenidae = Widderchen

Zygaena

purpuralis Brün. 29.6. 67 Reichraming i. Ennstal,
Weissenbachtal i. etwa 500m (Wesely)
7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 600m (Lichtenberger)

meliloti Esp. 29.6.1967 Reichraming i. Ennstal,
Weissenbachtal in etwa 500-600m
Höhenlage; Tiere mit sehr breitem,
schwarzen Rand der Hinterflügel
(Wesely)
7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 600m (Lichtenberger)

filipendulae L. 29.6.1967 Reichraming i. Ennstal,
Weissenbachtal in ca. 5-600m (Wesely)
7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 600m (Lichtenberger)
14.8.1967 Steyr/Gründberg; ein sehr schönes
Stück der forma confluens mit voll-
kommen verflossenen Flecken (Tremml)

angelicae O. 18.5.1967 eine kleine Anzahl Raupen vom Gipfel
der Beisteinmauer (617m) bei Tratten-
bach i. Ennstal.
e.l. 8.6.-12.6.1967 Trattenbach/Beisteinmauer (Wesely)

carniolica Sc. 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 500-600m Höhe (Lichtenberger)

Dieser interessante Fund dürfte vielleicht ein Bindeglied zu einem eventuellen *carniolica*-Vorkommen im angrenzenden westl. nied.österr. Kalkalpengebiet darstellen. Bis dato war *Zygaena*

carniolica Sc. aus diesem Gebiet nicht bekannt. Diese Beobachtung läßt darauf schließen, daß das Tier im gesamten unteren Ennstal lokal verbreitet ist; zumal Lebensstätten dieser Art schon seit Jahren von der Hohen Dirn aus Höhenlagen von 800-900m, aus dem Laussabachtal b. Losenstein in Höhen von 500-600m und aus dem Paukengraben bei Ternberg in etwa 500m bekannt sind.

B B O M B Y C E S = S p i n n e r

Im Gegensatz zu den Schwärmern und anderen Faltergruppen waren einige Gattungen und Arten dieser großen Gruppe recht zahlreich vertreten. Ihnen schien die große Trockenheit des Frühjahres wie auch des Frühsommers günstig gewesen zu sein. Besonders die bekannteren Arten der Bärenspinner waren stellenweise sehr zahlreich und häufig.

Folgende Daten wurden vermerkt:

Hylophila

prasinana L. 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
in ca. 600-700m n.s. (Lichtenberger)

Chleophora

bicolorana Fuessl. 4.7.1967 Ternberg, in etwa 520m (Wimmer)

Nola (Roeselia)

cucullatella L. 19.7.1967 Steyr/Hausleiten (Lichtenberger)

crisatula Hb. 13.7.1967 Steyr/Hausleiten (Lichtenberger)

Setina (Endrosa)

irrorella Cl. 4.7.1967 Ternberg, in ca. 520m (Wimmer)
16.8.1967 Großer Priel, in etwa 1400m (Wimmer)

mesomella L. 29.6.1967 Reichraming i. Ennstal,
Weissenbachtal; in Höhenlagen
von 500-600m an allen Berghängen
sehr zahlreich und häufig. (Wesely)

Gnophria

rubricollis L. 24.6.1967 } Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal,
25.6.1967 } in der Talsohle und an den Berghängen
bei Tage nicht selten (Wimmer, Wesely)

Hipocrita (Euchelia)

jacobaeae L. 25.6.1967 } Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal,
29.6.1967 } in den frühen Nachmittagsstunden im
8.7.1967 } Sonnenschein fliegend, teils frisch,
teils abgeflogen, mehr einzeln jedoch
nicht selten. Höhenlage 500m (Wesely)

Diacrisia (Nemeophila)sannio (russula L.)

- 25.6.1967) Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal,
 29.6.1967) in beiden Geschlechtern an den kräu-
 3.7.1967) terreichen Nord- und Nordwesthängen
 bis zur Talsohle sehr variabel und
 zahlreich vertreten (Wimmer, Wesely).

Eine Nachzucht (2 Generation) ergab vom 30.7.-
 8.8.1967 25 männliche und 29 weibliche Falter.
 Die Tiere sind wesentlich kleiner als Stücke der
 1. Generation (Wesely).

Parasamia (Nemeophila)plantaginis L.

- 1.7.1967 Gr. Alpkogel i. Ennstal, auf dem
 Gipfelkamm in 1500m (Wesely)
 15.7.1967 Gr. Alpkogel, i. 1500m (Müllner)
 22.7.1967 Bodenvies i. Ennstal, in etwa
 1100m Höhenlage einige St. (Müllner)

Callimorphadominula L.

- 20.5.1967 Raupen aus dem Keixengraben
 (550-700m) im Reichraminger Hinter-
 gebirge; e.l. 15.u.21.6.67 (Müllner)
 29.6.1967 Schieferstein i. Ennstal,
 in etwa 1100m (Müllner)
 12.7.1967 Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal
 in etwa 500-600m nicht selten (Wimmer)

Pericallia (Pleredes)matronula L.

- 8.7.1967 Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal,
 in ca. 500m bei Tage aus Huflattich-
 büschel aufgescheucht (Wimmer, Wesely)

Rhiacia (Arctia)purpurata L.

- 5.7.1967 Ternberg, in etwa 500m (Wimmer)
 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 in 600-700m (Lichtenberger)

Spilosomalupricipeda Esp.

- 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 in 600-700m (Lichtenberger)

menthastri Esp.

- 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 in 600-700m (Lichtenberger)

mendica Cl.~~XXXXXXXXXXXX~~

- 27.5.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 in 600-700m (Lichtenberger)

Hepialuscarne Esp.

- 29.7.1967 Gr. Alpkogel i. Ennstal, in
 etwa 1450m Höhenlage (Wimmer)

Cossuscossus L.

- 4.4.1967 e.l. Steyr (Wesely)
 11.4.1967 e.l. St. Ulrich b. Steyr (Wesely)
 24.6.1967 Trattenbach i. Ennstal, 800m (Wimmer)

Zeuzerapyrina L.

- 23.6.1967 Garsten b. Steyr (Hainböck)
 4.7.1967 Trattenbach i. Ennstal, 800m (Wimmer)

<u>Cochlidion</u>			
<u>limacodes</u> Hfn.	4.7.1967	Ternberg, ca. 520m	(Wimmer)
<u>Psyche</u>			
<u>muscella</u> Hb.	13.5.1967	Steyr Gründberg	(Hainböck)
<u>Psyche (Epishnopteryx)</u>			
<u>pulla</u> L.	30.4.1967	Dambachtal b. Steyr/Sturzberg, in etwa 750m Höhenlage i. Anz.	(Müllner)
	6.5.1967	Trattenbach i. Ennstal, 800m	(Müllner)
	7.5.1967	Damberg b. Steyr, in ca. 780m	(Müllner)
	15.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal; in ca. 1500m in Anz.	(Müllner)
<u>Orgyia</u>			
<u>antiqua</u> L.	30.7.1967	Trattenbach/Kreuzmauer, 800m	(Hainböck)
<u>Dasychira</u>			
<u>pudipunda</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in 600-700m in Anzahl	(Lichtenberger)
	22.9.1967	Raupen! Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal: die Falter schlüpften noch im Oktober, ergaben jedoch nur kleine Exemplare	(Wimmer)
<u>Larva (Arctornis)</u>			
<u>L-nigrum</u> Mill.	30.6.1967	Garsten b. Steyr	(Hainböck)
	1.7.1967	Trattenbach i. Ennstal, 800m	(Wimmer)
<u>Gastropacha (Lasiocampa)</u>			
<u>quercus</u> L.	24.6.1967	e.l. Oberberg i. Mühlviertel	(Wimmer)
	23.3.1967	1 Raupe! Ranshofen i. Innviertel	(Kremslehner)
<u>Lemonia (Crateronyx)</u>			
<u>dumil</u> L.	18.10.67	Garsten b. Steyr; in der "Hölle"	(Wimmer)
<u>Lasiocampa</u>			
<u>potatoria</u> L.	10.7.1967	Garsten b. Steyr	(Hainböck)
<u>pini</u> L.	30.6.1967	Garsten b. Steyr	(Hainböck)
<u>Selenephera (Lasiocampa)</u>			
<u>lunigera f. lobulina</u> Esp.	10.8.1967	Ternberg, in etwa 520m	(Wimmer)
<u>f. burmanni</u>	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 650m	(Lichtenberger)
<u>Endromis</u>			
<u>versicolora</u> L.	15.4.1967	Ternberg/Paukengraben, i. 500m	(Müllner)
<u>Aglia</u>			
<u>tau</u> L.	14.5.1967	Trattenbach/Wendbachtal, 500m	(Müllner)
	20.5.1967	Keixengraben i. Reichraminger Hintergebirge. von der Talsohle bis in Höhen von 700m n.s.	(Müllner)
	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen von ca. 750m bis zur Talsohle nicht selten	(Lichtenberger)

<u>Agria tau L.</u>		
<u>f.melaina</u> Groß	6.5.1967	Damberg b. Steyr, ca. 750m (Lichtenberger)
	14.5.1967	Trattenbach/Wendbachtal, 550m (Müllner)
	14.5.1967	Trattenbach/Gaishörndl, 800m (Müllner)
	15.5.1967	Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal, in etwa 500-600m (Lichtenberger)
	20.5.1967	Keixengraben im Reichraminger Hintergebirge i. ca. 750m (Müllner)
	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in etwa 600m (Lichtenberger)
<u>Drepana (Platypteryx)</u>		
<u>falcataria</u> L.	13.5.1967	Garsten b. Steyr (Hainböck)
<u>cultraria</u> F.	13.5.1967	Garsten b. Steyr (Hainböck)
	22.5.1967	Damberg b. Steyr, stellenweise nicht selten; 780-800m (Tremel)
<u>Cerura (Harpyia)</u>		
<u>furcula</u> Cl.	26.6.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m (Wimmer)
<u>Dicranura (Harpyia)</u>		
<u>vinula</u> L.	1966	Raupen aus dem Wolfernerwald b. Steyr; die Falter schlüpfen am 11.5., 14.5., 16.5., 6.6., 17.5. u. 18.6.1967 (Tremel)
	16.5.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m (Wimmer)
	18.5.1967	Wendbachtal b. Trattenbach i. Ennstal; in ca. 600m Höhenlage 7 Stück Eier an Salweide aufgefunden; die Räumchen schlüpfen am 24. u. 25.5. (Wesely)
<u>Stauropus</u>		
<u>fagi</u> L.	1.7.1967	Trattenbach i. Ennstal, in Höhenlagen von etwa 800m einige Stücke (Wimmer)
	16.8.1967	1 Raupe aus Hinterstoder i. Stodertal; der Falter, ein Weibchen, schlüpfte bereits am 28.10.1967, also ein Tier der 2. Generation (Wimmer)
<u>Hoplitis (Hybocampa)</u>		
<u>milhauseri</u> F.	13.5.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m am Licht (Wimmer)
<u>Notodonta (Pheosia)</u>		
<u>tremula</u> Cl.	5.8.1967	Steyr/Hausleiten (Lichtenberger)
<u>dictaeoides</u> Esp.	5.8.1967	Steyr/Hausleiten (Lichtenberger)
<u>ziczac</u> L.	10.5.1967)	Garsten b. Steyr (Hainböck)
	11.7.1967)	
<u>phöbe</u> Sieb. (tritophus Schiff)		
	9.5.1967	Garsten b. Steyr, a.L. (Hainböck)
	1.7.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m a.L. (Wimmer)

Drymonia (Notodonta)

<u>chaonia</u> Hb.	9.5.1967	Garsten b. Steyr, a. Licht	(Hainböck)
<u>querna</u> F.	4.7.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m a. Licht	(Wimmer)

Ptilophora

<u>plumigera</u> Esp.	26.12. 66	Steyr/Unterhimmel	(Hainböck)
-----------------------	-----------	-------------------	------------

Habrosyne (Gonophora)

<u>derasa</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in etwa 600-700m a.L.	(Lichtenberger)
------------------	----------	--	-----------------

Thyatira

<u>batis</u> L.	23.6.1967	Garsten b. Steyr, a.L.	(Hainböck)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 600-700m a.L.	(Lichtenberger)

Cymatophora (Palimpsestis)

<u>or T.</u>	30.4.1967	Steyr/Stein, a.L.	(Wimmer)
<u>duplaxis</u> L.	8.5.1967	Steyr/Stein, a.L.	(Wimmer)
<u>fluctuosa</u> Hb.	1.7.1967	Trattenbach i. Ennstal, in etwa 800m a. Licht; ein sehr bedeutsamer, seltener Fund	(Wimmer)

Asphalia (Polyploca)

<u>flavicornis</u> L.	15.4.1967	Ternberg/Paukengraben, in etwa 500m Höhenlage a.L.	(Müllner)
-----------------------	-----------	---	-----------

Die angeführten Höhenangaben sind geschätzt und beziehen sich auf den etwaigen Beobachtungsort, den aufgesuchten Fangplatz oder auf die jeweilige Lichtanschluß- oder sonstige Leuchtstelle.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [0009](#)

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: [Sphinges= Schwärmer, Bombyces= Spinner 15-22](#)