

Beitrag

zur Flora des Kreises Schwetz in Westpr.

von

Dr. R. Hohnfeldt.

Schon in den Jahren 1882 und 1883 hatte Herr F. Hellwig für den westpreussischen botanisch-zoologischen Verein botanische Untersuchungen im Kreise Schwetz angestellt und die Resultate derselben in den Jahresberichten der Gesellschaft von 1883 und 1884 veröffentlicht. Im gleichen Auftrage bereiste ich den Schwetzer Kreis im Sommer 1885 während einiger Zeit im Mai, sowie von Ende Juni bis Mitte August. Untersucht wurde besonders die Gegend, welche von den Orten Osche, Lindenbusch und Poledno eingeschlossen wird.

In dem Folgenden theile ich die gewonnenen Resultate nur in so weit mit, als sie Neues zu den von Hellwig gegebenen Berichten geben. Die in denselben noch nicht angeführten Pflanzen sind mit einem † versehen. Ueber einige zweifelhafte Formen und Bastarde behalte ich mir noch eine spätere Mittheilung vor.*)

Dicotyleae.

Thalictrum minus L. Abhänge zum Schwarzwasser bei Rowinitza.

† — — *v. silvaticum* Koch. Ostrand des Schewinkoer Waldes nahe der Chaussee.

— *angustifolium* Jacq. Am Schwarzwasser bei Rowinitza, Wiese zwischen Rowinitza und Wirry.

† *Pulsatilla pratensis* Mill. Sandige Heiden: Eschendorf im Park, Kawentschiner Wald, Wald zwischen Hintersee und Blondzmin, Forst Lindenbusch, Wald bei Annalust, Johannsberger Holz, Forst Charlottenthal Bel. Ottersteig.

*) Die von mir angeführten Pflanzen sind sämmtlich mehr oder weniger reichlich eingesammelt worden und stelle ich den geehrten Mitgliedern des Vereins die Duplicate, so weit der Vorrath reicht, zur Verfügung, und bitte ich mir die Namen der gewünschten Sachen mitzutheilen.

Dr. R. Hohnfeldt-Langfuhr.

- Pulsatilla patens* Mill. Forst Lindenbusch, Schewinkoer Wald, Johannisberger Holz und Waldstellen um Lnianno, Forst Osche.
- † *Anemone ranunculoides* L. Forst Charlottenthal, Bel. Ottersteig.
- † *Myosurus minimus* L. Am Mukrz See.
- Batrachium divaricatum* Wimm. Im Mukrz-Fliess, Rischke-Fliess, Bruch südlich Driczmin.
- Ranunculus Lingua* L. Ufer von Seen, Brüchen und Gräben: bei Buddin, im Kawentschiner Wald, bei Branitz, Blondzmin, Ebensee, am Cisbusch, Mukrz-Fliess, bei Marienthal, Lnianno,
- *lanuginosus* L. Cisbusch, Wirwa Parowe, Driczmin Parowe, Rowinitza Parowe, Bel. Ottersteig.
- † — *sceleratus* L. Am Buddiner See, Mukrz See, See nördlich Lnianno.
- Actaea spicata* L. Cisbusch, am Schwarzwasser unterhalb Groddeck.
- Berberis vulgaris* L. Terespol, in der Wirwa Parowe, Driczmin Parowe und am Schwarzwasser zwischen beiden.
- † *Nymphaea alba v. melocarpa* Casp. Brüche zwischen Drosdowo und Poledno, zwischen Dombrowko und Buddin, im Forst Lindenbusch.
- — *v. oocarpa* Casp. Buddiner-See, Eben-See, Gräben der Mukrz Wiesen.
- Papaver Rhoeas* L. Zerstreut bei Pniewno, Gatzki, Groddeck, Driczmin, Wirry.
- † — *dubium* L. Vereinzelt bei Eschendorf, Brunstplatz, Eichdorf.
- Fumaria officinalis* L. Aecker bei Eschendorf, am Czarnowo See, bei Lnianno, Driczmin.
- † *Nasturtium amphibium* R. Br. Parowe westlich Julienhof, am Schwarzwasser bei Groddeck, am Bahndamm westlich Lnianno.
- † — *anceps* D. C. Zwischen Dulzig und Lubichow.
- † *Barbarea stricta* Andrz. Am Schwarzwasser oberhalb Groddeck und Rowinitza.
- † *Turritis glabra* L. Im Eschendorfer Park, am Schwarzwasser unterhalb Groddeck.
- † *Cardamine pratensis* L. Am Schwarzwasser, Wiesen im Forst Charlottenthal, bei Schirowslaw, Driczmin, am Mukrz See.
- † — *amara* L. Am Schwarzwasser bei Bresinermangel.
- Sisymbrium officinale* Scop. Die eigentliche behaarte Form nur bei Eschendorf, Andreasthal, Sternbach, Marienfelde (zahlreich), Driczmin, Schirowslawek; dagegen
- † — — *v. leiocarpum* D. C. gemein.
- † *Brassica Rapa* L. *v. campestris* L. In einem Lupinenfelde westlich Driczmin.
- † *Sinapis arvensis* L. Nur in einem Exemplar bei Sternbach beobachtet.
- † — *alba* L. Hin und wieder im Grossen gebaut, häufig verwildert: Buddin, Sternbach, Marienfelde, Driczmin, Rowinitza, Wirry, Schirowslaw.
- † *Cochlearia Armoracia* L. Gebaut und verwildert: Driczmin.
- † *Camelina sativa* Crntz. Ebenso: Eschendorf.

- † *Camelina sativa* v. *microcarpa* Andrzej. Am Bahndamm westlich Lnianno.
- † — *dentata* Pers. In einem Leinfeld am Mukrz-See.
- † *Lepidium ruderales* L. Dörfer: Pniewno, Lnianno, Driczmin.
- Capsella Bursa pastoris* Munch. Und zwar
- — v. *pinnatifida* Schl. Gemein.
- † — — v. *sinuata* Schl. Seltener.
- † *Viola canina* L. v. *flavicornis* Sm. Zwischen Hintersee und Blondzmin.
- *mirabilis* L. Schattige Abhänge des Schwarzwassers oberhalb Rowinitza.
- † — *tricolor* L. v. *vulgaris* Koch. Weniger häufig als v. *arvensis*.
- Drosera anglica* Huds. Brüche bei Lnianno, am Eben-See, am Czarnowo-See.
- *rotundifolia* + *anglica* Schiede. Brüche bei Lnianno.
- † — *intermedia* Hayne. Bruch südlich Lnianno.
- Polygala vulgaris* L. In den verschiedenen Farben häufig.
- † — — v. *oxyptera* Rhb. Parowe westlich Julienhof, Chausseeegraben zwisch. Bronke und Franzdorf.
- *comosa* Schk. Wiese am Cisbusch.
- Gypsophila fastigiata* L. Zerstreut im Forst Lindenbusch, Heiden bei Lnianno und Schiroslaw.
- † *Dianthus Armeria* L. Schwarzwasserabhänge oberhalb Groddeck.
- *Carthusianorum* L. In den Wäldern vereinzelt, auf Rainen und an Abhängen gesellig.
- † — — v. *Scharlockii* Casp. Schwarzwasserabhänge oberhalb Groddeck.
- *deltoides* L. Bei Poledno, zwischen Eschendorf und Dombrowko, zwischen Lnianno und Sternbach.
- *arenarius* L. Besonders häufig im Sternbacher Forst.
- Saponaria officinalis* L. Im Sternbacher Forst am Rischke-Fliess mit gefüllten Blüten, ferner zwischen Wirwa-Mühle und Julienfelde, am Blondzmin-See.
- Cucubalus baccifer* L. Am Schwarzwasser bei Groddeck.
- Silene Otites* Sm. Wirwa Parowe, Bahndamm zwischen Terespol und Drosdowo.
- † — *nutans* L. Zerstreut in der Forst Lindenbusch und in den Heiden bei Blondzmin, Hintersee, Lnianno, Schwarzwasserabhänge bei Rowinitza.
- *chlorantha* Ehrh. Heiden zwischen Buddin und Pniewno (zahlreich), zwischen Julienfelde und Wirwa Mühle, zwischen Terespol und Drosdowo.
- † — *noctiflora* L. In 2 Exemplaren an einem Wege in Driczmin.
- Viscaria vulgaris* Röhl. Wirwa Parowe, Johannisberger Holz.
- † *Coronaria flos cuculi* A. Br. Auf Wiesen gemein.
- Melandryum rubrum* Greke. Driczmin Parowe und am Schwarzwasser abwärts.
- † *Agrostemma Githago* L. Ueberall auf Aeckern, doch vereinzelt.
- Sagina nodosa* Fenzl. Nur beobachtet:

- † *Sagina nodosa* v. *pubescens* Koch.
Spergula arvensis L. Wenigstens im Nordwesten nur:
- † — — v. *vulgaris* Bönng. f. *laricina* Wulf.
† — *Morisonii* Boreau. Forst Lindenbusch westlich Blondzmin, am Kirchhof am Cisbusch.
- Spergularia rubra* Presl. Marienthal, Driczmin, Gatzki, Eschendorf, Buddin.
- † *Alsine viscosa* Schreb. Auf Brachäckern bei Mukrz, Hedwigsthal, Lnianno, Falkenhorst, Driczmin, Gatzki, Dombrowko; zahlreich oder vereinzelt.
- Arenaria serpyllifolia* L. Nur beobachtet:
- † — — v. *viscida* Loisl.
- † *Stellaria nemorum* L. Wirwa Parowe, Cisbusch.
- † *Cerastium semidecandrum* L. Aecker bei Eschendorf, Driczmin.
- † — *arvense* L. An Wegen und Wiesenrändern häufig.
- † *Linum usitatissimum* L. Gebaut und hin und wieder verwildert.
- Radiola linoides* Gmel. Auf feuchten Aeckern und an Brüchen bei Branitz, Blondzmin, Mukrz, Marienthal, Andreasthal, Lnianno, Sternbach, Schirowslaw, Schirowslawek, Wirry, Driczmin, Gatzki, Dombrowko.
- Malva Alcea* L. Wiesenrand zwischen Rowinitza und Wirry.
- † — *silvestris* L. An Wegen in Ebensee, Schirowslawek, Driczmin, Dombrowko.
- † — *rotundifolia* L. Ebensee, Lnianno, Marienfelde, Schirowslawek, Driczmin.
- † *Aesculus Hippocastanum* L. Mitunter an Wegen angepflanzt.
- † *Geranium silvaticum* L. Wirwa Parowe.
- † — *columbinum* L. Am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- Erodium cicutarium* l'Hérit. Die eigentliche Form wie es scheint selten: Lipnitz, Driczmin.
- † — — v. *pimpinellifolium* Willd. Ueberall.
- Oxalis stricta* L. Lnianno.
- Sarothamnus scoparius* Koch. Vereinzelt bei Eschendorf und Driczmin; gesellig im Kawentschiner Wald, Lipnitzer Wald und im Walde bei Eichdorf.
- † *Lupinus luteus* L. Gebaut, doch ganz vorwiegend:
- † — *angustifolius* L. Kommt auch weissblühend vor.
- Ononis repens* L. Häufig bei Driczmin und bis Groddeck, Gatzki, Dombrowko, Wilhelmshof, Lnianno, Schirowslaw, Wirry, Rowinitza.
- Anthyllis Vulneraria* L. Vielfach im Grossen gebaut.
- Medicago sativa* L. Ebenso.
- † — *falcata* + *sativa* Der *M. falcata* näherstehend wild bei Driczmin; der *M. sativa* näherstehend gebaut und dann verwildert.
- *lupulina* L. Die eigentliche Form nur am Rande der Wiesen südlich Sternbach und am Bahndamm westlich Lnianno beobachtet.
- † — — v. *Willdenowii* Bönng. Wege, Aecker, Wiesen, sehr häufig.
- † *Melilotus altissimus* Thuill. Zäune: Driczmin, Groddeck.
- *officinalis* Desr. Bahndamm bei Terespol, Aecker bei Driczmin und Rowinitza.

- Melilotus albus* Desr. An der Chaussee im Pniewnoer Wald; Wiesenränder südlich Sternbach, am Eben-See, zwischen Hedwigsthal und Eichdorf, bei Driczmin; am Schwarzwasser unterhalb Groddeck.
- Trifolium alpestre* L. Parowen westlich Julienhof und bei Driczmin, Kawentschiner Wald, Johannisberger Holz.
- † — *incarnatum* L. Bisweilen gebaut und verwildert: Eschendorf, Driczmin.
- *fragiferum* L. Am Eben-See, am Blondzmin-See, Driczmin Parowe, Rowinitza Parowe und am Schwarzwasser zwischen beiden.
- † *Lotus uliginosus* Schk. Am Salescher See, Eben-See, Lniannoer See, Mukrz-Fliess, Rischke-Fliess, Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- † *Robinia Pseud-Acacia* L. Nicht selten angepflanzt und bisweilen verwildert.
- Astragalus Cicer* L. Gebüsch zwischen Rowinitza und Wirry.
- † — *arenarius* L. Auf Sandboden häufig: bei Julienfelde, Wirwa-Mühle, Eschendorf, Pniewno, Buddin, Rehberg, Forst Lindenbusch, Johannisberger Holz, Wald bei Eichdorf, Forst Charlottenthal.
- † — — *v. glabrescens* Rehb. Oft mit der Hauptform und noch häufiger: bei Julienfelde, Wirwa-Mühle, Terespol, Rehberg; Forst Lindenbusch, Schewinkoer Wald, Kawentschiner Wald, Sternbacher Forst, Johannisberger Holz, Heiden um Lnianno.
- † *Ornithopus sativus* Brot. Gebaut und verwildert.
- † *Ervum hirsutum* L. Am Bahndamm westlich Lnianno.
- *tetraspernum* L. Zwischen Buddin und Pniewno: Kawentschiner Wald am Rande.
- † *Pisum sativum* L. Gebaut; auf gutem Boden.
- † — *arvense* L. Vielfach gebaut; auf leichterem Boden.
- Lathyrus silvester* L. Zerstreut im Kawentschiner Wald, Wald bei Lubsee, Forst Lindenbusch, Wald bei Eichdorf, Johannisberger Holz.
- *vernus* Bernh. Wirwa Parowe, Cisbusch, Forst Charlottenthal Bel. Ottersteig, Forst Osche Bel. Osche.
- *niger* Bernh. Wirwa Parowe.
- *montanus* Bernh. In allen Wäldern und an den Abhängen häufig.
- † *Prunus domestica* L. Mitunter an Wegen angepflanzt.
- † — *Cerasus* L. Ebenso.
- † *Ulmaria pentapetala* Gilib. *v. glauca* Schultz. Parowe südöstlich Eschendorf.
- *Filipendula* A. Br. An der Chaussee bei Terespol, in den Parowen bei Driczmin und Rowinitza, an den Abhängen des Schwarzwassers häufig.
- Geum rivale* L. In der Nähe des Schwarzwassers bei Bresinermangel, Ottersteig und Rowinitza, im Cisbusch, Wiesen am Mukrz-Fliess, Parowe westlich Julienhof.
- † *Rubus suberectus* Andersson. Kawentschiner Wald.
- † *Fragaria moschata* Duchesne. Zwischen Eschendorf und Buddin, im Walde bei Lubsee.

- Potentilla supina* L. Am See nördlich Lnianno.
- † — *norvegica* L. Brüche zwischen Buddin und Pniewno und bei Lnianno, Graben westlich vom Marienfelder See, Teich zwischen Driczmin und Schiroslaw.
- † — *collina* Wibel. Wege und sandige Stellen bei Annalust, Lnianno, Sternbach, am Marienfelder See, zwischen Driczmin und Gatzki, am Schwarzwasser.
- *procumbens* Sibth. Am Mukrz-Fliess, am Graben westlich vom Marienfelder See, zwischen Driczmin und Schiroslaw.
- *opaca* L. Forst Lindenbusch, Bel. Brunstplatz.
- *alba* L. Zerstreut im Forst Lindenbusch, Forst Charlottenthal, Forst Osche, in den Heiden um Lnianno, Lubochiner Wald.
- † *Sanguisorba officinalis* L. Wiesen bei der Kawentschiner Mühle, am Eben-See, bei Marienthal.
- Pirus Malus* L. Am Eben-See, am Schwarzwasser bei Rowinitza, hier in grossen Bäumen.
- Circaea alpina* L. In der Wirwa Parowe, im Bagno, im Cisbusch, am Blondzmin-See, am Hammer-Fliess.
- † *Peplis Portula* L. An Sumpf- und Teichrändern, auf nassen Ackerstellen gesellig: Forst Lindenbusch, Andreasthal, Lnianno, Schiroslaw, Schiroslawek, Wirry, Driczmin, Gatzki, Dombrowko, Wilhelmshof.
- Herniaria glabra* L. Nur beobachtet:
- † — — *v. puberula* Peterm.
- Sedum boloniense* Loisl. Parowe bei Julienhof, Kawentschiner Wald, Lipnitzer Wald, Abhänge am Schwarzwasser.
- † — *reflexum* L. *v. rupestre* L. Kawentschiner Wald, Wirwa Parowe unweit der Wirwa-Mühle.
- Sempervivum soboliferum* Sims. Im Walde bei Eichdorf und auf und an Kirchhöfen: Buddin, Hedwigsthal, Lindenbusch.
- Ribes rubrum* L. Rain nördl. Pniewno, Rowinitza Parowe.
- † *Saxifraga Hirculus* L. Sumpfwiesen am Eben-See und am Cisbusch, Bialle-Wiese; gesellig.
- † — *tridactylites* L. Wirwa Parowe.
- † — *granulata* L. Wirwa Parowe, Driczmin Parowe.
- † *Chrysosplenium alternifolium* L. Quellige Stellen am Schwarzwasser und im Belauf Ottersteig.
- Hydrocotyle vulgaris* L. Sumpfränder bei Lnianno und Andreasthal, im Johannisberger Holz, zwischen Wilhelmshof und Dombrowko.
- Sanicula europaea* L. Am Schwarzwasser bei Rowinitza.
- Eryngium planum* L. Zwischen Eschendorf und Dombrowko, Bromke und Franzdorf, Sternbach und Rischke-Mühle, Driczmin und Wentfin.
- Fulcaria vulgaris* Bernh. Zwischen Eschendorf und Pniewno, bei Rowinitza.
- † *Pimpinella Saxifraga* L. *v. hircina* Leers. Zwischen Heinrichsdorf und Terespol.

- Seseli annuum* L. Driczmin Parowe und abwärts an den Schwarzwasser-abhängen.
- Peucedanum palustre* Mneh. Wiesen am Cisbusch, westlich Lnianno, westlich Marienfelde, im Johannisberger Holz.
- Anethum graveolens* L. Driczmin.
- † *Heracleum Sphondylium* L. v. *sibiricum* L. form. *elegans* Jacq. Kawentschin.
- † *Torilis Anthriscus* Gmel. Wege und Gebüsch: zwischen Buddin und Kawentschin, Eben-See, Driczmin Parowe, am Schwarzwasser.
- † *Anthriscus silvestris* Hoffm. Wirwa Parowe, am Schwarzwasser.
- † *Chacrophyllum temulum* L. Driczmin Parowe und am Schwarzwasser aufwärts.
- † — *aromaticum* L. In der Rowinitza Parowe und am Schwarzwasser aufwärts, recht zahlreich.
- Asperula odorata* L. Wirwa Parowe, Cisbusch.
- Galium verum* L. Kommt auch mit gelblichweissen Blüten vor.
- † — *Mollugo* L., v. *ochroleucum* Wolf. Am See nördlich Lnianno.
- † — *aristatum* L. Im Cisbusch sehr zahlreich.
- † *Valeriana officinalis* L., v. *sambucifolia* Mik. Wirwa Parowe.
- Scabiosa Columbaria* L., v. *ochroleuca* L. Bei Poledno, zwischen Dombrowko und Wilhelmshof.
- † *Petasites officinalis* Mneh. An mehreren Stellen in der Driczmin Parowe.
- † *Erigeron acer* L., v. *drobachiensis* O. F. Müller. Pniewnoer Wald, Johannisberger Holz, vereinzelt.
- † *Inula salicina* L. In einem Trupp am Czarnowo-See.
- † *Pulicaria vulgaris* Gärt. Dorfstrassen in Driczmin.
- Xanthium Strumarium* L. Bahndamm bei Drosdowo, in Driczmin.
- † *Bidens cernuus* L., v. *radiatus* DC. Torfgräben im Forst Lindenbusch, am Eben-See, am Mukrz-See, am Bach oberhalb Driczmin.
- † — — v. *minimus* L. Bruch im Bel. Brunstplatz der Forst Lindenbusch.
- † *Rudbeckia hirta* L. Zwischen Julienhof und Heinrichsdorf, sowie zwischen Eschendorf und Dombrowko; entfernt von allen Gehöften, auch habe ich nicht beobachtet, dass die Pflanze im Gebiete in Gärten gezogen wurde.
- Gnaphalium luteo-album* L. In der Nähe von Brüchen bei Lnianno und Schiroslaw.
- † *Achillea Millefolium* L., v. *lanata* Koch. Zwischen Buddin und Pniewno.
- Senecio paluster* DC. Am Salescher See, Eben-See, Sumpf am Cisbusch, Czarnowo-See.
- † *Cirsium acaule* All. Am Eben-See.
- — v. *caulescens* Pers. Schonung der Forst Lindenbusch, westlich von Blondzmin.
- *oleraceum* + *palustre* Schiede. Rowinitza Parowe, zwischen den Eltern.
- Carlina acaulis* L. Zerstreut im Forst Lindenbusch, häufig im Sternbacher Forst und namentlich im Lipnitzer Wald, Johannisberger Holz und den Heiden um Lnianno. 7

- † *Carlina acaulis* v. *caulescens* Lmk. Johannisberger Holz, vereinzelt.
Serratula tinctoria L. Forst Lindenbusch, östlich vom Czarnowo-See.
- † *Centaurea maculosa* Lmk. Zwischen Heinrichsdorf und Terespol, zwischen Eschendorf und Buddin, am Ostrand des Kawentschiner Waldes, um Driezmin herum.
- Cichorium Intybus* L. Zwischen Eschendorf und Pniewno mit weissen, bei Terespol mit rosa Blumen.
- Picris hieracoides* L. Parowen von Driezmin und Rowinitza und am Schwarzwasser aufwärts.
- Tragopogon pratensis* L., v. *orientalis* L. Zw. Eschendorf und Pniewno, Ebensee, südlich Driezmin.
- † *Scorzonera humilis* L. Forst Lindenbusch, Johannisberger Holz, Heiden um Lnianno, Forst Charlottenthal und am Schwarzwasser abwärts; zerstreut.
- Hypochaeris glabra* L. Lnianno, Sternbach, Franzdorf.
- † *Achyrophorus maculatus* Scop. Kawentschiner Wald, Forst Lindenbusch, Wald hei Eichdorf, Johannisberger Holz; zerstreut.
- Chondrilla juncea* L. Heideboden bei Buddin, am Cisbusch, bei Eichdorf, Lnianno. Rischke Mühle, Grodeck.
- † *Crepis virens* Vill. Am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- † — *paludosa* Mch. Wirwa Parowe.
- † — *succisifolia* Tausch, v. *erratica* W. K. Bialle Wiese.
- Hieracium pilosella* L. Mit 2köpfigem Schafte in der Forst Lindenbusch westl. Blondzmin, am Bahndamme bei Bahnhof Lnianno, am Wege zwischen Marienfelde und Falkenhorst.
- *Auricula* L. Auf Wiesen westl. Marienfelde, am See nördl. Lnianno.
- *praealtum* Koch. Bialle Wiese.
- † — *umbellatum* v. *linariifolium* G. Mey. Forst Lindenbusch.
- † — — v. *coronopifolium* Bernh. Dasselbst.
- † *Phyteuma spicatum* L. Schattige Waldparthien am Schwarzwasser, in der Rowinitza Parowe, Wirwa Parowe, im Cisbusch.
- † *Campanula glomerata* L., v. *aggregata* Willd. Wald bei Annalust.
- Vaccinium uliginosum* L. Im Bagno, auf Brüchen der Forst Lindenbusch, des Schewinkoer Waldes, der Sternbacher Forst, in den Heiden bei Lnianno und Eichdorf.
- Andromeda polifolia* L. Im Bagno, auf Brüchen der Forst Lindenbusch und bei Lnianno, am Marienfelder See.
- Calluna vulgaris* Salisb. Weissblühend bei der Waldwärterei Stawno.
- Monotropa Hypopitys* L., v. *hirsuta* Rth. Kawentschiner Wald, Wald bei Lubsee, Forst Lindenbusch, Johannisberger Holz.
- † *Asclepias syriaca* L. Dombrowko, verwildert.
- † *Gentiana cruciata* L. Auf einem kleinen Hügel in der grossen Sumpfwiese am Eben-See, ziemlich zahlreich.

- Cuscuta europaea* L. In der Driczmin Parowe und am Schwarzwasser auf Humulus und Urtica dioica.
- *Epithymum* L. Auf Kleefeldern bei Julienhof, Eschendorf; auf Wiesen bei Bukowitz, Dombrowko und Wirry; Driczmin Parowe.
- — *v. Trifolii* Babingt. Am Wege zwischen Siemkau und Hintersee, zwischen Driczmin und Dombrowko.
- † — *Epilinum* Weihe. Leinfeld zwischen Eschendorf und Buddin.
- † *Asperugo procumbens* L. Eschendorf.
- † *Cynoglossum officinale* L. Wirwa Parowe, Rischke Fliess.
- † *Pulmonaria angustifolia* L. Johannisberger Holz, Bel. Ottersteig der Forst Charlottenthal, Bel. Osche der Forst Osche.
- † — *officinalis* L., *v. obscura* Du. Mortier. Nur diese Form beobachtet: Schattige Waldstellen der Forst Osche, am Schwarzwasser, der Parowen von Rowinitza, Driczmin und Wirwa Mühle, im Cisbusch.
- † *Lithospermum arvense* L. Aecker bei Wirry, Driczmin, Eschendorf, Buddin, Mukrz.
- † *Myosotis caespitosa* Schultz. Wiesen bei Schiroslaw, Wirry, Rowinitza, Driczmin, Gatzki, Lnianno.
- † — *arenaria* Schrad. Aecker von Eschendorf, Buddin, Andreasthal, Lnianno, Schiroslaw, Driczmin.
- † — *versicolor* Sm. Eschendorf auf Gartenland.
- † — *intermedia* Lk., *v. silvestris* Schl. Ebenso.
- † *Lycium barbarum* L. In Dörfern an Zäunen angepflanzt.
- Solanum Dulcamara* L. Am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza, am Bach oberhalb Driczmin, Wirwa Fliess, Bach nördlich Bukowitz, Mukrz Fliess, im Cisbusch.
- † *Verbascum thapsiforme* Schrad., *v. cuspidatum* Schrad. Eschendorf.
- † *Mimulus luteus* L. Wiese zwischen Driczmin und Falkenhorst.
- Limosella aquatica* L. Seeufer nördlich Lnianno, am Teiche zw. Gatzki und Dombrowko, an Teichen zw. Driczmin und Schiroslaw und in Schiroslaw.
- † *Veronica scutellata* L., *v. parmularia* Poitou und Turpin. Bruch südlich Lnianno, Wiesen am Bahndamm bei Marienthal.
- † — *Teucrium* L. Driczmin Parowe und Abhänge am Schwarzwasser.
- † — *serpyllifolia* L., *v. tenella* All. Waldbruch westlich Blondzmin.
- † — *verna* L. Ueberall auf sandigen Aeckern.
- † — *Tournefortii* Gmel. Am See nördlich Lnianno, Gartenland in Driczmin.
- † — *opaca* Fr. Acker bei Eschendorf.
- † — *hederifolia* L. Driczmin Parowe.
- Melampyrum nemorosum* L. Cisbusch, Wald bei Annalust, Wirwa Parowe, Rowinitza Parowe und am Schwarzwasser aufwärts.
- † *Pedicularis Sceptrum Carolinum* L. Auf der grossen Sumpfwiese zwischen dem Eben-See und dem Cisbusch an mehreren Stellen ziemlich reichlich.

- † *Alecterolophus minor* W. und Grab. Wiesen zw. Buddin und Pniewno, zw. Eschendorf und Dombrowko, am Cisbusch, am Mukrz-See, am Mukrz-Fliess, zwischen Schiroslaw und Lnianno.
- † — *major* Rehb., *v. angustifolius* Fr. Wiesen am Cisbusch, zwischen Hintersee und Blondzmin.
- † *Lathraea Squamaria* L. Bel. Ottersteig der Forst Charlottenthal.
- † *Elsholtia Patrini* Grcke. An Zäunen in Driczmin.
- † *Mentha gentilis* L., *v. sativa* L. Am Mukrz-Fliess.
- Salvia pratensis* L. Bei Terespol, zw. Wirwa Mühle und Julienfelde, Schwarzwasserabhänge oberhalb Groddeck.
- Origanum vulgare* L. Am Eben-See, am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- † *Thymus Serpyllum* L., *v. angustifolius* Pers. In allen Nadelwäldern und Heiden sehr häufig.
- Nepeta Cataria* L. Driczmin.
- † *Glechoma hederacea* L. Feuchte Gebüsche, an Zäunen häufig.
- † *Dracocephalum thymiflorum* L. Bahndamm am Mukrz-Fliess.
- † *Galeobdolon luteum* Huds. Feuchte Waldstellen: am Schwarzwasser, Wirwa Parowe, Cisbusch, Forst Charlottenthal, Forst Osche.
- Galeopsis Ladanum* L. Nur die Form:
- † — — *v. latifolia* Hoffm.
- † — *bifida* Boenng. Zwischen Eschendorf und Dombrowko.
- Stachys annua* L. Blondzmin.
- Betonica officinalis* L. Zwischen Lnianno und Schiroslaw, am Schwarzwasser.
- † — — *v. hirta* Leyss. Wirwa Parowe, am Eben-See.
- Marrubium vulgare* L. Heinrichsdorf, Blondzmin und Driczmin.
- † *Scutellaria galericulata* L., *v. pubescens* Benth. Wiese nördlich Pniewno.
- † *Ajuga reptans* L. Bel. Ottersteig; am Schwarzwasser bei Bresinermangel zahlreich, daselbst auch mit weissen Blumen; Forst Sternbach.
- † — *genevensis* L. Viel häufiger: Wirwa Parowe, bei Pniewno, Buddin, Kawentschiner Wald, Forst Lindenbusch, Johannisberger Holz, Driczmin Parowe, Lubochiner Wald.
- Verbena officinalis* L. Am Blondzmin-See, in Driczmin, Rowinitza Parowe.
- Utricularia minor* L. Bruch südlich Lnianno.
- † *Lysimachia thyrsiflora* L. Brüche und sumpfige Seeränder: Buddiner-See, Kawentschiner Wald, Wald bei Lubsee, westlich Blondzmin, Forst Lindenbusch, Eben-See, Rischke Fliess, Johannisberger Holz, bei Gatzki und Schiroslaw.
- † — *vulgaris* L., *v. guestphalica* Weihe. Zw. Buddin und Eschendorf.
- † — *Nummularia* L. Feuchte Wiesen, Gräben: Eschendorf, Dombrowko, Wilhelmshof, Driczmin, am Schwarzwasser.
- † *Centunculus minimus* L. Feuchte sandige Aecker: Mukrz, Hedwigsthal, Lnianno, Sternbach, Schiroslaw, Schiroslawek, Wirry, Driczmin, Falkenhorst, Dombrowko. Gatzki.

- † *Primula officinalis* Jacq. Wälder, Abhänge: Forst Osche, am Schwarzwasser, Driczmin Parowe, am Eben-See.
- Plantago lanceolata* L. An der Chaussee zw. Schönau und Schwetz fand sich ein kräftiger Busch mit dicht zusammengesetzten Aehren.
- *arenaria* W. K. Bei Julienfelde, Eschendorf, im Kawentschiner Walde, Johannisberger Holz und Heiden um Lnianno, bei Driczmin.
- † *Amarantus retroflexus* L. Dörfer: Buddin, Sternbach, Marienfelde, ehemalige Brzenczek Mühle, Driczmin.
- † — *caudatus* L. In einem Wickenfelde bei Driczmin verwildert.
- Salsola Kali* L. Terespol, Lnianno.
- † *Chenopodium hybridum* L. Dörfer: Eschendorf, Pniewno, Rischke Mühle, Lnianno, Schiroslaw.
- † — *album* L., v. *spicatum* Koch. Forst Lindenbusch.
- *polyspermum* L. Marienfelde.
- † *Atriplex hortense* L. Driczmin, verwildert.
- † — *nitens* Schkr. Am Wege zw. Rehberg und Ebensee.
- † — *hastatum* L., v. *oppositifolium* DC. Auf Gartenland in Driczmin.
- Rumex paluster* Sm. Am Buddiner See, Sumpf südl. Lnianno.
- † — *maximus* Schreb. Rischke Fliess.
- *sanguineus* L. Schattige Stellen am Schwarzwasser.
- † — *pratensis* M. u. K. Am Eben-See, Rischke Fliess.
- † — *aquaticus* L. Am Rischke Fliess, Bach oberh. Driczmin, Schwarzwasser.
- † — *Acetosa* L., v. *fiissa* Koch. Feuchte Stellen bei Eschendorf, im Kawentschiner Wald.
- † *Polygonum Bistorta* L. Wiesen: Eben-See, Marienthal am Bahndamm, Lniannoer See, Bialle Wiese, Wirry.
- † — *dumetorum* L. Am Schwarzwasser, Eben-See, Graben zwischen Bukowitz und Branitz.
- † *Fagopyrum esculentum* Mnch. Auf leichtem Boden gebaut.
- † *Thesium ebracteatum* Hayne. Am Grenzrain zwischen Eschendorf und Buddin, Südrand des Belaufes Brunstplatz der Forst Lindenbusch, Heide zw. Marienfelde und Falkenhorst, Schonung südlich Swatno in der Forst Osche.
- Tithymalus Cyparissias* Scop. Südrand der Sternbacher Forst, Lubochiner Wald am Bahndamm.
- Mercurialis perennis* L. Schattige Waldparthien bei Ostersteig, am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza, in der Wirwa Parowe, im Cisbusch.
- † *Ulmus campestris* L., v. *suberosa* Ehrh. Alte Mergelgrube zw. Eschendorf und Buddin, am Eben-See.
- † *Betula humilis* Schrnk. Auf der grossen Wiesenfläche zwischen dem Eben-See und Mukrz-See und um den Cisbusch herum mehr oder weniger massenhaft; Bialle Wiese.
- Salix amygdalina* L. Am Schwarzwasser bei Groddeck.

- ‡ *Salix daphnoides* Vill. Auf Sandboden angepflanzt: Eschendorf, Bahndamm westlich Lnianno.
- † — *purpurea* L., v. *Helix* L. Am Blondzmin See.
- † — *viminalis* L. Am Schwarzwasser bei Rowinitza; Gräben bei Wirry, Schirowslawek, Driczmin, Dombrowko, Wilhelmshof, Marienthal, im Kawentschiner Wald, bei Buddin, Pniewno.
- † — *livida* Wahlenbg. Sumpfwiese zwischen dem Eben-See und Cisbuseh, Bialle Wiese.
- † — *repens* L., v. *fusca* L. Wiesen am Bahndamm bei Marienthal.
- † — *v. angustifolia* Wolf. Dasselbst, Wiese am Eben-See, Bialle Wiese.
- † — *v. rosmarinifolia* L. Die häufigste Form.
- † — *v. argentea* Sm. Im Walde bei Eichdorf.
- † *Populus alba* L. Zerstreut: Kawentschiner Wald, am Blondzmin See, Johannesberger Holz, am Schwarzwasser.
- † — *pyramidalis* Rozier. Vielfach an Wegen und Gehöften angepflanzt.
- † — *nigra* L. Noch häufiger an Wegen.

Monocotylae.

- Elodea canadensis* Rich. u. Mich. Tümpel zwischen Drosdowo und Poleduo.
- Stratiotes aloides* L. Buddiner See, Eben-See, Mukrz-See, Czarnowo-See, Gräben nördlich Marienthal, Lniannoer See.
- Sagittaria sagittifolia* L. Graben südlich Carlshorst, Teich südlich Driczmin.
- Scheuchzeria palustris* L. Am Czarnowo See, Bruch südlich Lnianno, Brüche zwischen Driczmin und Schirowslaw.
- Potamogeton alpinus* Balbis. Mukrz-Fliess, Rischke-Fliess, fruchttragend.
- *gramineus* L., v. *graminifolius* Fr. Torfgraben im Bel. Brunstplatz.
- — v. *heterophyllus* Fr. Pniewnoer See.
- † — *nitens* Web. Blondzmin See.
- *obtusifolius* M. u. K. Teich am Pniewnoer Walde.
- † — *mucronatus* Schrad. Blondzmin See.
- *pusillus* L. Teich am Pniewnoer Walde.
- † — *rutilus* Wolfgang. Pniewnoer See.
- *pectinatus* L. Mukrz-See.
- Lemna minor* L. Am 7. Juli am Buddiner See blühend.
- Sparganium minimum* Fr. Sümpfe im Forst Lindenbusch, bei Blondzmin, Marienthal, Lnianno, Marienfelde.
- Calla palustris* L. Am 27. Juli am Nordende der Birkwiese ein Exemplar mit doppelter Blüthenscheide.
- † *Orchis maculata* L. Waldwiesen nördlich Marienthal, am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- *incarnata* L. Wiesen am Cisbuseh und Mukrzfliess, am Czarnowosee.
- — v. *Traunsteineri* Vent. Wiesen zwischen Pniewno und Buddin, am Buddiner See.

- † *Gymnadenia conopea* R. Br., *v. densiflora* A. Dietrich. Sumpfwiese zwischen dem Eben-See und Cisbusch, an mehreren Stellen.
- † *Platanthera bifolia* Rehb. Wirwa Parowe.
Epipactis palustris Crntz. Sumpfwiesen am Eben-See, Czarnowo-See, Mukrz-Fliess, Bialle Wiese.
- † *Listera ovata* R. Br. Sumpfwiese zwischen dem Eben-See und Cisbusch.
Lilium Martagon L. Am Schwarzwasser unterhalb Groddeck, Wirwa Parowe.
Allium vineale L. Aecker bei Heinrichsdorf, Pniewno, Eschendorf, Dombrowko.
- † — — *v. compactum* Thuill. Grabenrand südöstlich Eschendorf.
— *oleraceum* L. Zw. Heinrichsdorf und Terespol, Parowen bei Driczmin und Rowinitza.
Polygonatum multiflorum All. Cisbusch am Rischke-Fliess, am Schwarzwasser unterhalb Groddeck, Wirwa Parowe.
- † *Juncus Leersii* Marsson. Mit *J. effusus* doch seltener.
- † — *glaucus* Ehrh. Zw. Eschendorf und Heinrichsdorf, am Salescher See, Eben-See, zw. Lnianno und Sternbach, am Schwarzwasser zerstreut.
- † — *capitatus* Weigel. Feuchte sandige Aecker: nördlich Bukowitz, zw. Siemkau und Hintersee, am Mukrz-See, zw. Lnianno und Sternbach, zw. Driczmin, Gatzki, Dombrowko und Wilhelmshof an verschiedenen Stellen.
— *supinus* Mneh. Brüche bei Franzdorf, Lnianno, Schiroslaw, Schiroslawek, Driczmin, Gatzki, Dombrowko, Wilhelmshof.
- † — *squarrosus* L. Forst Lindenbusch nahe dem Salescher See, Schewinkoer Wald, Südrand der Sternbacher Forst, in den Heiden um Lnianno an vielen Stellen.
- † — *Tenageia* Ehrh. Im Graben zwischen Dombrowko und Wilhelmshof, am Bruch südlich Lnianno.
- † *Luzula pilosa* L. In den Forsten und Heiden zerstreut.
- † — *sudetica* Presl, *v. pallescens* Bess. Johannisberger Holz, Heide zw. Lnianno und Schiroslaw.
- Cyperus fuscus* L. Mukrz-See, Lniannoer See, Teich zwischen Gatzki und Dombrowko.
- Rhynchospora alba* L. Brüche bei Lnianno.
- † *Scirpus setaceus* L. Bruch südöstlich Lnianno, feuchte Brüche zw. Lnianno und Sternbach.
- † — *Tabernaemontani* Gmel. Lniannoer See.
- † *Carex dioica* L. Wiesen am Mukrz-Fliess.
- † — *disticha* Huds. Wirwa Parowe, zwischen Buddin und Pniewno.
- † — *vulpina* L., *v. nemorosa* Rehent. Wirwa Parowe.
- † — *paniculata* L., *v. simplicior* Anderssen. Am Buddiner See.
- † — *canescens* L. Am Marienfelder See.
— *Goodenonyhii* Gog., *v. turfosa* Fr. Brüche im Forst Lindenbusch.
— *limosa* L. Sumpfwiesen am Eben-See und Czarnowo-See.

- † *Carex pilulifera* L. Forst Charlottenthal, Forst Bülowsheide, zerstreut.
- † — *digitata* L. Forst Charlottenthal, Forst Osche.
- † — *vesicaria* L. Sümpfe und Seen: bei Pniewno, Buddin, Kawentschiner Wald, bei Sternbach, Marienfelde.
- † — *acutiformis* Ehrh., v. *Kochiana* DC. Am Schwarzwasser bei Ottersteig.
- † — *filiformis* L. Am Buddiner See.
- † — *hirta* L., v. *hirtaeformis* Pers. Sandplätze bei Blondzmin, Lnianno, am Rischke Fließ.
- Setaria glauca* P. B. Braehäcker bei Sternbach, Lnianno, Schirowslaw, Schirowslawek, Wirry, Rowinitza, Driczmin, Gatzki; meist sehr zahlreich.
- † *Hierochloa australis* R. und Schult. Schattige Stellen: Forst Charlottenthal, Forst Osche.
- † *Alopecurus pratensis* L. Eschendorf.
- † — *fulvus* Sm. Nasse Gräben und Wiesen bei Eschendorf, zwischen Dombrowko und Buddin, bei Lnianno, zwischen Sternbach und Rischke-Mühle.
- † *Phleum Böhmeri* Wibel. Trockene Abhänge: Wirwa Parowe, Driczmin Parowe und am Schwarzwasser.
- † — *pratense* L. v. *nodosum* L. An trockenen Stellen oft häufiger als die Hauptform.
- † *Oryza clandestina* A. Br. Rischke-Fließ.
- † *Agrostis vulgaris* With. v. *stolonifera* S. F. W. Unger. Forst Lindenbusch.
- † — *canina* L. Sümpfe bei Blondzmin, Lnianno, Driczmin, Schirowslaw.
- † *Calamagrostis lanceolata* Rth. v. *Gaudiana* Rehb. Kawentschiner Wald.
- † — *neglecta* Fr. Bruch westlich Blondzmin.
- † *Ammophila arenaria* Lk. Pniewnoer Wald, Lipnitzer Wald.
- † *Milium effusum* L. Cisbusch.
- † *Koeleria cristata* Pers. Wirwa Parowe.
- † — — v. *glauca* D. C. Zwischen Pniewno und Buddin, Lipnitzer Wald, Johannisberger Holz, zwischen Gatzki und Dombrowko.
- † *Aira caespitosa* L. v. *altissima* Lmk. Parowe westlich Julienhof.
- † *Holcus mollis* L. Wirwa Parowe, Kawentschiner Wald, Johannisberger Holz, Wiesen westlich Marienfelde, zwischen Schirowslaw und Driczmin.
- Arrhenatherum elatius* M. u. R. Zwischen Eschendorf und Buddin, Birkwiese.
- Avena flavescens* L. Aecker nördlich Rowinitza.
- † — *caryophyllea* W. C. Wirwa Parowe und an vielen Wegen: Bei Pniewno, Driczmin, Gatzki, Dombrowko, Wilhelmshof, Lnianno, Marienfelde, Schirowslaw, Schirowslawek, Wirry, Rowinitza.
- † — *praecoæ* P. B. An Wegen: Zwischen Brunstplatz und Blondzmin, südlich vom Blondzmin-See, zwischen Lnianno und Andreasthal, zwischen Gatzki und Dombrowko, zwischen Driczmin und Schirowslaw.
- † *Melica nutans* L. Forst Osche, Cisbusch, Wirwa Parowe.
- † — *uniflora* Retz. Cisbusch.

- Briza media* L. Raine und Wälder: bei Eschendorf, Kawentschiner Wald am Eben-See, am Mukrz-Fliess, Johannisberger Holz, bei Driczmin und Rowinitza.
- † *Poa nemoralis* L. v. *firmula* Gaud. Im Parke von Eschendorf.
- † — — v. *vulgaris* Gaud. Wirwa Parowe.
- † *Glyceria fluitans* R. Br. v. *loliacea* Huds. Tümpel zwischen Drosdowo und Poledno.
- † — *plicata* Fr. Mukrz-See, Rischke-Fliess, Teich nördlich Schiroslaw, Teich südlich Rowinitza.
- Molinia coerulea* Mnch. v. *arundinacea* Schrk. Südrand der Sternbacher Forst.
- † *Cynosurus cristatus* L. Auf Wiesen und an Wegen häufig.
- † *Festuca rubra* L. Zwischen Eschendorf und Buddin.
- *gigantea* Vill. Cisbusch, Driczmin Parowe, am Schwarzwasser.
- † — *elatior* L. v. *pseudololiacea* Fr. Zwischen Buddin und Pniewno.
- Brachypodium silvaticum* R. und Schult. Cisbusch, Wirwa Parowe, am Schwarzwasser unterhalb Groddeck.
- *pinnatum* P. B. Am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- † *Bromus arvensis* L. Bei Eschendorf häufig, bei Lnianno, am Schwarzwasser oberhalb Rowinitza.
- † — *erectus* Huds. In einem Exemplar an einer Kiesgrube bei Eschendorf.
- † *Triticum repens* L. v. *caesium* Presl. Zwischen Eschendorf und Buddin, am Rischke-Fliess, Johannisberger Holz.
- † — — v. *Vaillantianum* Wolfm. Eschendorf auf Gartenland.
- Elymus arenarius* L. Sternbacher Forst am Rischke-Fliess.
- † *Lolium remotum* Schrnk. In den meisten Leinfeldern.
- † *Nardus stricta* L. Schlechte Wiesen und Sumpfränder bei Buddin, Lnianno.

Gymnospermae.


- Taxus baccata* L. Die stärkeren Stämme im Cisbusch haben in 1 m. Höhe 80—90 cm. Umfang, einzelne massen in derselben Höhe 97, 108, 116, 120, 123 (hohl), 133 cm.; der stärkste Stamm hatte in 15 cm. Höhe 198 cm., in 90 cm. Höhe noch 187 cm. im Umfang. Die beiden letzteren Stämme theilten sich bald über der gemessenen Stelle.
- Juniperus communis* L. In einem Busch zwischen Driczmin und Rowinitza hatte ein Wachholderstamm in 40 cm. Höhe 63 cm., in 100 cm. Höhe noch 52 cm. Umfang.
- Pinus silvestris* L. Einzelne Stämme im Cisbusch hatten in 100 cm. Höhe einen Umfang von 241, 245, 248 und 260 cm.
- † *Picea excelsa* Lk. In Schonungen: Johannisberger Holz, Forst Lindenbusch. Im Garten von Eschendorf sind während der grossen Julihitze dieses Jahres zwei freistehende ca. 25jährige Rothtannen an der Westseite, etwas südlich, der Länge nach aufgespalten (von mir bemerkt am

17. Juli, wenige Tage vorher waren die Bäume noch unverletzt). Beide etwa fingerbreite Risse gingen bis in die Mitte des Holzes und reichten fast vom Erdboden bis über die Mitte der Bäume.

† *Larix decidua* Mill. Johannisberger Holz.

Cryptogamae.

- † *Equisetum arvense* L. v. *nemorosum* A. Br. Eschendorf, Kawentschiner Wald, Johannisberger Holz.
 — *maximum* Lmk. Am Schwarzwasser zwischen Rowinitza und Vorwerk Wirry in grosser Menge.
- † *Lycopodium Selago* L. Forst Lindenbusch, westlich vom Czarnowo-See.
 — *annotinum* L. Forst Charlottenthal, Forst Lindenbusch, Sternbacher Forst, Schewinkoer Wald; heerdenweise.
 — *imundatum* L. Auf nassem Sandboden am Südufer des Blondzmin-Sees, am Ufer des Bruches südöstlich Lnianno; auf Torfmoor auf Brüchen bei Lnianno.
 — *clavatum* L. Heide bei Buddin, Kawentschiner Wald, Forst Lindenbusch, Sternbacher-Forst; mehr zerstreut.
 — *complanatum* L. Schewinkoer Wald, Forst Lindenbusch, Forst Charlottenthal; gesellig.
- † *Botrychium Lunaria* Sw. Johannisberger Holz.
- † — *rutaceum* Willd. Daselbst, am Kreuzwege.
Polypodium vulgare L. Wirwa Parowe; am Schwarzwasser unterhalb Groddeck an einem Abhange nahe der Bahn in grosser Menge.
Phegopteris Dryopteris Feé. Wirwa Parowe, Sternbacher Forst am Hammer-Flieiss.
Polystichum cristatum Sw. Wirwa Parowe.
 — *spinulosum* Dl. v. *dilatatum* Hoffm. Forst Lindenbusch.
- † *Cystopteris fragilis* Bernh. Wirwa Parowe, am Schwarzwasser bei Rowinitza.
 † *Asplenium Trichomanes* L. Wirwa Parowe bei Julienhof, nur wenige Exemplare.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [NF_6_3](#)

Autor(en)/Author(s): Hohnfeldt R.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des Kreises Schwetz in Westpr. 183-198](#)