

Schon Schneider wendet sich 1787 in seiner „Systematischen Beschreibung“ I. Tl. S. 175. gegen die Esper'sche Vermutung der Identität beider Falter, ist aber in dem Glauben befangen, Lepechin habe den Falter unter dem Namen Pap. Paphioides beschrieben und abgebildet, und hierdurch kann das Zitat Ochsenheimer's veranlasst worden sein, der Lepechin nicht verglichen hat (vgl. Schmett, Sachsens, 1805. S. 127.).

Cöthen (Anhalt), 29. September 1904.

M. Gilmer.

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Himsel, Linz.

(Fortsetzung.)

157. *corylata* Thunb. Im Mai und Juni. Die Raupe im September, Oktober an Betula, Tilia, Prunus, Populus tremula. Um Steyr und Spitznabach in wenigen Exemplaren (Gross); Weyer (Metzger); Weinzierl, Herndl (Hauder).

158. *badiata* Hb. Nach Mitteilungen des Hr. Kautz um Linz gefangen.

159. *berberata* Schiff. Im Mai, dann in zweiter Generation im August. Die Raupe im Juni und September an Berberis. Umgebung von Linz (Himsel, Kautz, Felkl); Kremstal meist selten (Hauder); Steyr, häufig (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster (Pfeiffer); Linz, Steyr selten (Brittinger).

160. *nigrofasciaria* Goeze. April, Mai. Raupe im Juni an Rosaceen. Weyer (Metzger, Steyr, ziemlich selten (Gross); Umgebung von Wels (Brittinger).

161. *rubidata* F. Mai und Juni. Raupe im August an Galium, Asperula, Altpernstein (Hauder); um Steyr sehr vereinzelt (Gross). Umgebung vom Attensee.

162. *comitata* L. Juni, Juli. Raupe im Oktober an Chenopodium. Linz, Steyr häufig (Brittinger).

163. *sagitata* F. Am 24. Juli 1 ♂ im Gesäuse (Gross).

25. *Asthena* Hb.

164. *caudata* Schiff. Vom Mai bis Juli. Raupe im August und September auf Fagus, Corylus, Carpinus. Im ganzen Gebiete.

165. *anseraria* H. S. Im Juni bei Herndl und Michldorf (Hauder).

26. *Thepbrocystia* Hb.

166. *oblongata* Thunb. Im Mai und Juni. Raupe im September an Senecio, Solidago, Achillea, Eupa-

torium. Im ganzen Gebiete verbreitet, doch nicht häufig.

167. *linariata* F. Im Juni ein Stück am Kremsursprung (Hauder).

168. *pyreneata* Mab. Von Ende April bis Mitte Juni. Raupe im Juli und August an Digitalis lutea. Im Gebirge häufig, seltener um Steyr (Gross); Gradenalm (Hauder); Weyer (Metzger).

169. *laquaearia* H. S. Mai. August (zweite Generation?) Raupe im Herbst an Euphrasia. Kirchdorf (Hauder); Steyr 1 Exemplar durch Lichtfang (Gross).

170. *pusillata* S. V. Mai und Juni. Raupe im August an Abies, Pinus, Juniperus. Ottensheim (Himsel); Kremstal (Hauder); um Steyr und im Gebirge häufig (Gross); Weyer (Metzger).

171. *conterminata* Z. Im Mai bei Steyr von Hr. Mitterberger (Hauder); eine Puppe in Tannenborke gefunden, gab Ende April ein ♂ (Gross).

172. *abietaria* Göze. Mai, Juni. Die Raupe vom August an in Chermes-Gallen an Fichten minierend. Im ganzen Gebiet verbreitet, doch nicht häufig.

173. *togata* Hb. Mai, Juni. Raupe bis Herbst in Fichtenzapfen. Kirchdorf (Hauder); im Flachlande selten (Gross).

174. *insignata* Hb. April und Mai. Bei Kirchdorf zwei Stück (Hauder); selten bei Steyr (Gross).

175. *venosata* F. Juni. Raupe im Juli an Silene und Lychnis. Kremstal (Hauder); Steyr und Weyer (Gross).

176. *pimpinellata* Hb. Mai. Raupe im September. Krohleiten (Hauder); Weyer nicht selten (Metzger).

177. *extraversaria* H. S. Juni und Juli. Die Raupe im August an Angelica, Peucedanum, Pimpinella. Kremstal selten (Hauder); bei Steyr (Gross).

178. *distinctaria* H. S. Raupe Ende August an Thymus vulgaris bei Weyer in grösserer Anzahl (Metzger).

179. *expallidata* Gn. 1. August am Kremsursprung (Hauder).

180. *assimilata* Gn. Mai bei Kirchdorf (Hauder); Mitte Juni am Lichte bei Steyr (Gross); Raupe Ende August bei Weyer (Metzger).

181. *absinthiata* Cl. Vom Mai bis Juli. Die Raupe im Herbst an Senecio, Artemisia, Eupatorium, Achillea. Kremstal, nicht selten (Hauder); Weyer (Metzger).

182. *denotata* Hb. Juni, Juli. Raupe vom August bis Oktober auf Campanula trachelium-Samen bei Steyr (Gross); auf Bergwiesen bei Michldorf (Hauder).

183. *albipunctata* Hw. Mai und Juni. Raupe im August und September an *Heracleum*, *Peucedanum*. Im Gebirge verbreitet, doch meist selten, Kremstal (Hauder); Mai und auch noch im September durch Lichtfang in reinen Stücken. (Gross); Weyer (Metzger).

184. *vulgata* Hw. Im Mai und Juni. Kremstal nicht selten, (Hauder); um Steyr nicht häufig (Gross).

185. *virgaureata* Dbld. Juni. Raupe im Herbste an *Solidago*, *Senecio*. Kirchdorf, Herndl, selten (Hauder); Weyer (Metzger und Gross).

186. *trisinariata* H. S. Vom Mai bis Juli. Raupe im Herbste an *Angelica*, *Heracleum*. Kremstal, meist selten (Hauder); Steyr (Gross).

187. *lariciata* Fr. Bei Weyer (Metzger).

188. *castigata* Hb. Mai und Juni. Raupe im August und September an *Crataegus*. Im ganzen Gebiete.

189. *veratraria* H. S. Juni und Juli. Raupe im Herbste an *Veratrum*. Im Kremstal, selten (Hauder). Am Schoberstein in manchen Jahren häufig, von den überwinterten Puppen entwickeln sich höchstens ein Drittel nach der ersten Überwinterung, die meisten nach der zweiten, der Rest nach der dritten. (Gross).

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion.

Herrn A. V. in Sch. Seit 3. August in Ordnung.

Herrn P. B. in H. In nächster Nummer.

Herrn J. A. in B., M. G. in C., F. H. in L., Dr. H. B. in H. Mannskripte erhalten. Besten Dank.

Herrn V. W. in M. Die Adresse wechselt. Herr A. ist auf Reisen. Rückkehr unbestimmt.

Anzeigen.

Nordamerikanische Coleopteren

und Lepidopteren in grosser Anzahl im Tausch gegen palaearktische und exotische Schmetterlinge, Zuchtmaterial oder Briefmarken abzugeben. Offerten sofort erbeten.

Otto Popp, Karlsbad (Böhmen), Stadthaus 12.

Ornith. *hecuba*,

e. l. sup. herrlich grün, Paar nur 15.— Mk.

K. Dietze, Dobraustr. 108 I, Plauen i. V.

Falter 1904

gespaunt, in Anzahl abzugeben. 3 *podalirius*, 40 *apollo*, 100 *hyale*, 50 *myrmidone*, 50 *cardamines*, 100 *urticae*, 30 *paphia*, 30 *agajla*, 30 *tiliae*, 50 *pinastri*, 40 *S. quercus*, 100 *vinula*, 100 *neustria*, 100 *dispar*-60 *pavonia*, 50 *pyri*, 100 *chrysothorax*, 100 *grossu*, *lariata*, 50 *hirtarius*, 30 *piniperda* und andere.

Ubald Dittrich, Vorgartenstr. 209, Wien II 8.

Eier: *fraxini* Dtzd. 40 Pfg., *elocata* 25 Pfg., *nupta* 10 Pfg., *sponsa* 30 Pfg., *dumi* 20, *aprilina* 10 Pfg., *paleacea* 30 Pfg., *caecimaacula* 25 Pfg., *oxyacanthae* 10 Pfg., *ab. flavescens* 20 Pfg., *gilvago* 20 Pfg., *dispar* 5 Pfg., *pistazina* 10 Pfg., *lota* 10 Pfg.

Raupen: *fimbria* Dtzd. 20 Pfg.

Puppen: *podalirius* Stek. 10 Pfg., *polyxena* 10 Pfg., *amphidamas* 12 Pfg., *ligustri* 10 Pfg., *euphorbiae* 7 Pfg., *tiliae* 10 Pfg., *ocellata* 10 Pfg., *populi* 8 Pfg., *vespertilio* 35 Pfg., *pinastri* 8 Pfg., *elpenor* 7 Pfg., *lanestrus* 5 Pfg., *versicolora* 25 Pfg., *pyri* 30 Pfg., *spini* 25 Pfg., *pavonia* 10 Pfg., *pernyi* 25 Pfg., *scrophulariae* 7 Pfg., *betularius* 5 Pfg., *furcula* 35 Pfg., *menyanthis* 20 Pfg. Gespannte Falter Ia.: 100 *pernyi* 25.— Mk., 100 v. *sicula* 25.— Mk., 100 *rhamni* 3.50 Mk., 50 *aprilina* 4.50 Pfg., 100 *pistazina* 7.— Mk., 100 *segetum* 5.— Mk., 100 *grossulariata* 5.50 Mk., 100 Agr. dahlii 15 Mk. Ausführliche Liste auf Wunsch. Auch Tausch.

C. F. Kretschmer, Falkenberg O. S.

Grällsia *isabellae*.

Lebenskräftige, schöne Puppen aus Spanien offeriere à 5 Mk., 1/2 Dtzd. 28 Mk., 1 Dtzd. 50 Mk. Versandt nur gegen Nachnahme. Kein Tausch. Porto und Emballage extra.

M. Rühl, Zürich V.

Geo. C. Krüger, Bosco di Ficuzza, Prov. Palermo, Italien

liefert *Celaena vitalba* ♂ 7.50 Mk., *Polyphaenis* var. *viridata* Ragusa, pass. Exemplare à 10.— Mk., *Syntom. phegea* ab. *krigeri* Ragusa à 10.— Mk. tadellos präpariert. Porto extra.

Puppen von *Agrotis faceta* à 1.25 Mk., Dtzd. 12 Mark. *Faceta* dürfte sich zur Iuzucht eignen. Referat über Zucht, Lebensweise, über Stellung im System s. Püngeler *Naturl. siciliano* 1904, Bd. 17.

Lebende Puppen.

P. podalirius 1.— Mk., *Th. polyxena* 1.20 Mk., *cerisyi* 5.50 Mk., *S. pyri* 2.60 Mk., *spini* 2.20 Mk., *Deil. vespertilio* 4.— Mk., *euphorbiae* 70 Pfg., *End. versicolora* 2.— Mk., *P. lunaris* 1.80 Mk. per Dtzd. Bei grösserer Abnahme nach Uebereinkommen. Nur per Kassa oder Nachnahme. Porto und Packung extra.

Ubald Dittrich, Wien II/8, Vorgartenstr. 209.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Himsel Ferdinand

Artikel/Article: [Die Geometriden Oberösterreichs 107-108](#)