

# Waldgesellschaften der Bückeberge

- Manfred Förster, Wennigsen -

## ZUSAMMENFASSUNG

Die Bückeberge sind der nördlichste Bergzug des "Unteren Weser-Leine-Berglandes" und grenzen unmittelbar an die nordwestdeutsche Tiefebene. Das Klima des Gebietes ist subozeanisch bis ozeanisch, in Lagen über 300 m ü.NN kühl-ozeanisch. Nach dem ELLENBERG-Quotienten liegt der Bergzug in der Zone der Eichen/Buchenwälder und trägt eine Kappe reiner Buchenwälder. Die Wälder sind submontanen, in den Hochlagen montanen Charakters. Das Grundgestein und die daraus entstandenen Böden sind überwiegend basenarm. So finden sich Waldgesellschaften, die dem montanen *Luzulo-Fagetum* und dem submontanen *Luzulo-Quercus-Fagetum* angehören. Ferner kommen im Gebiet an Waldschwingel reiche Buchenwälder vor, die möglicherweise mit aus anderen Gebieten beschriebenen Wäldern gleicher Struktur eine eigene Assoziation, das *Festuco altissimae-Fagetum* bilden. Daneben werden kleinflächig ausgebildete Bach-Eschenwälder sowie Gesellschaften des *Stellario-Carpinetum* und des *Melico-Fagetum* beschrieben.

## SUMMARY

The "Bückeberge" are the northernmost mountain-range of the lower Weser-Leine mountains. They border immediatly on the north-western lowlands of Germany. The climate of this area is suboceanic to oceanic, above mor than 300 m cool oceanic. According to the "ELLENBERG-Quotient" the mountains are situated in the zone of the submontane oak and beech forests. Montane beechwoods alone form the vegetation in the higher parts. The clays and stones originate from Wealden formation and Diluvium. Therefore mostly the soils are poor in bases. In this reason the most important plant associations relate to the montane *Luzulo-Fagetum* and to the submontane *Luzulo-Quercus-Fagetum*. Besides we have found beechwoods which are rich in *Festuca altissima*. Possibly they forme an association *Festuco altissimae-Fagetum* together with woods of the same structure in other regions. Some more rich plant associations are described which occur only on small areas. They relate to the *Carici remotae-Fraxinetum*, *Stellario-Carpinetum*, and *Melico-Fagetum*.

Zwischen Lauenau und Bad Eilsen durchquert die Autobahn Hannover - Ruhrgebiet die breite Talmulde der Bückeburger Aue. Diese Mulde wird im Norden von dem langgestreckten Bergzug der Bückeberge begrenzt. Er ist die letzte Erhebung des "Unteren Weser-Leine-Berglandes" gegen die nordwestdeutsche Tiefebene, aus der er recht unvermittelt bis zu einer Höhe von 370 m ü.NN ansteigt.

Vor Zeiten von Buchen beherrscht (Beukenberge = Buchenberge) sind in den vergangenen 200 Jahren tiefgreifende Umstrukturierungen in der Waldzusammensetzung erfolgt, so daß man heute eher von "Fichtenbergen" sprechen müßte. Diese Fichtenforste sind in ihrer aktuellen Ausformung ökologisch recht instabil. Die permanent eintretenden Schadensereignisse (Windwurf 1972, 1976; Schneebruch 1979 etc.) führen immer wieder zu ausgedehnten Bestandeszerstörungen, deren Beseitigung nicht nur kostpsielig ist, sondern auch den Waldbau treibenden Forstmann der Freiheit des Handelns beraubt. Es erschien daher sinnvoll, das Gebiet vegetationskundlich zu erkunden, um auf dieser Grundlage u.a. Anhaltspunkte für waldbauliche Entscheidungen mit dem Ziel zu gewinnen, ökologisch stabilere Wälder aufzubauen, ohne auf die Fichte als Hauptbaumart verzichten zu müssen.

Über das Ergebnis dieser Arbeit soll hier kurz berichtet werden, auch wenn die vorgefundenen Waldgesellschaften für den "Raritätenjäger" relativ uninteressant erscheinen mögen. Immerhin kann das Mosaik der bodensauren Laubwälder vielleicht um ein Steinchen bereichert werden.

## KLIMATISCHE VERHÄLTNISSE

Die Klimawerte des Gebietes sind in starkem Maße durch die exponierte Lage der Bückeberge gegen die nordwestdeutsche Tiefebene beeinflusst. Zusätzlich ergeben sich aus der langgestreckten Form des Bergzuges einige auch waldbaulich bedeutsame Unterschiede, insbesondere in den Niederschlagsdaten. In den Tieflagen beträgt die Jahresdurchschnittstemperatur 8.7 °C, die der Vegetationszeit 14.8 °C. Die mittleren Monatstemperaturen schwanken zwischen 0.4 °C (Jan.) und 17.9 °C (Juli). Der Niederschlag steigt vom Osten mit 675 mm nach Westen hin auf 750 mm an. 47% fallen in der Vegetationszeit.

Insgesamt ist das Klima subozeanisch mit nach Westen deutlich zunehmender Ozeanität. Der Quotient nach ELLENBERG (1963) bewegt sich zwischen 23.0 und 23.8. Nach der von ELLENBERG (a.a.O.) gegebenen Übersicht gehört das Gebiet zum Bereich potentieller Eichen/Buchenwälder im Osten sowie im Westteil bereits zu den ozeanischen Eichen/Buchenwäldern.

In den Hochlagen des Bergzuges wird nur noch eine Jahresdurchschnittstemperatur von 6.0 °C erreicht. Die Temperatur der Vegetationszeit beträgt 13 °C. Die mittleren Monatstemperaturen bewegen sich zwischen -1.4 °C (Jan.) und 15.1 °C (Juli). Die Niederschlagswerte steigen von 880 mm im Osten auf 950 mm im Westteil. Der Anteil in der Vegetationszeit liegt bei 48%. Bezeichnend für diese etwa bei 300 m ü.NN beginnende Zone ist ferner eine reichliche Nebelbildung, die durch Auskämmen zusätzlichen, nicht meßbaren Niederschlag erbringt.

Das Klima der Hochlagen kann somit in seinem Gesamtcharakter als kühl-ozeanisch bezeichnet werden. Der ELLENBERG-Quotient hat einen Wert von 15.9 im Westen und 17.1 im Osten. Somit liegen die Hochlagen der Bückeberge im Bereich reiner Buchenwälder.

#### GRUNDGESTEINE UND BÖDEN

Geologisch wird der heute noch mit Wald bestockte Teil der Bückeberge überwiegend aus den Schichten der Unteren Kreide aufgebaut. Sie gehören allesamt der Wealden-Formation an. Sedimente des Jura, im Waldgebiet durch den Münder Mergel und Serpult repräsentiert, treten am Südhang an die Oberfläche. Die Schichten fallen nach Norden ein, so daß die gesamte Nordabdachung geologisch relativ einheitlich aufgebaut ist, während am Südhang die verschiedenen geologischen Schichten austreten und dieser Bereich hinsichtlich des Ausgangsmaterials der Bodenbildung recht variable Verhältnisse aufweist. In unteren bis mittleren Hanglagen steht der Serpult in einer bis 100 m mächtigen Folge von Tonen, Schiefen und Mergeln an. Ihm folgt in 50 bis 75 m Mächtigkeit der Wealdenton bzw. Wealdenschiefer, der von einer 8 bis 15 m starken Decke des Hauptsandsteines überlagert wird.

In der Saale-Eiszeit waren die Bückeberge von Gletschern bedeckt, welche ihre Reste in einer rd. 1 m starken Grundmoräne hinterlassen haben. Die Wirkung der Vereisung selbst reicht 3 bis 4 m in den Sandstein hinein, d.h. der sonst massive Stein ist plattig zerbrochen und mit Tonmaterial durchschlämmt. Die steinreichen glacialen Feinsande sind in ihren bodenphysikalischen Eigenschaften dem Flottsand ähnlich. Waldbaulich von besonderer Bedeutung ist ihre Neigung zur Verdichtung.

Vor allem im Osten des Bergzuges finden sich Lößablagerungen wechselnder Stärke, die ihre größte Mächtigkeit am Südostrand im Reinser Revier erreichen. Am Südhang treten Wealdenton und Serpult nicht allerorten zu Tage. Einmal sind sie von diluvialem Hangschutt überlagert. Zum anderen finden sich im Bereich, in dem der Hauptsandstein vor Beginn des Abbaues als markante Steilkante in die Landschaft ragte, heute ausgedehnte Flächen mit Schuttmaterial des Sandsteines, da die unverwertbaren Steinabfälle über den Hang abgekippt wurden.

Tritt der Serpult an die Oberfläche, so dokumentiert sich seine Anwesenheit durch Hangrutschungen und Quellfluren. Die wasserführenden Schichten sind die Mergel. Das austretende Quellwasser ist daher besonders kalkreich.

Überwiegend ist das Ausgangsmaterial der Bodenbildung basenarm und reich an Tonmineralien. Die Böden haben sich daher zu mehr oder weniger pseudovergleyten und z.T. podsolierten, basenarmen Braunerden entwickelt. Lediglich im Einzugsbereich kalkreicherer Grundwassers findet man basenreiche, pseudovergleyte Braunerden. In der Zone des Münder Mergels sind Böden des Pelosol-Typus zu finden, die auf weiten Flächen durch Lößüberlagerung zu Zwischichtenböden werden. Dabei kommt es über dem Mergel zu einem ausgeprägten Tageswasser-Rückstau. Infolge der ungleichmäßigen Stärke der Lößauflage sind im Gelände oberflächlich kaum erkennbare, stark vernässende Kleinflächen ausgebildet, in denen auch die Buche neben starkem Schleimfluß vor allem vom Windwurf heimgesucht wird. Mit zunehmender Stärke der Lößauflage geht der Boden in im Unterboden pseudovergleyte Parabraunerden über.

Verbindendes Merkmal fast aller Böden in den Bückebergen ist infolge des Tonreichtums oder der Neigung zur Verdichtung ein mehr oder weniger unausgeglichenener Wasserhaushalt des Oberbodens, der sich auch floristisch deutlich ausprägt.

## BEMERKUNGEN ZUR WALDGESCHICHTE

Das Gebiet um die Bückeberge war, wie die vor allem im Ostteil reichlich vorhandenen Hügelgräber ausweisen, bereits in der Bronzezeit besiedelt. Ausgedehnte Rodungen begannen aber erst im frühen Mittelalter. In dieser ersten größeren Rodungsperiode wurde der Wald der Bückeberge von den Gebieten des Schaumburger Waldes und der Weserkette abgetrennt. Die isolierte Lage in Verbindung mit der leichten Zugänglichkeit, der Kohleabbau und die Gewinnung des Obernkirchener Sandsteines hatten eine intensive Nutzung des Waldes im Gefolge.

Der Kohleabbau ist bereits um 1400 urkundlich erwähnt und wurde erst 1960 eingestellt. Der Sandstein aus der Kammlage des Bergzuges fand seit dem Mittelalter nicht nur im unmittelbaren Einzugsbereich für sacrale und Profanbauten Verwendung, sondern er wurde auch seit dem späten Mittelalter über die Weser nach Norddeutschland und Skandinavien verschifft. Der Abbau dieses gegen Umwelteinflüsse besonders stabilen Steines findet heute noch statt.

Der Wald selbst war vom Holzeinschlag, von der Waldweide und der Streunutzung betroffen. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die Ausbeutung der Wälder ein Ausmaß erreicht, daß man durch Erlass einer Bückeberge-Ordnung eine Regelung zu finden hoffte. So waren unter anderem um 1570 die Markenwälder der heutigen Gemarkung Obernkirchen derart verwüstet, daß die Verwaltung und Nutzung den Schaumburger Grafen übertragen wurde.

Offenbar hat sich in der Folgezeit wenig geändert. Die ersten Waldbeschreibungen des Obernkirchener Revieres von 1709 und des Reinser Revieres von 1731/1737 sprechen durchweg von Hutewäldern mit unregelmäßiger Nutzung. Geschlossene Bestände waren nicht vorhanden. An Baumarten werden Buche, Hainbuche, Eiche, Esche und Roterle genannt.

Danach verlief die Entwicklung in den beiden Revierteilen unterschiedlich. 1837 war die Hute im Reinser Revier weitgehend eingestellt. Die Bestände hatten sich zu geschlossenen Hochwäldern entwickelt. Demgegenüber bestand das Obernkirchener Revier auf über 50% der Fläche aus Blößen und lichten Hutewäldern. 25% der Fläche waren mit Mittel- und Niederwäldern bestockt, den Rest bildeten Nadelholzaufforstungen.

Die Hutewälder aus geringwüchsigen, überaltertem Stockausschlag auf bemoosten, überalterten Stöcken waren so stark degradiert, daß nur noch eine Aufforstung mit Nadelholz in Betracht kam. Der Beginn des Nadelholzanbaues in den Bückebergen datiert auf das Jahr 1766. In diesem Jahre wurde in den heutigen Abteilungen 275/276 der Revierförsterei Liekwegen die Fichte ausgesät. Kiefer und Lärche folgten im Jahre 1786. Im Osten der Bückeberge im Reinser Revier begann der Nadelholzanbau erst 1799. Der gute Zustand der Wälder in diesem Bereich hatte aber zur Folge, daß der Nadelholzanbau nie einen großen Umfang erreichte. Im Gegenteil wurden zwischen 1810 und 1900 die Buchenbestände auf großen Flächen verjüngt. In die Verjüngungen stufte man Traubeneiche in mehr oder weniger großem Umfang ein. Diese Bestände mit ihrer naturnahen Mischung prägen heute noch auf weiten Flächen im Osten der Bückeberge das Bild der Wälder. Ausgedehnterer Nadelholzanbau begann hier eigentlich erst nach 1950.

Insgesamt ist die Entwicklung der Wälder durch eine permanente Zunahme des Nadelholzes gekennzeichnet, die zu Lasten der Buche erfolgte. Von 1837 bis 1970 stieg der Anteil der Fichte von 13 auf 45%, derjenige von Kiefer und Lärche von 6 auf 12%. Demgegenüber reduzierte sich die Buchenfläche um 30% auf heute 33% und die der Eiche um 5 auf 7%.

Die landläufige Ansicht, die Fichte sei ein durch die Forstwirtschaft favorisierter Fremdling in unserem Gebiet, kann für die Bückeberge m.E. in der Form nicht aufrecht erhalten werden. Durch einen Revierbeamten wurde ich darauf hingewiesen, er habe in einer Unterhaltung, die sich mit der Geschichte des Obernkirchener Sandsteines befaßte, erfahren, daß um das Jahr 1000 die Fichte in den Bückebergen vorgekommen sein müßte. ELLENBERG (1978) weist darauf hin, daß die Fichte von Natur aus bis weit in das Tiefland verbreitet gewesen sei, wobei sie auf staunassen Plateauböden sogar zur Herrschaft gelangen konnte. Die Ursache ihres Verschwindens wird im Nieder- und Mittelwaldbetrieb gesehen, den die Nadelhölzer natürlich nicht aushalten. "Die für das südwestliche Mitteleuropa so natürlich anmutende klare Absonderung der planaren bis submontanen reinen Laubwaldstufen ... ist also erst durch die Mithilfe des Menschen zustande gekommen und verhältnismäßig jung" (ELLENBERG 1978, S. 294). Auf der Nordabdachung der Bückeberge waren solche Sonderstandorte wie staunasse Plateauböden und saure Bruchwälder reichlich vorhanden, was aus den alten Forstortsbezeichnungen (Pooßbrücher, Blaue Brücher, Rauhes Bruch etc.) hervorgeht. Zieht man ferner

den Gesundheitszustand vieler Altfichten sowie das Vorkommen von *Trientalis europaea*, *Lycopodium annotinum* und *Blechnum spicant* in dem isolierten Bergzug in Betracht, so ist die Ansicht, die Fichte sei mit Hilfe des Menschen in ein ehemaliges Heimatgebiet zurückgekehrt, durchaus nicht abwegig, wobei sie von Natur aus aber sicher nicht ihren heutigen Flächenanteil einnehmen würde.

#### DIE WALDGESELLSCHAFTEN

Die Vegetation der Bückeberge wird potentiell von bodensauren Buchen- und Eichen/Buchenwäldern beherrscht. Die reicheren Waldgesellschaften sind mehr oder weniger streng an Unterhanglagen im Ausschwemmungsbereich des Serpultit und an das kleinflächige Vorkommen des Münder Mergels gebunden.

Wie bereits festgestellt (vgl. Klima), gehören die mittleren und Tieflagen der Bückeberge zum Eichen/Buchen-Gebiet, während die Hochlagen reines Buchengebiet sind. Letztere beginnen bei (280) 300 m ü.NN und nehmen einen Flächenanteil von ca. 30% des Waldgebietes ein. Die vegetationskundlichen Befunde in Verbindung mit den Klimawerten ergeben, daß es sich hier nicht mehr um submontan-colline Buchenwälder handelt, sondern um montane Gesellschaften. Der Bergzug trägt eine im Westen ausgedehnte und sich nach Osten verschmälernde Kappe montaner Buchenwälder.

Ihr folgt eine Zone von Wäldern submontanen Charakters. Lediglich im Südwesten sowie in den Randbereichen im Süden und Osten sind auch colline Mischwälder zu finden. Das potentielle Verbreitungsgebiet dieser Gesellschaften wird heute überwiegend landwirtschaftlich genutzt.

#### Hainsimsen-Buchenwälder

*Luzulo-Fagetum* F.K. Hartm. 1953, Tx. 1954 u.a.

(Tabelle 1; Übersichtstabelle Sp. 12)

Weite Teile des potentiellen Verbreitungsgebietes der Hainsimsen-Buchenwälder sind heute in Fichtenforste umgewandelt. So mußten die wenigen, nicht von *Calamagrostis epigeios* überwanderten Bestände auch bei z.T. atypischer Verlichtung aufgenommen werden. Jüngere, dicht geschlossene Wälder waren i.d.R. noch ohne Bodenvegetation. Die Grundarten sind *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Avenella flexuosa*, *Galium hircynicum* und seltener *Trientalis europaea*. Stets beteiligt ist auch *Dryopteris austriaca* ssp. *dilatata*. Lediglich in den unteren Randlagen greifen Arten wie *Festuca altissima*, *Deschampsia caespitosa* und *Luzula pilosa* über.

Die typischen Hainsimsen-Buchenwälder stocken in exponierten Kammlagen, auf Rippen und Rücken sowie an steilen, südexponierten Oberhängen. Die aus Wealdensandstein und Wealdenton entstandenen Böden sind z.T. stark steinig und weisen allgemein ausgeprägte Podsolierungserscheinungen auf. Die Baumschicht der Bestände wird im wesentlichen von der Buche aufgebaut. Fast stets ist die oft aus Naturverjüngung hervorgegangene Fichte beteiligt. Die stellenweise angetroffene Traubeneiche stammt aus Stockausschlag und ist von der Buche überwachsen bzw. in der Krone eingeklemmt. Die Strauchschicht besteht, sofern nicht durch Wildverbiß vernichtet, aus Buchen- und Fichtenverjüngung, der *Sorbus aucuparia* und seltener auch Birke beigemischt sind.

Neben den bereits genannten Grundarten ist für die Bodenvegetation die reichliche Präsenz von *Luzula silvatica* kennzeichnend. Alle weiteren Arten erreichen allenfalls die Stetigkeit II.

Der Farn-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum athyrietosum*) ist weitaus häufiger als die typische Subassoziation und stellt die zentrale Buchenwald-Gesellschaft der Hochlagen dar. Für die Böden sind die über Wealdensandstein und Wealdenschiefer lagernden diluvialen Deckschichten kennzeichnend. In den oberen Südhanglagen ist zudem eine mehr oder weniger starke Sandstein-Überrollung vorhanden. Die Wälder stocken in ebenen bis schwach geneigten Lagen sowie in den mittleren und unteren Oberhangbereichen. Im Wasserhaushalt sind die Böden frisch bis feucht und durch einen gewissen Steinanteil auch in ebenen Lagen noch leicht wasserzünftig. Sie neigen aber zur Verdichtung und besitzen einen mehr oder weniger ausgeprägten Tageswasserrückstau, der besonders in flachen Geländemulden in Erscheinung tritt und hier in Trockenperioden bzw. Trockenjahren zur Schwächung und zum Absterben der Fichte führen kann.

Die Baumschicht besteht i.d.R. aus Buche und Fichte. Die sporadisch vorhandene Eiche war der Buche im Wachstum noch hoffnungsloser unterlegen als in der Typischen Subassoziation. Die Strauchschicht wird von Buche, Fichte und

Eberesche aufgebaut, denen in tieferen und südexponierten Lagen *Rhamnus frangula* beigemischt sein kann.

Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen von *Abies alba* in dieser Gesellschaft. Sie hat ein Alter von 80 bis 100 Jahren erreicht. In der Höhenentwicklung hat sie mit der Fichte Schritt gehalten und verjüngt sich natürlich. Allerdings wird die Naturverjüngung sofort vom Rehwild vernichtet.

Die Bodenvegetation beherrschen die üppigen Wedel des Dornfarnes und des Frauenfarnes, die bei ungemehrter Entwicklung, d.h. ohne Wildverbiß, bis 100 cm hoch werden können. Sicher gehörte auch *Dryopteris carthusianorum* in

Tabella 1 Hainsimsen - Buchenwälder Luzulo - Fagetum

Nr.	Typischer Hainsimsen - Buchenwald.						Farn - Buchenwald						Hellerfarn - Buchenwald					
	Luzulo - Fagetum typic.						Luzulo - Fagetum athyrioidesum						Luzulo - Fagetum pteridaceum					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Exposition	S . . . S SW 90						S W N S . . . W						N NW SW					
Inklination	35 . . . 20 25 20						40 45 20 30 . . . 10						5 5 5					
Höhe üB. NN	350 376 360 300 280 270						270 280 280 320 360 370 280						280 280 280					
Deckung	a <sub>1</sub> 80 70 70 90 90 90						90 85 90 100 20 100 100						80 95 95					
	a <sub>2</sub> . . . 5 5 . . .						. . . 5 . . .						5 . 20					
	S . . . 50 50 5 . . .						40 40 . . .						. . . 20					
	R 50 60 90 40 70 40						50 20 60 20 30 45 60						60 60 60					
<u>Fagion - Verbandsarten:</u>																		
<i>Fagus sylvatica</i>	B	55	44	43	55	55	45	55	55	33	33	55	31	45	55			
	B	11	11	11	11	11	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .	. . . 11 . . .					
	S	. . . 85	33	11	. . .	. . . 33	11 . . .	. . . 33	11 . . .	. . . 33	11 . . .	. . . 33	11 . . .					
	R	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
<i>Luzula luzuloides</i>	B	. . . 11	11	11	11	11	. . . 11	11	11	11	11	11	. . . 11	11	11			
	R	. . . 11	11	11	11	11	. . . 11	11	11	11	11	11	. . . 11	11	11			
<i>Picea abies</i>	B	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
<i>Abies alba</i>	B	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
<i>Vaccinio - Piceetea - Arten:</i>																		
<i>Vaccinium myrtillus</i>	B	11	33	33	33	33	33	33	12	12	12	12	12	12	12			
<i>Picea abies</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Trientalis europaea</i>	B	. . . 11	11	11	11	11	. . . 11	11	11	11	11	11	. . . 11	11	11			
<i>Differentialart ozeanischer Wälder:</i>																		
<i>Galium saxatile</i>	B	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
<i>Differentialarten der Subassoziationen:</i>																		
<i>Dryopteris austro-orientalis</i>	B	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
<i>Pteridium aquilinum</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Phlox agalutina</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Molinia caerulea</i>	B	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
<i>Fago - Quercetea - Arten:</i>																		
<i>Quercus petraea</i>	B	. . . 11	11	11	. . .	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	11	11			
<i>Mycelis muralis</i>	B	. . . 11	. . . 11	11	11	11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Charakteristische Begleiter bodensaure Wälder:</i>																		
<i>Fritellaria vesiculosa</i>	B	33	23	43	23	33	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
<i>Carex pilulifera</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Agrostis tenuis</i>	B	. . . 12	12	12	12	12	. . . 12	12	12	12	12	12	. . . 12	12	12			
<i>Polypodium formosum</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Milium horum</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Dicranella heteromala</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Sonstige Begleiter:</i>																		
<i>Oxalis acetosella</i>	B	. . . 12	12	12	12	12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	12	12			
<i>Rubus idaeus</i>	B	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
<i>Sorbus aucuparia</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Rubus fruticosus</i>	B	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
<i>Rhamnus frangula</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Senecio verticillatus</i>	B	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11	. . . 11			
<i>Luzula pilosa</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Juncus acutiflorus</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Carex remota</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Luzula silvatica</i>	B	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12	. . . 12			
<i>Weitere Arten:</i>	Nr. 1: <i>Juncus effusus</i> +1, <i>Calluna vulgaris</i> +1; Nr. 2: <i>Pinus sylvestris</i> B 11; Nr. 3: <i>Luzula saccatum</i> +1, <i>Digitalis purpurea</i> +1, <i>Hieracium lachenalii</i> +1; Nr. 4: <i>Lonicera patrylmenum</i> 11; Nr. 5: <i>Caltha nuda</i> +1; Nr. 6: <i>Cladonia europaea</i> B 11; Nr. 7: <i>Dicranum scoparium</i> +2, <i>Calluna vulgaris</i> +1, <i>Calamagrostis epifloea</i> +2; Nr. 8: <i>Brickia ciliaris</i> +1, <i>Brickia spica</i> +1; <i>Hieracium lachenalii</i> +1; <i>Hieracium siliacatum</i> +1; Nr. 9: <i>Scrophularia nodosa</i> +1; Nr. 10: <i>Pinus sylvestris</i> B 11; <i>Myanthemum biflorum</i> 11; Nr. 11: <i>Menyanthes triflorata</i> +1, <i>Helianthus mollis</i> +2, <i>Digitalis purpurea</i> +1																	

die Artenkombination, obwohl er heute nur in Fichten-Forsten angetroffen wurde. Weitere konstante Arten sind *Carex pilulifera*, *Agrostis tenuis* sowie die Moose *Polytrichum formosum* und *Mnium hornum*.

Im Westen der Bückeberge kommt in ausgedehnten flachen, im Gelände oft kaum erkennbaren Senken auf Geschiebe-Decklehm der Adlerfarn-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum pteridietosum*) vor. Klein- und kleinstflächig sind Wälder dieses Charakters als Adlerfarn-Facies im Farn-Buchenwald anzutreffen. Die Gesellschaft fand sich in den tieferen Randlagen, so daß sie insgesamt bereits einen starken submontanen Einschlag aufweist. Da auch auf diesen Standorten fast ausschließlich Fichtenforste stocken, konnten nur 3 Flächen aufgenommen werden.

Die Baumschicht wird von *Fagus silvatica* gebildet, in die einzelne Eichen sowie stellenweise Fichte und Kiefer eingesprenzt sind. Die unterschiedlich entwickelte Strauchschicht besteht aus Buche, *Sorbus aucuparia* und *Rubus idaeus*. Punktuell ist *Rhamnus frangula* beigemischt. In der Bodenvegetation treten Dorn- und Frauenfarn zurück. Dafür werden die z.T. ausgedehnten Horste des Adlerfarnes aspektbestimmend. Sporadisch und primär unter Fichte findet sich *Molinia coerulea*.

Welche Bedeutung die Entstehung des Bestandes für die Wuchsleistung der Buche hat, konnte hier festgestellt werden. Während die Kernwuchsbestände eine gute Leistung (Höhenbonität Lkl. 8) aufweisen, erreichen die aus Stockauschlag durchgewachsenen Bestände nur eine mäßige bis geringe Leistung (Lkl. 5). Für letztere ist zudem Kernbildung bis zur Weißfäule bezeichnend. Die Beobachtung ist ein Hinweis dafür, daß über die Anbauwürdigkeit einer Baumart allein auf Grund der aktuellen Leistung nicht immer entschieden werden sollte. Vielmehr ist die Entstehung des Bestandes in Verbindung mit der Waldgesellschaft und daraus resultierender Vergleiche in die Erwägungen einzubeziehen.

Die Fichte wurzelt auf den Böden des Adlerfarn-Buchenwaldes sehr flach. Sie trägt durch die Stampfwirkung zur weiteren Verdichtung bei und ist im Reinbestand stark durch Windwurf gefährdet. Die Eiche hat in dieser Gesellschaft im Bereich des *Luzulo-Fagetum* die besten Wuchsleistungen, ist aber der Buche noch deutlich unterlegen und wird punktuell bei eingeklemmter Krone auch vom Wind geworfen.

#### Der Hainsimsen-Eichen/Buchenwald *Luzulo-Quercus-Fagetum* F.K. Hartm. (1953) nom. nov. 1965 (Tabelle 2; Übersichtstabelle Sp. 8-13)

Zwischen 150 und 280 m ü.NN nimmt diese Gesellschaft submontanen Charakters den größten Flächenanteil unter den Wäldern der Bückeberge ein. Wealdenschiefer und Wealdentone sowie der Serpult bilden die geologische Unterlage. Diese Gesteine werden von eiszeitlichen Decklehmern und in geringerem Umfang im Osten auch von Löß überlagert. Die Decken sind z.T. so stark, daß das unterliegende Gestein nur noch von tiefwurzelnden Arten erreicht werden kann. Besonders nachteilig ist in diesem Zusammenhang, daß sich an den Grenzschichten ausgeprägte Stauhohizonte ausbilden, die auch bei der Buche zu flachen Wurzelteflern mit hoher Windwurfgefährdung führen. Nicht zuletzt hat der unausgeglichene Wasserhaushalt in Trockenjahren und in den Buchen-Reinbeständen immer wieder Schleimflußschäden im Gefolge.

An der Baumschicht ist, wenn auch in variierenden Anteilen, stets die Eiche beteiligt. In den meisten Fällen handelt es sich um Traubeneiche. Im Westbereich in frischen bis feuchten Senken und Unterhanglagen kommt die Stiel-eiche hinzu bzw. ist allein noch vorhanden.

In der Bodenvegetation kann für alle Gesellschaften das konstante bis hochkonstante Vorkommen von *Deschampsia caespitosa*, in weiten Zonen zusammen mit *Carex remota*, als bezeichnend angesehen werden. Zwischen dem Ostteil der Bückeberge und dem Westen wurde ein deutlicher Unterschied in der Artenzusammensetzung in der Bodenvegetation beobachtet. Im Ostteil ist *Festuca altissima* ein regelmäßig vorhandenes Element des Artenbestandes. Das Vorkommen klingt im Osten der Revierförsterei Borstel aus. Zudem erscheint die Art hier nur noch in den reicheren Gesellschaften. Eine, wenn auch im Ganzen recht zögernde Ausbreitung konnte festgestellt werden. Auffällig ist ferner, daß der Waldschwingel das Bornautal nach Westen hin kaum überschreitet, so daß sich aktuell eine von Nordost nach Südwest quer über den Bergzug laufende Verbreitungsgrenze ergibt.

Es fiel an einigen Punkten auf, daß der Waldschwingel auch in Althölzern an relativ scharfen Grenzen anhält, so daß sicher standörtliche Gründe für das

Verbreitungsbild maßgebend sind. In den Hauptverbreitungsgebieten von *Festuca altissima* stehen Serpultit und Wealdenschiefer direkt an der Oberfläche an oder werden von Löß überlagert. Im Bereich diluvialer Schuttdecken mit Oberbodenverdichtung und bei Wealdensandstein-Überrollung, d.h. bei zumindest im Oberboden ärmeren Standorten fehlt die Art. Hier ist z.B. *Vaccinium myrtillus* häufiger. Andererseits kann das Fehlen von *Festuca altissima* überall dort, wo u.a. *Milium effusum* und *Melica uniflora* auftreten, nur aus der historisch unterschiedlichen Nutzung der Wälder erklärt werden. Auf die verschiedene Dauer und Stärke der waldverwüstenden Eingriffe des Menschen wurde bereits eingegangen. Eine Rückwanderung konnte noch nicht erfolgen, da diese potentiellen Standorte z.T. sehr weit von den Verbreitungszentren entfernt liegen. Die Zwischenzonen sind partiell in Fichten-Forstre umgewandelt, und Laubholzbestockungen wachsen flächenweise nunmehr erst in das Stadium der Wiederbegrünung hinein, kommen als Durchwanderungszonen also nicht in Betracht. Erschwerend wirkt, daß der Waldschwingel sehr gerne vom Wild verbissen und dabei samt den Wurzeln vom Boden abgehoben wird und vertrocknet. So werden punktuelle Ansiedlungen immer wieder vernichtet.

Die aktuelle Konzentration von *Ilex aquifolium* auf bestimmte submontane Waldgesellschaften ist sicher nicht standörtlich bedingt, sondern nur historisch zu erklären. So gibt es alte Forstortsbezeichnungen wie Hülsebach, Helsengrund etc., die auf frühere Massenvorkommen der Art hinweisen. Heute ist *Ilex* dort kaum mehr zu finden. Immerhin breitet sich die Art jetzt auch in den Fichtenforsten wieder aktiv aus. Verbindet man allerdings die Bereiche ehemaliger und heutiger Massenvorkommen, so fällt auf, daß sich diese auf den Westen bis Norden der Bückeberge konzentrieren, d.h. auf die klimatisch stärker ozeanischen Teile des Waldgebietes.

Trotz des Vorkommens von *Lonicera periclymenum* und ggf. *Pteridium aquilinum* gehören die submontanen Buchenmischwälder nicht zum *Fago-Quercetum*, da alle weiteren kennzeichnenden Arten dieser Waldgesellschaft wie *Teucrium scordonia*, *Melampyrum pratense* und *Holcus mollis* fast ausschließlich in den Eichenforsten gefunden wurden. Vielmehr handelt es sich um die in der Baumartenkombination durch Eiche bereicherten submontanen bis collinen Hainsimsen-Eichen/Buchenwälder, die von F.K. HARTMANN (1953) als *Luzulo-Quercetum*, von OBERDORFER (1957) als *Melampyro-Fagetum* beschrieben und von HARTMANN/JAHN (1967) im *Luzulo-Quercio-Fagetum* zusammengefaßt wurden.

Die geringste Flächenausdehnung hat die Typische Subassoziation. Diese Wälder stocken auf Hangkanten, Hangrücken und an anderen relativ trockenen Standorten. In der Bodenvegetation ist neben *Avenella flexuosa* und *Vaccinium myrtillus* vor allem *Luzula silvatica* typisch. Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen von *Pirola rotundifolia*.

Den größten Flächenanteil nimmt der an Farnen reiche Eichen/Buchenwald (*Luzulo-Quercio-Fagetum dryopteridetosum*) ein, der in verschiedenen Ausbildungen angetroffen wurde.

Auf diluvialen Schuttdecken, hauptsächlich im Westen der Bückeberge vorkommend und am Nordrand des Reinser Revieres ausklingend, tritt die Heidelbeer-Ausbildung auf, zudem durch das reichliche Vorkommen von *Lonicera periclymenum* ausgezeichnet ist. Aktuell hat *Ilex aquifolium* in diesen Wäldern den Vorkommensschwerpunkt. Die Waldgesellschaft findet sich i.d.R. in süd-exponierten, schwach bis stark geneigten Mittel- bis Unterhanglagen. Beherrscht wird die Bodenvegetation von *Dryopteris austriaca* ssp. *dilatata* und *Athyrium filix-femina*, wobei ersterer allgemein überwiegt. Die Verdichtungsanzeiger *Deschampsia caespitosa* und *Carex remota* sind seltener und nicht optimal entwickelt. Die relative Trockenheit resp. die lokalklimatische Wärmebegünstigung dieser Standorte kommt in der Bodenvegetation durch *Avenella flexuosa*, *Majanthemum bifolium* und durch die hier vitale *Lonicera periclymenum* zum Ausdruck. In der Baumschicht ist die z.T. sehr häufige *Quercus petraea* gegenüber der Buche gleich- bis mitwüchsig.

An den auslaufenden Mittelhängen sowie in Unterhanglagen erscheint die Typische Ausbildung. Sie weist in der Baumartenkombination überwiegend *Quercus robur* auf. In der Bodenvegetation treten *Avenella flexuosa*, *Majanthemum bifolium* und auch *Lonicera* zurück. Dafür nimmt *Deschampsia caespitosa* deutlich zu. Zudem erscheinen in dieser Waldgesellschaft die Herden des Eichenfarnes. Bezeichnend ist ferner das Eindringen anspruchsvollerer Arten wie *Milium effusum*, *Epilobium montanum* und *Dryopteris filix-mas*. Allerdings werden die Arten sehr stark vom Wild verbissen, so daß über ihre potentielle Vitalität in diesen Wäldern keine Aussage möglich ist.

Mit Schwerpunkt im Osten der Bückeberge kommt die Waldschwingel-Ausbildung vor. Im Westen fehlt den relativ kleinflächigen Vorkommen aktuell *Festuca*

Tab. 2. Zwitsinsens - Eichen / Buchenwälder  
Quercus - Quercus-Fagetum

Art. Nr.	Typischer Zwitsinsens-Eichen / Buchenwald		Baumschichten - Eichen / Buchenwald		Farnreicher Eichen / Buchenwald		Feldbeeren - Ausbildung		Eypische Ausbildung		Waldschwingel - Ausbildung		Pädagog. Eichen / Buchenwald																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz	Luxulo - Quercus-Fagetum	Eschschampferleibholz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000





*altissima*: Die über Wealdenschiefer und Serpulit lagernde Deckschicht besteht i.d.R. aus Löß. Gebietsweise steht der Serpulit auch oberflächen-nah an. Die Gesellschaft ist auf mehr oder weniger geneigten, z.T. auch ebenen auslaufenden Unterhängen entwickelt. Neben *Festuca altissima* treten *Deschampsia caespitosa*, *Carex remota* und *Juncus effusus* reichlich auf. *Vaccinium myrtillus* kommt kaum noch vor. Mesotraphente Arten wie *Milium effusum*, *Epilobium montanum* und *Carex silvatica* sind überall zu finden. Im Gegensatz zur *Vaccinium*-Ausbildung überwiegt in dieser Gesellschaft der Frauenfarn gegenüber dem Dornfarn. Regelmäßig sind die ausgedehnten Herden des Eichenfarnes vorhanden.

Die Typische Variante wird an Einhängen und in Schluchten auf Serpulit von der Wurmfarne-Variante abgelöst. Bezeichnend für die optimale Bodenfeuchtigkeit sind *Impatiens noli-tangere*, *Circaea lutetiana*, *Veronica montana* etc. I.d.R. handelt es sich um Flächen im Kontaktbereich zum *Melico-Fagetum*.

In Mischung mit den Flächen der Farn-Subassoziation, teilweise aber auch auf ausgedehnteren, ebenen Flächen entwickelt, findet sich auf tonreichen Böden die *Deschampsia caespitosa*-Subassoziation. Wir können hier eine Typische und eine östliche *Festuca altissima*-Ausbildung unterscheiden, die in der Tabelle zusammengefaßt wurden. Die Farne *Dryopteris austriaca* ssp. *dilatata* und *Athyrium filix-femina* sind auch hier stets vorhanden, erreichen aber in der Vitalität und Flächendeckung nicht die Werte des Farn-Eichen/Buchenwaldes. Auffällig ist ferner in der Typischen Ausbildung das gegenüber der Farn-Subassoziation deutliche Zurücktreten von *Vaccinium myrtillus*.

Infolge des Tonreichtums und der i.d.R. vorkommenden Zweischichtigkeit der Böden mit StauhORIZONT über dem eigentlichen Grundgestein ist der Bodenwasserhaushalt unausgeglichen. Darauf deuten u.a. die starken Schleimflussschäden der Buche. Ferner zeigt die Fichte ein weniger gutes Wachstum. Gerade in dieser Waldgesellschaft kommt der Eiche als wurzelintensiver Baumart eine erhebliche Bedeutung zu. Sie muß daher in einem ausreichenden Anteil am Bestandesaufbau erhalten bleiben bzw. bei der Bestandesbegründung neu eingebracht werden.

Überwiegend über Serpulit mit schwachen Deckschichten wie auch im Ausschwemmungsbereich dieses Gesteines in ebenen bis stark geneigten Lagen wurde die *Melica uniflora*-Subassoziation angetroffen. In der Baumschicht sind den Hauptarten Buche und Eiche vereinzelt *Carpinus betulus* und *Acer pseudoplatanus* beigemischt. Die stärksten Fichten und Lärchen stehen in dieser Waldgesellschaft. In einem Bestand hat sogar eine Weißtanne der Buche getrotzt. Die bezeichnende Artengruppe der Bodenvegetation besteht aus *Milium effusum*, *Melica uniflora*, *Carex silvatica*, *Brachypodium silvaticum* und *Veronica montana*. Unter den Farnen herrscht *Athyrium filix-femina* eindeutig.

Es ergeben sich deutliche Anklänge an das *Melico-Fagetum*. Da aber die gesamte Artenkombination des *Luzulo-Quercus-Fagetum* vorhanden ist und ferner wesentliche Elemente der reicheren Buchenmischwälder noch fehlen, wurde die Gesellschaft dem *Luzulo-Quercus-Fagetum* zugeordnet. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß es sich um ein im Gefolge früherer Waldmißhandlungen degradiertes *Melico-Fagetum* handelt.

In diesen Wäldern entwickelt sich bei Auflichtung bzw. reichlicherem Eichenanteil eine z.T. optimale Adlerfarn-Facies, die im gesamten Artenbestand deutlich verarmt ist. Sowohl die Lokalität der Flächen im Gesamtrahmen wie auch das Vorhandensein der mesotraphenten Arten zeigen eindeutig, daß diese Facies zur *Melica*-Subassoziation gehört.

#### Der Waldschwingel-Buchenwald *Festuco altissimae-Fagetum* Grüneberg/Schlüter 1957; Samek 1961 (Tabelle 3; Übersichtstabelle Sp. 7)

Im Osten der Bückeberge kommt auf mehr oder weniger gründigen Lößdecken eine Waldgesellschaft vor, in der die azidophilen Arten fast ganz fehlen. Insbesondere ist die Hainsimse kaum zu finden. Stets vorhandene Arten sind *Festuca altissima*, *Dryopteris austriaca* in beiden Subspecies, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa* und *Milium effusum*. Weiter wurden *Polygonatum multiflorum*, *Lamium galeobdolon*, *Elymus europaeus* u.a. gefunden. Das reichliche Vorkommen von *Luzula pilosa* und *Majanthemum bifolium* sowie das Fehlen einer ganzen Reihe von für das *Melico-Fagetum* typischen anspruchsvollen Arten weisen auf den intermediären Charakter dieser Waldgesellschaft hin, wie er von ELLENBERG (1978), HARTMANN/JAHN (1967) u.a. betont wird.

HARTMANN/JAHN (1967) ordneten diese Gesellschaft dem *Dentario-Fagetum* zu, obwohl die Artenkombination mit anspruchsvollen Arten nur bei den an Waldschwingel reichen Buchenwäldern auf Jura- und Keuper-Gesteinen im Weser-Bergland vorkam. Alle weiteren, von den genannten Autoren zusammengestellten Tabellen wie auch sonstige Hinweise lassen den Schluß zu, daß es sich offenbar um eine eigene Assoziation der ozeanisch getönten, submontanen Gebirgslagen handelt.

In den vorgefundenen, oft sehr dichten Beständen baut sich die Bodenvegetation erst auf. Zudem weist die Krautflora außerordentlich starke Verbiß-

Tab. 3 Waldschwingel - Buchenwald  
Festuco altissimae - Fagetum

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Exposition	SW	SW	S	.	.	NO	S	SO	
Inklination	5	10	10	.	.	15	15	15	
Neigung	S <sub>1</sub>	100	100	100	100	100	100	100	
	S <sub>2</sub>	5	20	.	.	30	.	30	15
	S	.	40	.	.	10	20	1	5
	K	10	10	10	10	10	10	10	10
<u>Fagetalia - Arten:</u>									
<i>Festuca altissima</i>	2,3	3,4	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>Fagus sylvatica</i>	S	5,5	5,5	3,1	5,5	5,5	5,5	1,1	.
	K	.	1,1	1,1	3,1	.	.	3,1	1,1
	S	.	2,3	.	2,1	+1	.	.	1,1
	K	2,1	1,1	+1	1,1	2,1	2,0	+1	+1
<i>Millium effusum</i>		1,2	1,2	.	2,0	+1	2,3	2,1	+1
<i>Acer pseudoplatanus</i>	S	.	.	+1	.	1,3	.	.	1,1
	K	.	.	.	.	1,1	1,1	.	1,2
<i>Rhynchospora multiflora</i>		.	.	+1	1,2	.	.	.	+1
<i>Citrea luteoharad (D)</i>		1,2	.	+1	.	.	.	.	1,1
<i>Dryopteris filix-mas</i>		.	.	+1	.	.	.	.	1,2
<i>Adiantum philix-foliosa</i>		3,3	+1,2	.	.	.	.	.	1,2
<i>Mesophila tinctoria</i>		.	.	+1	.	.	.	.	.
<i>Carex silvatica</i>		.	.	.	.	+1	1,2	.	.
<i>Carpinus betulus</i>	S	.	.	.	.	3,1	.	.	2,1
	K	.	.	.	.	+1	.	.	+1
<i>Elymus europaeus</i>		.	.	.	.	+1,2	.	.	+1,2
<i>Catharinea lundata</i>		.	.	.	.	1,2	.	.	1,2
<u>Arten staufeuchter Standorte:</u>									
<i>Deschampsia caespitosa</i>	1,2	1,2	+1	1,1	.	1,2	1,2	1,1	1,2
<i>Carex remota</i>	.	1,2	.	.	1,1	1,1	1,2	3,1	1,2
<i>Juncus effusus</i>	.	.	.	.	.	+1	1,2	+1	.
<u>Differentialarten farnreicher Waldgesellschaften:</u>									
<i>Rhynchospora filix-femina</i>	1,1	1,1	+1	1,1	.	1,1	+1	1,1	2,1
<i>Dryopteris aust. esp. dilatata</i>	.	1,2	1,1	.	1,3	1,1	2,3	.	2,1
<u>Differentialart ozeanischer Wälder:</u>									
<i>Ilex aquifolium</i>	S	.	.	.	.	.	.	.	.
	K	.	.	+1,2	.	+1	.	.	1,2
<u>Fago-Quercetum - Arten:</u>									
<i>Ilex nemoralis</i>	.	.	+1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	.
<i>Quercus petraea</i>	S	.	3,2	1,1	.	.	.	.	.
	K	.	.	+1	.	.	.	.	.
<i>Hedera helix</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Convallaria majalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anemone nemorosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trifolium excelsior</i>	S	.	.	.	.	.	.	.	2,1
	K	.	.	.	.	.	.	.	1,1
<i>Quercus robur</i>	S	.	.	.	.	.	.	.	4,4
	K	.	.	.	.	.	.	.	4,4
<u>Begleiter:</u>									
<i>Oxalis acetosella</i>	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	1,2
<i>Rubus idaeus</i>	+1	+1	1,1	.	1,1	2,2	2,1	1,1	1,1
<i>Rubus fruticosus coll.</i>	+1	1,2	1,1	.	3,2	2,1	2,2	1,3	1,2
<i>Asarum vulgare</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2
<i>Myanthes biflora</i>	.	1,1	1,1	.	1,1	.	.	.	1,1
<i>Sorbus aucuparia</i>	S	.	.	.	.	.	.	.	1,1
	K	.	.	.	.	.	.	.	1,1
<i>Dryopteris aust. esp. spinul.</i>	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ajacis tenuis</i>	.	.	.	.	.	1,2	1,2	.	.
<i>Taraxacum parviflorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	3,2
<i>Polypodium formosum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2
<i>Phium hotunum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2
<i>Rhamnus frangula</i>	K	.	.	.	.	.	.	.	1,1
<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1
<u>Weitere Arten:</u>									
Nr. 1	<i>Pteris aquilina</i>	+1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 2	<i>Adiantum emarginatum</i>	+1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 3	<i>Quercus petraea</i>	S	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 4	<i>Picea abies</i>	S	1,1	.	.	.	.	.	.
Nr. 5	<i>Sambucus nigra</i>	S	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 6	<i>Berberis vulgaris</i>	S	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 7	<i>Larix europaea</i>	S	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 8	<i>Sambucus nigra</i>	R	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 9	<i>Quercus borealis</i>	2,1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 10	<i>Epilobium angustifolium</i>	+1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 11	<i>Asarum vulgare</i>	1,1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 12	<i>Phium hotunum</i>	1,1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 13	<i>Strophalaria nodosa</i>	+1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 14	<i>Holcus lanatus</i>	1,2	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 15	<i>Nerium sp.</i>	1,1	.	.	.	.	.	.	.
Nr. 16	<i>Thurnum quilid</i>	R	+1	.	.	.	.	.	.
Nr. 17	<i>Ajacis tenuis</i>	1,2	.	.	.	.	.	.	.

schäden auf, die insbesondere *Polygonatum multiflorum*, *Dryopteris filix-mas*, *Carex silvatica* u.a. betreffen. Immerhin kann auf Grund des Aufnahmемaterials das Vorkommen einer Typischen, einer Subassoziatiоn mit *Carex remota* und einer Farn-Subassoziatiоn angenommen werden. Die Buche erreicht im *Festuco-Fagetum* die besten Wuchsleistungen. Hainbuche und Bergahorn sind häufig zu finden. Die Eichen vermögen sich nur auf Kuppen- und windexponierten Kammlagen gegenüber der Buche zu behaupten, obwohl auch sie in diesen Wäldern Spitzenleistungen erbringen.

#### Fichten- und Eichen-Forste (Tabellen 4 und 5)

Wie bereits erwähnt, ist der überwiegende Flächenanteil der Hochlagen in Fichtenforste umgewandelt. Diese Umwandlungsbestände greifen heute weit in die submontane Stufe über. Hier wurden allerdings keine Flächen aufgenommen, da sich keine gegatterten Flächen fanden und die Bodenvegetation keine signifikanten Unterschiede gegenüber den Fichtenforsten der Hochlagen aufwies.

Die Entwicklung der Bodenvegetation in den Fichtenforsten war bisher durch die mehr oder weniger dichten Decken von *Avenella flexuosa* gekennzeichnet, an die sich zum Bestandesinnern hin eine an *Trientalis* reiche Zone anschloß. In staufeuchten Lagen entwickelten sich ausgedehnte Adlerfarn-Flächen, in denen allenfalls noch *Molinia* reichlicher zu finden war.

Bestandesauflichtung und Gatterung zeigten nun, daß diese einseitigen Vegetationsdecken mehr oder weniger eine Folge z.T. extremen Wildverbisses sind. In nachträglich gegatterten, älteren Verlichtungsflächen (Nr. 1, 2 u. 5, Tab. 4) findet man die Reste ehemaliger *Avenella*-Decken, die numehr von *Epilobium angustifolium*, insbesondere aber von *Dryopteris austriaca* ssp. *dilatata* durchwachsen und zurückgedrängt werden.

Die aus der Tabelle hervorgehende Artenzusammensetzung wurde auch nicht durch Düngung bewirkt. Lediglich bei Fläche Nr. 3 handelt es sich um eine alte Kalkungsfläche aus den 50er Jahren.

Für die Bückeberge reduzieren sich die Differenzen in der Bodenvegetation zwischen den bodensauren Buchenwäldern und den Fichtenforsten auf die höhere Konstanz und die größere Flächendeckung des Siebensternes in den Fichtenforsten sowie eine reichlichere Präsenz von *Oxalis*, *Galium harcyenicum* und der Moos-Arten.

Viel prägnanter sind die Unterschiede zwischen den Eichenforsten und den naturnahen Buchenmischwäldern. Dies ist zweifellos eine Folge des stärkeren Lichteinfalles in den Eichenforsten. Beherrscht wird die Bodenvegetation von *Vaccinium myrtillus*, *Lonicera periclymenum* und partiell auch von *Rubus fruticosus* coll. Weiterhin fehlen den submontanen Wäldern i.d.R. *Trientalis europaea* und *Galium harcyenicum*. Dazu rechnen auch die typischen Arten des *Fago-Quercetum* wie *Teucrium scorodonia*, *Melampyrum pratense* und *Holcus mollis*. Sie wären, gäbe es in den Bückebergen keine Eichenforsten, auf Saum- und Randstandorte beschränkt.

Im übrigen konnte auch hier beobachtet werden, daß infolge starken Wildverbisses die Zwergsträucher zunehmend zurückgehen und von *Avenella* bzw. dem Adlerfarn abgelöst werden.

#### Artenreiche Waldgesellschaften

Über Münder Mergel und an den auslaufenden Unterhängen sowie in breiteren Bachtälern über bzw. im Einflußgebiet der Mergel des Serpulits stehen Waldgesellschaften, die durch ihren floristischen Aspekt innerhalb der sonst relativ artenarmen Waldgesellschaften sofort auffallen. Bei Austritt des kalkreichen Wassers an die Oberfläche kommt es u.a. zu Kalktuff-Bildungen, die ausgedehnte Flächen im Naturschutzgebiet Teufelsbad bei Bad Eilsen einnehmen, sich punktuell aber auch andernorts in den Bückebergen finden.

Es konnten drei Waldgesellschaften ausgeschieden werden, die in vielen Bereichen in mehr oder weniger engem Kontakt stehen. Im oberen Bereich der Bachläufe geht das dort entwickelte *Carici remotae-Fraxinetum* in das *Melico-Fagetum* über. Mit Verbreiterung des Tales schiebt sich das *Stellario-Carpinetum* zwischen die beiden Gesellschaften. Auf Rückstauplätzen in flachen Geländemulden stockt ebenfalls das *Carici remotae-Fraxinetum*, welches hier über ein z.T. nur sehr schmales Band des *Melico-Fagetum* in das *Luzulo-Quercu-Fagetum melicetosum uniflorae* übergeht.

Größere Flächen nehmen die artenreichen Wälder nur dort ein, wo der Münders Mergel die Ausgangsbasis der Bodenbildung ist. Hier wurde ein *Stellario-Carpinetum* angetroffen.

Gerade im frischen bis feuchten Bereich dokumentiert sich der forstliche Einfluß in der Baumartenstruktur. Die Schwarzpappel-Aufforstungen, Rot-erlen- und Eschenforste sind ebensowenig naturnah wie Buchenreinbestände

**Tabelle 4 Fichtenforste im Bereich des Luzulo-Fagetum**

Nr. 1-7 Farnreicher Farnsamen-Buchenwald  
Nr. 8-10 Farnreicher Farnsamen-Buchenwald

H. Baumarten:	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Picea abies</i>	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5
<i>Sorbus aucuparia</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Betula verrucosa</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Salix europaea</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Fagus sylvatica</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**S. Straucharten:**

<i>Rubus idaeus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rubus fruticosus</i>	coll	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhamnus frangula</i>	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Ilex aquifolium</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**C. Bodenvegetation:**

Typische Arten der Fichtenforste:

<i>Dryopteris aust. sp. dilatata</i>	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
<i>Pteris caudata</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Trientalis europaea</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Vaccinium myrtillus</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Galium saxatile</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Polytrichum formosum</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Phlogothecium undulatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhynchospora alba</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Leucobryum glaucum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Laubwald- und Differenzialarten:

<i>Luzula luzuloides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Carex pilulifera</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Agrostis tenuis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Sonstige Arten:

<i>Oxalis acetosella</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Epilobium angustifolium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mitrium hortum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranella heteromalla</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Holcus mollis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dicranum scoparium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Digitaria purpurea</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Weiter kamen vor:  
Nr. 1 *Galium vulgare* +, *Anthoxanthum odoratum* +;  
Nr. 2 *Calamagrostis epineps* +; Nr. 4 *Populus tremula* S.; Nr. 5 *Comarostaphylis racemosa* +, *Salix caprea* +, *Pinus strobus* K.; Nr. 7 *Teucrium stolonatum* +; Nr. 9 *Calamagrostis epineps* +;  
Nr. 10 *Urtica dioica* +, *Calamagrostis epineps* +.

**Tab. 5 Eichenforste**

Nr. 1-3 Luzulo-Fagetum, Farnsabb.

Nr. 4-6 Luzulo-Quercu-Fagetum *typicum*  
*dryopteridetosum*  
*mollet uniflorae*

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Exposition:</b>	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
<b>Höhe in m:</b>	50	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
<b>Deckung</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Deckung</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Deckung</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Deckung</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Quercetalia roboris-petraeae-Arten:

<i>Lonicera periclymenum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pteris aquilina</i>	3	2	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Molinia caerulea</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Melampyrum vulgatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Teucrium scordianum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Holcus mollis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Geographische Differenzialarten spanischer Gebiete:

<i>Galium hircynicum</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Ilex aquifolium</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Fagetalia-Arten:

<i>Luzula luzuloides</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Fagus sylvatica</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Galium saxatile</i>	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Carpinus betulus</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Festuca altissima</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Milium effusum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Festuca ovina</i> (2)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Veronica montana</i> (2)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Dryopteris filix-mas</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Vaccinio-Piceetea-Arten:

<i>Vaccinium myrtillus</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Picea abies</i>	5	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trientalis europaea</i>	1	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Quercu-Fagetum-Arten:

<i>Quercus petraea</i>	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Quercus robur</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Begleitler und Differenzialarten:

<i>Dryopteris austriaca</i>	1	2	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Epilobium angustifolium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Oxalis acetosella</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Avenella flexuosa</i>	1	1	2	1	3	2	1	3	1	4	2	2	2	3	1	2	2	1
<i>Sorbus aucuparia</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Agrostis tenuis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rubus fruticosus</i>	coll	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rubus idaeus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhamnus frangula</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Carex pilulifera</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Luzula pilosa</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Jeschampsis cespitosa</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Polytrichum formosum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Myosoton biflorum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhynchospora alba</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Digitaria purpurea</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Salix europaea</i>	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Weitere Arten: Nr. 2 *Luzula sylvatica* +; *Dicranum scoparium* +; *Betula verrucosa* B +; Nr. 6 *Moenningia trinervia* +; Nr. 8 *Leucobryum glaucum* +; Nr. 10 *Holcus lanatus* +; Nr. 11 *Asteriscium lachenalis* +; Nr. 12 *Carex remota* +; *Galopis tetanoides* +; *Calamagrostis epineps* +; *Rumex acet.* +; Nr. 13 *Pinus silvestris* B +; *Moenningia trinervia* +; Nr. 14 *Caltha arvensis* +; *Vicia sylvatica* +; *Quercus robur* +; *Hypericum pulchrum* +; *Crataegus oxyac.* K +; Nr. 17 *Crataegus oxyac.* K +; *Calamagrostis epineps* +; Nr. 18 *Agrostis Holmiana* +

Tabelle 6

	<u>Carici remotae-Flaxinetum</u> Buchenwald.									<u>Stellario-Carpinetum</u> Stammereen - Buchenwald									<u>Melico - Fagetum</u> Perryras - Buchenwald.																							
	Carici remotae - Flaxinetum Caricetum peniculae Ausbildung nach Eichenform mit									Stellaria-Carpinetum Filipendula bosum			Stellario-Carpinetum Cirsium			Stellario-Carpinetum Cirsium Käbberling-Ausb.			Melico-Fagetum Impatiens			Melico-Fagetum Typicum Deschampsia-Ausb.			Farn-Buchenwald																	
	typische Variante	Buchenform Variante								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Nummer d. Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Exposition	S	SW	SW	S	N	S	N	S	SW	SW	SW	N	S	N	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W	S	W	W			
Inklination °	5	5	10	2	2	2	15	5	10	2	1	2	5	5	5	2	3	5	5	5	5	2	2	5	10	2	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5
Höhe üB. NN	140	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Deckung	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1	10	15	40	30	20	5	1	20	30	30	40	60	50	50	40	60	50	5	1	1	30	40	40	30	40	40	30	40	40	30	40	40	30	40	40	30	40	40	30	40	40
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<u>Differentialarten</u>																																										
<u>Käbberlingarten:</u>																																										
<i>Circea lutetiana</i>	33	24	11	22	11	11	11	11	11	22	32	11	11	24	22	11	12	11	11	21	11	11	21	11	11	21	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Athyrium filix-femina</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Stachys silvatica</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Urtica dioica</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Carex remota</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Deschampsia cespitosa</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Impatiens noli-tangere</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Glyphoma hederifolia</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Ranunculus ficaria</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Trifolium pratense</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Rubus lasiocarpus</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Hepopodium podagraria</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Stemmachia nemorum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Veronica montana</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<u>Arten feuchter bis nasser Standorte:</u>																																										
<i>Alnus glutinosa</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Equisetum maximum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Carex penicula</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Eupatorium cannabinum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Cynpis paludosa</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Filipendula ulmaria</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Ribes rubrum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Equisetum silvaticum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Scutellaria galericulata</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Valeriana dioica</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Cymmachia nummularia</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Cynopogonium alternifolium</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Valeriana officinalis</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<i>Scleraria nemorum</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<u>Keim- und Differentialarten des Carpinus-Verbandes:</u>																																										
<i>Carpinus betulus</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11																							



Übersichtstabelle

	Stellano-Carpinetum		Melico-Fagetum			Festuco-olietum-Fagetum				Luzulo-Quercus-Fagetum			Luzulo-Fagetum
	Alpi-remota-Frausietum	Alpendulcium (arvensium)	Citreaetum	Ungaricum	Cypelicum	Alpinum	malicetum uniflorum	dryopteridetum		diachrymibetum casp.	lypticum		
Zahl der Aufnahmen	9	6	5	5	7	5	7	12	8	9	9	7	16
<u>Arten betoni frischer bis feuchter Waldbesellschaften.</u>													
<i>Deschampsia caespitosa</i>	V2	V4	V4	V4	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Carex demissa</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Juncus effusus</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Polygonum filix-femina</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Polypodium noli-tangere</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Cibaea lutehana</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Festuca gigantea</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Stachys silvatica</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Urtica dioica</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Glechoma hederacea</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Veronica montana</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Sanunculus ficaria</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Polypodium podagraria</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Rudus catesii</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Crossospondium alternifolium</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Aster theophrasti</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>Arten feuchter bis nasser Standorte</u>													
<i>Alnus glutinosa</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Eupatorium cannabinum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Epilobium maximum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Carex pendula</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Sparganium silvaticum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Utricularia ulmaria</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Crepis paludosa</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Valeriana dioeca</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Lysimachia nummularia</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>Differenzialarten reicher Wäldes</u>													
<i>Primula elatior</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Anem maculatum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Adoxa moschatellina</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Panic quadrifolia</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>Carpinien-Verbandsarten:</u>													
<i>Carpinus betulus</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Stellaria holostea</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Querc urbanum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Sanunculus auricomus</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Campanula trachelium</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Vicia sepium</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>Fagion-Verbandsarten:</u>													
<i>Acer pseudo-platanus</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Mercurialis perennis</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Senecio fuchsii</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Aletris spicata</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Flymus europaeus</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Luzula luzuloides</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Festuca altissima</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>Fagetalia-Arten:</u>													
<u>a) Anspruchsvalle Arten:</u>													
<i>Carex silvatica</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Dryopteris filix-mas</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Orthocypodium silvaticum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Lamium galicobolium</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Galium odoratum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Urtica reichenbachiana</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Polypodium multiflorum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Schizocaula europaea</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<u>b) Sonstige Arten:</u>													
<i>Fagus sylvatica</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Milium effusum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Melica uniflora</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
<i>Epilobium montanum</i>	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2



<u>Fago-Quercetea-Arten:</u>											
<i>Faxinus excelsior</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Quercus petraea</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Q. robur</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Q. robur</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Scrophularia nodosa</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Hydra helix</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Primula nemorosa</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Convallaria majalis</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<u>Arten suboceanisch-oceanischer Wälder:</u>											
<i>Conicera periclymenum</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Pteris aquilina</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Pteris aquilina</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Galium hibernicum</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<u>Vaccinio-Piceetea-Arten:</u>											
<i>Vaccinium myrtillus</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Picea abies</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Prunella europaea</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<u>Charakteristische Arten bodensaurer Wälder:</u>											
<i>Luzula pilosa</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Polytrichum formosum</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Carex pilulifera</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Hieracium tenuis</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Allium hornum</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Primula flavescens</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Luzula silvatica</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Matricaria bifida</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<u>Sonstige Arten:</u>											
<i>Oxalis acetosella</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Dryopteris aust. ssp. dilatata</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Rubus idaeus</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Rubus fruticosus col.</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj
<i>Dryopteris aust. ssp. spinulosa</i>	8	IIa	IIb	IIc	IIId	IIe	IIIf	IIg	IIh	IIi	IIj

gehört in diese Gesellschaft. Besonders auffällig sind in einigen Flächen reichliche Vorkommen von *Listera ovata*.

An den Berghängen wurde auf quellnassen Fläche eine Variante angetroffen, die offenbar zeitweise eine trockener Phase durchläuft. Darauf deutet die optimale Entwicklung von *Brachypodium silvaticum* sowie das stete Vorhandensein von *Lamium galeobdolon*, *Deschampsia caespitosa* und die sehr üppige Ausformung von *Dryopteris austriaca* ssp. *dilatata* hin. Die besonders kennzeichnenden Arten sind *Mercurialis perennis*, *Dryopteris phegopteris* und *Equisetum silvaticum*. Der Buchenfarn wurde im gesamten Waldgebiet nur hier gefunden.

**Artenreiche Eichen-Mischwälder**  
*Stellario-Carpinetum* Oberdorfer 1957  
 (Tabelle 6; Übersichtstabelle Sp. 2-3)

In breiteren Bachtälern fand sich im Kontakt mit dem Bach-Eschenwald eine Waldgesellschaft, die zwar optimal mit Wasser versorgt ist, der aber die für den Bach-Eschenwald typische Vernässung fehlt. Sie tritt nur in Zeiten reichlichen Wasserabflusses auf.

Die Baumschicht ist stark abgewandelt. Es fanden sich Pappel-, Roterlen- und Eschen-Forsten. Ursache dafür ist zweifellos das Bestreben, den sogenannten Edellaubhölzern einen gewissen Flächenanteil zu sichern. Die Strauchschicht wie auch die Krautschicht sind optimal entwickelt. Gegenüber dem Bach-Eschenwald beobachtet man in der Bodenvegetation einen Rückgang der hygrophilen Arten. So treten nunmehr *Dryopteris filix-mas*, *Sanicula europaea*, *Arum maculatum*, *Paris quadrifolia*, *Brachypodium silvaticum* u.a. im Aspekt deutlich hervor. Dies gilt besonders für *Aegopodium podagraria*. Hinzu kommen *Geum urbanum*, *Stellaria holostea* sowie in geringerem Maße *Allium ursinum*, *Orchis maculata* und *Listera ovata*. Auffälligerweise fehlt allen Vorkommen *Pulmonaria obscura*, die in anderen Gebieten ein stetes Glied solcher Wälder ist. Die Gesellschaft gehört dem *Stellario-Carpinetum* an. Dabei kann eine bachnahe Subassoziation *filipenduletosum* und die grundwasserfernere, reiche Subassoziation *aretosum* unterschieden werden.

Auf dem im Reinsler Revier austretenden Münder Mergel stehen aktuell Buchenforste, in denen die Eiche, soweit noch vorhanden, gleich- bis mitwüchsig

ist. Die tonreichen Böden sind wechselfeucht. Der unausgeglichene Wasserhaushalt dokumentiert sich in der bereits erwähnten Instabilität der Buchen-Reinbestände. Neben der typischen Ausbildung wurde in flachen Geländemulden sowie längs flacher Rinnsale die feuchtere *Equisetum silvaticum*-Ausbildung gefunden.

In der Bodenvegetation fehlen die ausgeprägter hygrophilen Arten fast ganz. Auf Grund des gesamten Artenbestandes könnte diese Waldgesellschaft auch dem *Melico-Fagetum* zugeordnet werden. Das Vorkommen von *Stellaria holostea*, *Vicia sepium* und *Ranunculus auricomus* in Verbindung mit dem Standort weist aber darauf hin, daß es sich hier um einen Eichen-Mischwald handelt, der im Grenzbereich zum Buchenmischwald steht. Die forstlich einseitige Favorisierung der Buche bewirkte, wie es für solche Grenzlagen typisch ist, eine Verschiebung in der Artenkombination zugunsten des Buchenwald-Charakters. Insgesamt entspricht die Artenkombination dem *Stellarario-Carpinetum circaeetosum*, wie es auch in einer *Elymus*- und Farn-Ausbildung über Liastonen und Mürder Mergel im Kleinen Deister (FÖRSTER 1975a) angetroffen wurde.

#### Der Perlgras-Buchenwald

*Melico-Fagetum* Knapp 1942

(Tabelle 6; Übersichtstabelle Sp. 4-6)

Auf den Mergeln des Serpultit, die z.T. von schwächeren Lößdecken überlagert sind, sowie im Standortsbereich, der durch aus dem Serpultit ausfließendes Hangwasser beeinflusst wird, stockt der Perlgras-Buchenwald. Er besitzt innerhalb der Gruppe der reichen Waldgesellschaften die größte Flächenausdehnung.

Die Baumarten-Zusammensetzung ist stark forstlich beeinflusst. Es fanden sich neben Buchenwäldern auch Eschenforste. Weitere Baumarten sind Hainbuche und Bergahorn.

Es können drei Subassoziationen ausgeschieden werden. An Unterhängen und in breiteren, wasserzügigen Schluchten steht der frische bis feuchte Springkraut-Buchenwald. Im Aspekt fällt er neben dem reichlichen Vorkommen des Springkrautes vor allem durch die ausgedehnten Herden von *Mercurialis perennis* auf. Die Gesellschaft steht z.T. im unmittelbaren Kontakt mit dem an stark geneigten bis steilen Hängen in geschützter Lage ausgebildeten farnreichen Perlgras-Buchenwald. In diesem beherrschten *Athyrium filix-femina* und *Dryopteris filix-mas* die Bodenvegetation. Der hierzu gestellte Eichenforst ist mit *Brachypodium silvaticum* vergrast.

Die größten Flächen nimmt die Typische Subassoziation ein, die in den Bückebergen als bezeichnende Art *Deschampsia caespitosa* besitzt. Die Wälder stocken in ebener Lage sowie in Hanglagen mit schwacher bis mäßiger Neigung. In der Baumschicht hat sich in einigen Beständen die Traubeneiche halten können. Für die Bodenvegetation sind keine Besonderheiten zu vermerken, ausgenommen die Tatsache, daß im Westbereich der Bückeberge in dieser Gesellschaft punktuelle Wiederansiedlungen von *Festuca altissima* festgestellt wurden.

Die auf den Standorten des Perlgras-Buchenwaldes stockenden Buchenbestände haben eine sehr gute Wuchsleistung. Schleimflußschäden und Windwurf kommen im Gegensatz zu den Buchenforsten im *Stellarario-Carpinetum circaeetosum* praktisch nicht vor.

#### SCHRIFTEN

DIERSCHKE, H., HÜLBUSCH, K.H., TÜXEN, R. (1973): Eschen-Erlen-Quellwälder am Südwestrand der Bückeberge bei Bad Eilsen. - Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 15/16: 153-164.

Todenmann/Göttingen.

ELLENBERG, H. (1963): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 1. Aufl. Ulmer, Stuttgart.

- (1978) wie vor. 2. Aufl.

FÖRSTER, M. (1975a): Vegetationskundliche Beobachtungen in Eichen- und Buchenmischwäldern im Bereich des Staatl. Forstamtes Saupark bei Springe. - Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 18: 219-237. Todenmann/Göttingen.

- (1975b): Auswirkungen eines überhöhten Wildbestandes auf die Vegetation, dargestellt am Beispiel des Forstamtes Saupark. - Allgem. Forstzeitschr. 30(15): 317-320. München.

- GERLACH, A., KRAUSE, A., MEISEL, K., SPEIDEL, B., TRAUTMANN, W. (1970): Vegetationsuntersuchungen im Solling. - Schriftenr. f. Vegetationskd. 5: 75-133. Bonn/Bad Godesberg.
- HARTMANN, F.K. (1974): Mitteleuropäische Wälder. - Fischer, Stuttgart.
- , JAHN, G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. (Tabellen und Texte). Fischer, Stuttgart.
- JAHN, G. (1972): Forstliche Wuchsraumgliederung und waldbauliche Rahmenplanung in der Nord-eifel. - Dissert. Bot. 16. Cramer, Lehre.
- (1979): Zur Frage der Buche im nordwestdeutschen Flachland. - Forstarchiv 50(5): 85-95. Hannover.
- Forsteinrichtungswerk des Staatl. Forstamtes Obernkirchen von 1970, erstellt durch FOR Meyer.

Anschrift des Verfassers:

Forstoberrat Dr. Manfred Förster  
Hauptstr. 35 (Klosterforstamt)  
D-3015 Wennigsen 1

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Tuexenia - Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [NS\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Förster Manfred

Artikel/Article: [Waldgesellschaften der Bückeberge 213-231](#)