

MAGYAR BOTANIKAI LAPOK.

(UNGARISCHE BOTANISCHE BLÄTTER.)

Kiadja és szerkeszti: — Herausgeber u. Redakteur:

Dr. DEGEN ÁRPÁD.

Főmunkatársak: — Hauptmitarbeiter:

Dr. GYÖRFFY ISTVÁN — Dr. LENGYEL GÉZA.

Bizományban: — In Commission:

Németországban: — Für Deutschland: Bei Max Weg-nél Leipzig, Königsstrasse Nr. 3.

XIX. kötet 1920. évfolyam. BUDAPEST. N^o: 1—12. sz.
Band 1920. Jahrgang.

Lunaria Telekiana Jáv. n. spec.

Irta: | S. Jávorka (Budapest).
Von: |

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Multiennis, radice saepe crassa, ramosa, ramis radicis saepe *napuligeris*. Caulis ca. 5 dm. altus, sicut tota planta parum glaucescens, fere a basi ramosus, cum ramis setis plusminus reflexis sat dense obtectus. Folia alternantia, inferiora iam emarcida, media longe petiolata, e basi fere rotundata late ovata, acuta vel acuminata, etiam superiora (et bracteantia) sat longe petiolata (petiolo 0.5—2 cm. longo), e basi fere rotundata in petiolum abrupte angustata, ovata vel late ovata, acuta, simpliciter late dentato-crenata vel superiora fere integra, omnia pilis simplicibus rigidis adpressis supra et subtus obtecta. Inflorescentia sat elongata, pluriflora, pedunculis ca. 1 cm. longis, pilis adpressis obtectis. Flores purpureo-violacei, calycis pallide purpurei, sepal lateralalia (in floribus paucis supremis postremum florentibus) cum sacco 7—8 mm. longa, saccata, saccis 2.5 mm. longis, calcari-formibus, circa (— an semper? —) dimidium totius sepali aequantibus. Petala ca. 1.2 cm. longa, e lamina obovata in unguem longum attenuata. Germen subsessile, stylo longo bilobo terminatum. Silicula plana, 3—5 cm. longa, fere sessilis, carpophoro vix 1 mm. longo, elliptico-obovata, elliptica vel late oblonga, basi angustata, acuta, apice acuta vel fere rotundata, valvis etiam maturis margine dense breviter ciliolatis, ciliis rigidis arrectis, setiformibus, vix 0.5 mm. longis, semina in loculo 2—4 biseriata vel uniseriata, compressa alata.

Habitat in montibus Albaniae borealis (in parte nunc ad Jugoslaviam pertinente) versus opp. Djakova extensis, in glareosis calc., in praeruptis orientalibus alpis Škelsen supra rivum Tropoja ad pag. Tropoja, alt. ca. 1200 m., ubi specimina duo fructifera die 5. Sept. 1918. legi.

Proxima *Lunariae* annuae L. ac praecipue L. pachy-

rrhizae Borb. (conf. Borb. in Term. Füz. XVIII. (1895.) p. 87–96) = rectius *L. Eschfaelleri* Wiesb., a qua posteriore carpophoro fere nullo, 1 mm.-o plerumque brevior, valvis siliquae margine ciliatulis, sepalis lateralibus longe et anguste saccatis, foliis etiam superioribus longiuscule petiolatis, basi non cordatis, sed rotundatis vel subintegris, etiam mediis basi rotundatis, caule dense setoso differt.

Species haec *Lunariae* ob carpophorum ut videtur constanter fere deficientem valde memorabilis est et hac nota in systemate Cruciferarum cl. Hayekii in Beih. Bot. Centralblatt XXVII. 1. (1911) ad genus *Seleniae*, *Ricotiae*, *Citharolemae* et *Farsetiae* accedit, sed notis caeteris et habitu certe ad *Lunariam* pertinet.

In honorem comitis, doctoris *Pauli Teleki* de Szék, doctissimi ac indefessi viri rei geographicae peritissimi dicavi, qui itinera studiendi causa in Albania peracta in Academia scientiarum Hungarica curavit.

Pteridologiai közlemények. Pteridologische Mitteilungen.

Irta: | Dr. Kümmerle J. B., (Budapest).
Von: |

Fenti címen közreadom sorozatos cikkekben azokat az érdekes lelőhelyeket, újdonságokat, kritikai megjegyzéseket és nomenklaturai eredményeket, melyekhez az edényes virágtalan növényeknek és irodalmuknak tanulmányozása révén jutottam.

Unter diesem Titel beabsichtige ich in einer fortlaufenden Reihe interessante Fundorte, Novitäten, kritische Bemerkungen und nomenklatorische Erörterungen zu veröffentlichen, die sich im Laufe meiner Studien an Pteridophyten und in der einschlägigen Literatur ergeben haben.

1. Egy új európai harasztgénusz.*) Eine neue europäische Farngattung.

(Egy képpel. — Mit einer Abbildung).

Birópteris K ü m m. nov. gen.

Filix parvula caespitosa foliis difformibus, sterilibus numerosioribus dense palmatifidis vel pinnatifidis, fertilibus

*) Előadta a szerző a Kir. Magyar Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának 1922. évi február hó 8.-án tartott ülésén.

Vorgetragen in der am 8. Februar 1922 abgehaltenen Sitzung der botanischen Sektion der Königl. Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Javorka Sandor

Artikel/Article: [Lunaria Telekiana Jáv. n. sp., 1-2](#)