

Die blauviolette Blumenkrone behält meist auch im trockenen Zustande die Farbe bei. Wächst am Budiriegel in Rohonez 500 m. s. m. auf Kalkglimmerschiefer; wahrscheinlich auch am Satzenriegel, das dort im Juli 1900 gesammelte Exemplar war noch unentwickelt. Blüht August—October.

Galeopsis pubescens Bess. f. variegata m. Die Blumenröhre ist im oberen Teil gelb, die Ober- und Unterlippe aber weiss, mit derselben purpurfarbigen Zeichnung auf den 3 Zipfeln der Unterlippe wie sie bei der typischen Form in dunklerer Farbe vorkommt. Kommt hie und da, aber selten, neben der typischen Form vor in Kőszeg. Die f. *flavida* m. in meiner Kőszeg és vid. ed. növ. 1891 pag. 38 ist hieher zu ziehen.

Anagallis arvensis L. b) f. ternifolia KAMPE. Cultivierte Stellen in Kőszeg.

A. coerulea Schreb. b) f. verticillata SCHUR. Am Steinbruch in Czák.

Thlaspi Goesingense HAL. var. oligospermum WAISB. et PIERS. Nova var. Weicht von der typischen Form durch die tiefere Bucht des Schötchens, aus welcher aber der Griffel hervorragt, und dessen Wenigsamigkeit ab; die Fächer sind nämlich bloss 2-4-eilig. Auch die Blütezeit ist etwas früher: am 23-ten März 1902 traf diese Form Herr Major PIERS in grosser Anzahl und in voller Blüte am St. Veitsberg in Velem 500 m. s. m. auf Kalkschiefer.

Hypericum perforatum L. var. latifolium KOCH (*H. commutatum* NOLTE; *H. medium* PETERM.; *H. platycalyx* CEL.). Au Waldwäldern, buschigen Stellen und in Kastanienhainen in Kőszeg kommt es gar nicht selten vor. In meinem Kőszeg és vid. ed. növ. 1891 pag. 55. wurde es von mir angeführt, ist somit nicht mehr neu für die Flora des Eisenburger Comitats, wie SIMONKAI-GAYER in Magy. bot. lapok 1902 pag. 314 meinen.

Acerum formae novae ucrainicae.

Fase. I.

Auctore: Dre Franciseo Bloński, Spiczynensi.

Anno 1902 quo novissima Aceracearum monographia a cl. PAXIO conscripta in Regni vegetabilis Conspectu Engleriano in lucem prodiit, omnes quatuor *Aceris* species ucrainicas, nempe *A. platanoidem* L., *A. pseudoplatanum* L., *A. tataricum* L. et *A. campestre* L., quoad variationes in natura diligentius observavi easque permutatione divulgandas non parce legi.¹⁾

¹⁾ Nonnullas formas misi anno 1902 ad cl. Paulum F. F. SCHULZ Berolinensem, ad O. LEONHARDT — Nossensem, in hortum botanicum Dorpatensem (Juryevensem) nec non ad Drem E. WOŁOSZCZAKIUM Leopolensem in Flora polonica exsiccata ejusdem editurus.

Quod ad studium praeprimis hac re coactus sum, quod PAXIUS *Acerem platanoidem* L. quoad folia et fructus et *A. pseudoplatanum* L. quoad folia spontanea satis constantia esse affirmavit, modo culta inter limites latissimas variare, quum jam a. 1885 M. GANDOGER in sua Flora Europae, vol. V. nec non Dr. M. RACIBORSKI in sua sermone polonico conscripta revisione *Acerum* polonicorum («Klony polskie» in Actis societatis physiographicae Academiae Scientiarum Cracoviensis — Sprawozdania Komisyi fizyograficznej vol. XXIII.) aliquot formas distinctas spontaneas harum 2 specierum etiam e terris Poloniae memoraverant.

Fasciculus observationum nunc a me propositus demonstrat *Acerem pseudoplatanum* L., nec non *A. platanoidem* L. in silvis Ucrainiae non paulum foliorum fructuumque forma et vestimento variare, quod ex benigna situatione geographicā Ucrainiae gubernii Kiovieensis, quod solum observationibus meis territorium fuit, tamquam in centro areae geographicae harum specierum siti explicari possit.

Constat enim multis species polymorphas a peripheria suae areae geographicae regionem centralem versus magis magisque variationibus succumbere solere, quod fasciculo II etiam de *A. campestre* L. demonstrare conabimur.

Acer platanoides L.

Var. typicum PAX subvar. **rubellum** SCHWERIN for. **normale** SCHWERIN. *A. platanoides* L. var. *typicum* PAX for. *eurypteron* BŁOŃSKI in sched. et in litt. ad clar. BORBÁSIUM et PAXIUM.

Quumi clariss. PAX specimina sicca a me quoad fructum normalia et «*f. eurypteron* mihi» nominata, ad *f. normale* SCHWERIN coaptavit: diagnosim hujus formae normalis a cl. PAXIO secundum tractatum comitis de SCHWERIN (Gartenflora XLII. 1893 p. 559.) in Regni vegetabilis Conspectu Engleriano (*Aceraceae* 1902 pag. 50) repetitam «folia quoad formam normalia» liceat mihi, nisi eam forsitan ipse comes de SCHWERIN l. c. ampliorem dederit, sequenti modo amplificandam reddere: folia et fructus quoad formam normalia.

Quamvis enim formam fructus *Aceris platanoidis*, 17 annis ante Gallorum ille innumerabilium specierum novarum creator indefessus Michaelius GANDOGER, late mutabilem esse demonstraverat (Flora Europae terrarumque adjacentium. vol. V. 1885. p. 110.): tamen numerosa et non raro haud laevis momenti observations bujus viri, infinitae seriei brevissimarum descriptionum denominationumque singulorum ex singulis terris provenientium exsiccatorum inepte implexae, fere ab omnibus botanophilis europaeis una cum operibus ejus (quae tamen apud exiguissimam botanicorum partem in manibus versabantur) summatim quasi per ostracismum oblivioni condemnatae sunt.

Quo factum est, ut et ille *Acerum* monographus versatissimus Ferdinandus PAX nec non alii formam fructus *Aceris platanoidis*

(etiam culti!) sat constantem esse affirmarent, i. e. non nisi ad fluctuationes exiguissimas individuales, quae omnes quinque effigiebus samararum hujus stirpis ab ill. Dre F. C. SCHUEBELEIRO in suo opere «Norges vaextige» inscripto (vol. II. pag. 394.) depictae sunt, aptam.

Investigationibus autem nostris in *Ucrainiae* gub. Kioviensi, i. e. tamquam in regione centrali areae geographicae stirpis laudatae observationes GANDOGERIANAE quoad formam fructus, omnino confirmatae sunt. Duae enim formae novae e forma fructus proficiscentes nunc describuntur. Gandoherianae vero «species» ope mensurae centimetrici pro maxima parte creatae nec cum nostris «formis» morphologicis congruae temere esse exhumandae.

Si forma hic laudata «normalis» quoad folia seenndum SCHWE-RINIUM dicta suo proprio nomine quoad fructum quandoquidem careat, quemadmodum non paucae species polymorphae varietatibus formisque suis seriatim quoad folia, fructus, vestimentum etc. dispositis in accuratioribus libris systematicis gaudeant, dicam eam f. *euryptera* aequa ac in schedulis et in litteris ad cl. BORBÁSIUM et PAXIUM specimina siccæ authentica concomitantibus jam factum est. cum diagnosi sequenti:

Ali samararum omnino latioribus (modo 3 – 4-plo longioribus quam latis), supra medium latissimis, subhorizontalibus vel angulo (externo s. basali!) obtuso divergentibus; crassioribus marginibus suis basalibus (s. externis) dextra sinistraque laeviter areuato-sinuatis.

In silvis frondosis Ucrainiae, Podoliae, Volhyniae, Lithuaniae, Poloniae, Borussiae, Posnaniae, Silesiae, Galiciae arbor vulgaris (undique specimina siccæ vidi). E Lithuania in Flora polonica exsiccata Dris E. WOŁOSZCZAKI sub No. 716 edita.

f. Raciborskii¹⁾ BŁOŃSKI in Paul F. F. SCHULZ 4. jährliches Verzeichn. d. Tauschverm. f. Herbarpflanzen, 1. Jan. 1903. p. 15. e. diag.). Alis samararum angustioribus, 5 – 6-plo longioribus quam latis, + linearibus, horizontalibus vel subhorizontalibus. samaris numerosissimis (ad 25 eodem pedunculo).

Forma a clariss. BORBÁSIO et PAXIO pro nova ex speciminibus authenticiis recensita.

In silva frondosa pagi Wasilkowee ad Spiczyńce, Ucrainiae distr. Berdyezoviensis.

f. Paczoskii²⁾ BŁOŃSKI. Samara alis angustioribus, sublinearibus, angulo (externo s. basali!) reeto vel etiam late acuto divergentibus, crassioribus marginibus suis basalibus s. inferioribus minime areuato-sinuatis et lineam tamquam parabolicam exhibentibus.

In silvis frondosis Ucrainiae non procul ab opp. Spiczyńce distantibus nec non ad pag. Bulhaje districtus Berdyezoviensis.

¹ Dux in honorem excellentissimi botanici polonici nunc professoris Dublanensis, qui in sua revisione Acerum etiam nonnullas novas formas polonicas descripsit.

² Formam hanc florae provinciarum orientalium Poloniae antiquae scrutatori indefesso voveo.

Acer pseudoplatanus L.

Var. *Borbásii*¹⁾ BLOŃSKI (? *A. pseudoplatanus* L. var. *villosum* BORBÁS 1891 (in Termész. füz. XIV. p. p.), non PRESL!)

Loculis fructus et adultis pubescentibus vel etiam villosis; foliis subtus etiam post anthesin plus-minus manifeste puberulis; aliis samararum minus latis (sc. ae in var. *villoso* PRESL).

In silvis frondosis Ucrainiae distr. Berdyezoviensis et Lipowiecensis 5 in formis frequens.

Varietas *Borbásii* mihi quasi medium tenet inter var. *villosum* (PRESL) PARL. et var. typicum PAX, quare praeter Ucrainam, etiam Hungariam centralem et australem nec non Transsilvaniam ejus areae geographicae subjungo, quibus in regionibus cl. BORBÁS se verum *A. villosum* PRESL detexisse (p. p. in herbariis !), ante decennium putabat (Species *Acerum* Hungariae etc. in Természetrajzi füzetek, vol. XIV, part. 1 2, 1891), quod tamen a cl. PAXIO (*Aceraceae* 1902 in Conspectu Engleriano) non approbatum mihique in litt. ab ipso BORBÁSIO datis erroneum declaratum est.

Quae exemplaria BORBÁSIANA e Hungaria centrali et Transsilvania ex ipso BORBÁSIO pubescentia fructuum foliorumque adulorum ab *Acere pseudoplatano* L. var. *typico* PAX discrepantia, non tamen — monente cl. PAXIO l. e. — adeo, ut verum *A. villosum* PRESL sistant, verosimiliter in meam var. *Borbásii* quadrare mihi visa sunt.

Ideo amplius lectarum formarum exemplaria uerainica ad clar. BORBÁSIUM cum eius *Acere villoso* e Hungaria conferenda misi, et mox responsum a professore eximio Claudiopolitano accepi suam stirpem Hungaricam haud verum *A. villosum* PRESL exhibere et probabiliter meae var. *Borbásii* propinquorem nisi eandem esse. Quum autem ingentis herbarii sui tunc recentissime Buda Claudiopolin transportati et nondum in ordinem redacti exemplaria stirpis hungaricae rite examinandi occasio data non sit, easdem 4 formas meae var. *Borbásii* ad cl. PAXIUM Vratislaviensem misi, tamen judicium minime praeopinatum accepi, has omnes var. *typicum* PAX exhibere.

Quo responso accepto non paulum in dubiis versabar. Quoniam jure — cogitabam — exemplaria hungarica et ucrainica BORBÁSIO mihique quoad vestimentum atypica visa ad var. *typicum* PAX referenda? Cuinam bono ambitus bene distinctae var. *typicae* PAX («foliis sub anthesi tautum serus nervos pubescentibus, fructibus adultis saepissime²⁾ glabris») tali modo relaxandus eique exemplaria foliis pro maxima parte et post anthesin pubescentibus, samarisque semper puberulis gaudentibus subjungenda?

¹⁾ Dediceo hanc formam cl. Dri V. de BORBÁS, professori Claudiopolitano, botanico eximio hungarico europaeoque.

²⁾ In Gallia etiam semper glabris secundum ROUY, Flore de France, vol. IV. (1897) p. 149.

Quibus dubiis coactus, ad rem ulterius examinandam et prae primis in Hungaria, ubi vestitae formae *Aceris pseudoplatani* L. vulgariores sunt, haud numerosa a me collecta specimina per hortum botanicum Jurjevensem (olim Dorpatensem) distribuere et simul observationes suas divulgare non haesitavi.

Dummodo res iterum iterumque disputationi reddatur, non inutile erit hic summam observationum suarum nec non BORBÁSH aliorumque referre, in Hungaria boreali, Galicia occidentali (au et orientali ?), Polonia, Lithuania non nisi var. *typicum* PAX sicut in Gallia secundum el. Röty l. e. provenire, quum in regionibus meridiem orientemque magis vergentibus sicut Hungaria centrali et australi, Transsilvania nec non Uerainia etc. var. *Borbásii* mihi praevalere. Quoad stirpem Fluminensem (in montibus ad Fiume = Rjeka a el. BORBÁSIO lectam) suspicor. veram var. *villosum* (PRESL) exhibere posse, que in littore vicino Dalmatiae a VISIONI lecta sit.

Eece descriptiones 5 formarum uerainicarum varietatis *Borbásii* mihi.

f. chlorocarpum BŁOŃSKI. Samaris + viridibus vel lutescentibus, alis angulo recto vel late acuto divergentibus; foliis minoribus, basi cordatis, fere 3 lobis, lobis latis abbreviatis.

In silva opp. Plisków distr. Lipowiecensis Uerainiae adjacenti frequens.

f. rhodopterum BŁOŃSKI. Samaris purpureis, alis angulo recto vel late acuto divergentibus; foliis minoribus, basi cordatis, fere 3 lobis, lobis latis abbreviatis.

In silva opp. Plisków Uerainiae distr. Lipowiecensis proxima.

f. volans BŁOŃSKI. Samaris lutescenti-viridibus, alis angulo obtuso divergentibus, foliis minoribus basi cordatis, 5 lobis, tribus lobis superioribus latis abbreviatis.

In silva frondosa pagi Kožanka Uerainiae distr. Lipowiecensis.

Au huc pertineat No. 659 Herbarii DENDROLOGICI BAENITZIANI: *A. pseudoplatanus* L. var. *anomalum* SCHWERIN (lapsu calamis «anormale» in schedis et in Prospectu 1903 impressum) *f. obtusangulum* BORB. ex arbore Vratislaviae culta lectum?

f. connivens BŁOŃSKI. Alis fructus parallelis vel subparallelis, angulo acuto exiguo divergentibus, vel etiam introrsum falcatis subconniventibus; foliis minoribus, basi cordatis, 5 lobis, tribus lobis superioribus latis, abbreviatis.

In silva pagi Bulhaje, distr. Berdyczoviensis Uerainiae.

f. basitomum BŁOŃSKI. Foliis basi truncatis, sub 3 lobis, majoribus, lobis angustioribus, acuminatis; fructu ignoto (quare modo vestimento foliorum diu persistente ad var. *Borbásii* mihi delata).

In silva frondosa pagi Bulhaje, distr. Berdyczoviensis Uerainiae.

Nostrae similis videtur e discriptione var. *subtruncatum* PAX. for. *molle* BECK Fl. v. N.-Öst. p. 582 (non OPIZ nec PAX) nisi eadem.

Revisio PANIANA harum formarum. Jam prius mentio facta est, formas propositae a me var. *Borbásii* cum descriptionibus ad

cl. PAXIUM recensendas missas omnesque ad suam varietatem *typicam* relatas esse. Constat quoque, quum var. *typica* PAX et var. *villosa* (PRESL) secundum descriptiones PAXII et PRESLI tota caelo discrepant, in regionibus calidioribus Europae mediae et orientalis formas quasi intermediae inter utramque varietatem laudatam provenire, quas Hungaricas ante decennium BORBÁS, erronee ad var. *villosam* (PRESL), uerainicas recentissime PAX (an recte?) ad var. *typicam* retulerint, et quas omnes uno sub nomine var. *Borbásii* conjugendas et a var. *typica* PAX et *villosa* (PRESL) discernendas proposuerim.

Cl. PAX. sequenti modo meas formas var. *Borbásii* inter formas suae var. *typicae* in litteris ad me (30. XII. 1902) disposuit, quae tamen me judicante minus accurate in alterutram quadrare videntur, quod meas non ad var. *typicam* pertinere tamquam significet.

Formas *chlorocarpam* et *rhodopteram* cl. PAX pro var. *typica* PAX subvar. *subtriloba* SCHWER. for. *vitifolia* TAUSCH fide speciminiibus authenticis declaravit, tamen etiamsi pubescens foliorum fructuumque omittatur, foliis minoribus a var. *vitifolia* TAUSCH ex ipso PAXIO (Aceraceae 1902 pag. 19) differre videtur.

Formam *conniventem* cl. PAX cum var. *anomala* SCHWER. for. *complicata* MORTENSEN comparandam esse putat (fructibus adultioribus lectis!), tamen dubito, quin for. *complicata* Europae borealis incola fructibus et foliis post anthesin pubescens gaudeat. Quare potius cum vestita var. *subparallelia* BORBÁS 1891 (Termész. füz. XIV. p. 72) jungerem, nisi haec «foliorum segmentis conspicue acuminatis» diversa esset. Ceterum var. *subparallelia* BORBÁS Hungariae centralis nec non Serbiae civis etiam formam nostrae var. *Borbásii* sistere videtur.

Formam *basitomam* cl. PAX ad suae var. *typicae* PAX subvar. *quinquelobae* (GILIB.) formam *palmatifidam* DUHAM. accendentem refert, mili autem vestimento etiam neglecto foliis subtrilobis, ad trientem laminae divisum (nec «profunde 5 partitis» ut in diagnosi f. *palmatifidae* DUHAM. apud PANIUM legimus!) diversa apparat.

For. *volans* parce a me lecta cl. PAXIO oblata non est.

Acer tataricum L.

Dr. M. RACIBORSKI l. c. varietatibus *yjica* RACIB. et *Slendzianskii* RACIB. sejunetis, appellationes homonymas formis earum quoad tolia analogicis dedit, quod quippe nomina haec a cl. PAXIO immutata in monographia reiterantur, vix approbandum est.

Nomen «*crotundifolium*» ab ANDRZEJOWSKIO in schedulis formae foliis rotundis ex Uerainia datum, quae ex speciminiibus authenticis a RACIBORSKIO ad var. *Slendzianskii* relata est, eidem formae apte permaneat. Reliquarum duae autem reappellandae sunt. Quo modo formae *Aceris tatarici* L. a RACIBORSKIO descriptae quoad folia essent sequentes :

var. 2. genuinum RACIB.

f. oblongifolium RACIB. foliis indivisis oblongis, irregulariter biserratis.

In horto Zofiówka dieto prope Humań Uerainiae a me observatum.

f. orbiculare BŁOŃSKI (f. *rotundifolia* RACIB. non ANDRZEJ. in sched. et ap. RACIB. l. c.) foliis indivisis, rotundis, irregulariter biserratis.

var. 3. Slendzinskii RACIB.

f. oblongifrons BŁOŃSKI (f. *oblongifolia* RACIB. l. c. p. 52 non RACIB. p. 51, iterum in eadem specie!): foliis indivisis, oblongis.

In horto Zofiówka dieto prope Humań Uerainiae a me observatum.

f. rotundifolium ANDRZEJ. in sched. (uomen) et apud RACIB. l. c. p. 52. foliis rotundis, irregulariter biserratis.

Acer tataricum quoad vestimentum fructuum non minus variabile est, quod non satis cl. PAXIO nec non SCHWERINIO notum fuisse videtur, quum apud eos modo unam var. *hebecarpum* SCHWERIN inveniuntur, quae «alis subparallelis» omnino ad var. *genuinam* RACIB. pertinet. Nunc constat etiam alteram varietatem *Aceris tatarici* L. nempe var. *Slendzinskii* fructus pubescentes habere posse.

Aceris tatarici varietatem *hebecarpam* a RACIBORSKIO in sua revisione *Acerum* polonicorum primum descriptam et a SCHWERINIO nonnunquam non possumus pro mera varietate duobus aliis varietatibus: *genuinae* RACIB. et *Slendzinskii* RACIB. (sicut apud SCHWERINUM et PAXIUM reperitur) juxtaponenda habere, postquam observationibus nostris manifestum factum est, formas fructibus pubescentibus apud utramque proveuire posse. Idecirco var. *hebecarpum* SCHWER. ipsum RACIBORSKUM secuti varietati *genuinae* RACIB., quae alis subparallelis gaudet, uti formam subjunxiimus.

Diagnosis item PAXIANA var. *genuinae* RACIB. «ala e erectae, subparallelae, loculi gabri» phrasim «loculi glabri vel pilosi» amplificanda vel rectius diagnosis primaria RACIBORSKII restituenda, qui sua var. *genuina* formas fructibus glabris et pilosis amplexus est.

Eece nostram dispositionem formarum *Aceris tatarici* L. quoad fructus:

var. 2. genuinum RACIBORSKI, alis erectis, angulo acuto minimo divergentibus, subparallelis; loculis glabris vel pilosis.

f. typicum PAX. foliis margine irregulariter serratis; loculis glabris aut glabriuseulis.

In silva frondosa pagi Bulhaje prope Spiczynę, distr. Berdycevoviensis in Uerainia.

f. hebecarpum SCHWERIN. (for. d) «fructus maturi pauce pilosi», RACIB. l. c. p. 51.) Loculis manifeste pilosis.

var. 3) Slendzinskii RACIB. Fructus alis angulo fere 90° divergentibus; loculis glabris vel pilosis.

f. decalvans BŁOŃSKI; loculis glabris vel glabriuseulis.

In horto opp. Spiczynę, districtus Berdycevoviensis Uerainiae.

f. pubigerum BŁOŃSKI et BORBÁS: loculis manifeste pilosis, alis saturatiū coloratis.

In saxosis ambilaeri Zofiówka dieti prope Humanii, Ucrainiae. Secundum cl. BORBÁSIUM et PAXIUM ambae formae var. *Slendziński* RACIB. vix rite diagnosecanda sunt, et formis intermediis inter se confluere videntur. Num autem var. *hebecarpa* SCHWER. a var. *typica* PAX magis differat? Nihilominus illa a cl. PAXIO in monographia accepta est. Me judicante formae intermediae inter varietates vel formas multo saepius ocurrunt, quam putari solent, quod tamen non impedit nos, quominus formis vel exiguis oculis nostris differentibus nomina demus, quibus quaenam singulis in regionibus vel stationibus formae obveniant, accuratae indicari possint.

Occasione data optimas hic gratias publice ago, eximiis professoribus botanices aestumatissimis: Ferdinando PAXIO Vratislaviensi nec non Vincentio BORBÁSIO Claudiopolitano, qui revisione nonnullarum a me lectarum formarum benevolentissime perfecta, mihi in hoc fascieulo observationum in lucem edendo prodierunt.

A herbariumok történetéhez.

Zur Geschichte der Herbare.

— Irta: Alföldi Flatt Károly (Budapest).

(Folytatás. — Fortsetzung.)

Egy pontban azonban a tudós szerzőkkel nem érthetek egyet. A herbariumnak 42-ik növénye név helyett így van jelezve: «*Herba che portò Andrea d'Oria in Italia*» s ehhez szerzők ezt a megjegyzést fűzik: «In tal modo le prime origini della raccolta potrebbero risalire ad un'epoca anteriore al 1560. anno della morte del celebre ammiraglio genovese.»⁵⁶⁾ E szerintök abban a nézetben vannak, hogy maga a herbariumban levő növény származik d'ORIA-tól, a hires genuai tengernagyotól. Ezt a fel fogást az idézett téTELBE nem lehet belemagyarázni; ez a téTEL csak ennyit mond: «*Növény, melyet d'Oria András hozott be Olaszországba*»; s ha a szerzők

Beziiglich eines Punktes jedoch kann ich mit den gelehrten Autoren nicht übereinstimmen. Die 42-ste Pflanze des Herbars ist statt Benennung folgendermassen geschildert: «*Herba che portò Andrea d'Oria in Italia*» und knüpfen die Verfasser folgende Bemerkung hiezu: «In tal modo le prime origini della raccolta potrebbero risalire ad un'epoca anteriore al 1560 anno della morte del celebre ammiraglio genovese.»⁵⁶⁾ Dieselben sind dennoch der Ansicht, dass d. im Herbar befindliche Pflanze selbst es sei, welche von d'ORIA, dem berühmten Admiral, herstamme. Diese Auffassung kann man aus der citierten Stelle nicht folgern; diese Stelle sagt nur

⁵⁶⁾ CAMUS & PENZIG: Illustrazione del Ducale Erbario Estense etc. (1885), p. 6.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Blonski Franz [Francisco]

Artikel/Article: [Acerum formae novae ucrainicae. 79-86](#)