© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bartramia Halleriana Hedw. és **B. pomiformis** (L.) Hedw. gyepeket szedtem. Ez utóbbi nagy mennyiségben található *Kolozsvár* vidékén a «*Malom-völgy*»-ön átfolyó kis csermely mentén (1900—1901); továbbá a «*Vlegyásza*» hegység több helyén: «*Valea Saca*», «*Intre Muntye*» stb.

Catharinaea augustata Brid. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 196. szép gyepjeit leltük a «*Hideg-Szamos*» völgyében, humuson (1902. jul. 11.), hol elég böven vegetált e csinos kis moha.

Hedwigia albicans (Web.) Lindb. **var. d. viridis** Bryol. eur. E tisztán csak levelei végén fehér, — egyebütt zöld — mohát a «*Hideg-Szamos*»-on s *Tusnád*-ról a «*Szent-Anna*» tavához menet gyüjtöttem (1902 aug.). Ugyancsak a «*Hideg-Szamos*»-nál gyüjtöttük a

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Pal. Beauv. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 134. szép példáit (1902. jul. 11.).

Fontinalis antipyretica L. Hazsl. p. 202. Bihar m., *Remecz*, «*Valea Lupului*» völgyben 1902 ápr. 10. gyüjtötte Walz Lajos.

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 106. Nedves talajon, a «*Hideg-Szamos*» völgyében gyüjtöttem 1902 aug. hónapban.

Ulota americana (P. Beauv.) Mitten. «*Hideg-Szamos*» völgyében mészsziklákon gyüjtöttük (1902 jul. 11.).

Bryologische Notizen.

Mitgeteilt von **István Györffy** (Kolozsvár).

Im Sommer des vorigen Jahres hatte ich das Glück, mit dem einzigen Bryologen Ungarns, Herrn Márton Péterfi, mehrere — für mich genussreiche und sehr lehrreiche — Ausflüge machen zu können. Auf diesen Excursionen haben wir sehr viele neue bryologische Daten gesammelt. Einige Interessantere mögen schon jetzt veröffentlicht werden. — Ausführlicheres soll bei einer anderen Gelegenheit folgen.

Seligeria pusilla (Ehrh.) Bryol. Eur. cfr. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 108. Sammelten wir in dem, von *Kolozsvár* nicht weit gelegenen sogenannten «*Plecska*»-Thal, an einer der militärischen Schiesstätte gegenüber liegenden Stelle, auf Kalksteinen die in einem Bächlein lagen (1902. Juni).

Ditrichum pallidum (Schreb.) Hampe. cfr. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 119. sub.: *Leptotrichum*. Umgebung von *Kolozsvár*, «*Bükk*»; ziemlich häufig auf sonnigen Stellen, am ausgetrockneten, lehmigen, sandigen Ufer eines Grabens, neben dem neuen Waldweg, der auf die «*Peana*» (836. M. [die «*Árpád-Spitze*» des Siebenbürgischen-Karpathen-Vereins]) führt. — Gleichfalls neben diesem Weg fanden wir Prachtrasen von

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde) Brotherus. (Juli. 1902). Dieses — vor nicht zu langer Zeit nur von wenigen Fundorten bekannte — schöne Moos sammelten wir im Mai des Jahres 1902 in dem «*Podur*» genannten Fichtenwald neben *Topánfalva*. — Es fand sich in der Gesellschaft von **Catharinaea undulata** (L.), zwischen welche sich auch noch **Pogonatum urnigerum** (L.) mischte, u. zw. auf dem Rande einer lehmigen, mit **Baeomyces roseus** P. ganz bewachsenen Stelle, in einem Fichtenwald, durch welchem der Weg von «*Magura*» (Com. Kolozs) nach «*Holumbul*» (1341 M.), d. h. nach dem Dorfe *Beles**) führt.

Von *Topánfalva*, zur «*Lucsia*» benannten Höhle gehend, sammelten wir in den Ritzen der Kalkfelsen einige kleine Rasen von **Myurella julacea** (Vill.); eben daselbst auch **Seligeria pusilla** (Mai 1902).

Im Thal der Aranyos, in einer kleinen Höhle eines neben dem von *Offenbánya* nach *Topánfalva* führenden Weg, emporragenden Felsens sammelte ich zu unserer grossen Freude das winzige, mit grünlich-röthlichen, im Lichte glänzenden Protonema versehene Moos

Schistostega osmundacea (Dicks.) Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 162. im sterilen Zustande, wo es auf Chlorit-Schiefer-Unterlage in ziemlicher Menge vorgefunden wurde.

Zu den verbreitetsten Lebermoosen gehört **Metzgeria furcata** L. Ich sammelte sie im Thale der «*Hideg-Szamos*», in der Gegend von «*Olasztelep*», bei dem «*Bethlen-Felsen*», bei *Reketó* (Mai 1902), bei dem *Retyiczel*-er Wasserfall *(Sikótorony)* (Sept. 1902); im *Ojtoz*-er Pass, sammt **Isothecium myurum** (Pollich) cum fruct. (Aug. 1902) und im Thale «Valea Saca» des «Vlegyasza» Gebirges (Sept. 1902).

Neckera crispa (L.) Hedw. Hazsl. p. 211. Fand ich auf einer Felsenwand im «*H.-Szamos*»-Thal: «*Vlegyásza*» Gebirge, auf dem «*Intre Munti*»; Retyezát-Gebirge, auf der «*Piatra Kolibite*» (Dilma mare). Auf letzterem Orte in Gesellschaft von **Madotheca laevigata** Dumort.

Andreaea petrophila Ehrh. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 269. Sammelten wir in der Umgebung von *Verespatak*, u. zw. auf den «*Cetatye*» gehend auf Kalkfelsen des Berges «*Kirnyik*» (Mai 1902).

Mnium undulatum (L.) Weis. c. fr. sammelte ich in der Umgebung von *Kolozsvár*, im Thal der *H.-Szamos*. — Von den Felsenwänden desselben Thales, am rechten Ufer der H.-Szamos brachten wir schöne, grosse sterile Rasen von

Amphidium Mougeotii (Bryol. eur.) Schimp. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 148. — mit.

Pogonatum nanum Neck. Sammelte ich zwischen den Dör-

---

*) Nebenbei sei erwähnt, dass unweit von dieser Stelle eine Specialität Siebenbürgens, die *Pulmonaria rubra* Schott et Kotschy an schattigem Orte des Waldes, in Gesellschaft von *Symphytum cordatum* W. K. blühte (Juni 1902).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

fern *Lupény* und *Kimpulajnyág*, am sogenannten «*Muszt*», wo es auf Chlorit-Schiefer (Sericitis) häufig vorkommt (23. Juni 1902).

In der Umgebung von *Kolozsvár*, im «*Hideg-Szamos*»-Thal, sammelte ich auch schöne Rasen von

Bartramia Halleriana Hedw. und **B. pomiformis** (L.) Hedw. Letztere kann man in der Umgegend von *Kolozsvár*, neben dem durch das «*Malomvölgy*» fliessenden Bächlein in grosser Menge antreffen (1900—1901); es kommt auch an mehreren Stellen des *Vlegyásza*-Gebirges: «*Valea Saca*», «*Intre Muntye*» etc. (Sept. 1902) vor. — Schöne Rasen von

Catharinaea angustata Brid. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 196 fanden wir im Thale der *Hideg Szamos*, auf Humus (11. Juli 1902), wo dieses niedliche kleine Moos genug häufig vegetiert.

Hedwigia albicans (Web.) Lind. **var. d. viridis** Bryol. eur. Dieses, nur an den Enden seiner Blätter weisse — sonst überall grüne — Moos sammelte ich im «*H.-Szamos*»-Thal und am Wege von *Tusnád* zum «*St-Anna*»-See (Aug. 1902). Gleichfalls bei der *H.-Szamos* sammelten wir schöne Exemplare von

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Pal. Beauv. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 134 (11. Juli 1902).

Fontinalis antipyretica L. Hazsl. p. 202. Wurde im Comitat Bihar bei *Remecz*, im «*Valea Lupului*»-Thal am 10. Apr. 1902 von Lajos Walz gesammelt.

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 106. Sammelte ich auf feuchtem Boden im «*H. Szamos*»-Thal. Im August 1902.

Ulota americana (P. Beauv.) Mitten. Sammelten wir in dem Thal «Hideg-Szamos», auf Kalkfelsen (11. Juli 1902).

A herbariumok történetéhez.

Zur Geschichte der Herbare.

— Irta: **Alföldi Flatt Károly** (Budapest). —

(Folytatás. — Fortsetzung.)

19. A XVI. század második felében működött Ferrante Imperato nápolyi gyógyszerésznek s Fabius Colonna barátjának több kötetből álló herbariumát a sienai Giambattista Ferrari, jezsuita-szerzetes magasztalja az 1633-ban Rómában megjelent «Flora sive de florum cultura libri IV» czímű mű-

19. Das aus mehreren Bänden bestehende Herbar des, in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts thätig gewesenen Neapler Apothekers Ferrante Imperato, eines Freundes des Fabius Colonna, wird durch den Sienaer Jesuiten Giambattista Ferrari in seinem, im Jahre 1633 zu Rom erschienenen und «Flora

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Györffy Stephan [István]

Artikel/Article: Bryologische Notizen. 148-150