

Additamenta ad floram bryologicam Hungariae.¹⁾

Enumeratio muscorum frondosorum rariorum in Transsilvania, Hungaria septentrionali alibique ab auctore aliisque collectorum.

Auctore: Dr. István Györffy (Makó).

Gymnostomum rupestre SCHLEICH. — ster. — T.²⁾ In valle fluvii Aranyos, inter pagos Vidaly et Offenbánya (leg. Györffy 1902, 8. V.) — Species haec pulcherrima e Transsilvania solum apud Nagyág [vide Péterfi in M. B. L. (Magyar Botanikai Lapok) II. (1903.) p. 289] et in valle Valea Vinului ad Rodnam (v. Matoušek in M. B. L. IV. 1905. p. 81) cognita erat.

Rhabdowisia fugax (HEDW.) BRYOL. EUR. var. β) *subdenticulata* BOULAY — c. frct. — T. In valle Aranyos, inter pagos Alsó- et Felső-Lupsa, in caverna quadam parva cum *Schistostega osmundacea* satis copiose (legit Györffy a. 1902, 8. V.)

Varietas haec pro Flora Hungarica nova est.

Dicranella cerviculata (HEDW.) SCHIMP. — c. frct. — T. Prope Verespatak in monte «Kirnyik» (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902, 11. V.)

Brachydontium trichodes (WEB. fil.) BRUCH. — c. frct. — T. Comitatus Háromszék: supra pagum Sósmező in fauce montana «Ojtozi-szoros» (legit Györffy a. 1902, 26. VIII.)

Ceratodon purpureus (L.) BRID. forma *rufescens* WARNSTORF in Verh. Bot. Ver. Brandenb. 1885, p. 38 — ster. — T. Ad balneas salsas urbis Torda (legit GYÖRFFY a. 1902, 7. V.)

Forma nova Florae Hungaricae.

Didymodon rigidulus HEDW. forma *propagulifera* MILDE — ster. — T. Ad Verespatak (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902, 11. V.) — Propagula basi foliorum insidentia talia sunt, qualia CORRENS in opere suo illustrissimo: «Untersuchungen über die Vermehrung der Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge» Jena, 1899. — descripsit (loco citato p. 59—62) nec non delineavit (l. c. p. 60. Fig. 31, A)

Muscus in Flora Hungaricae novus.

Tortella inclinata (HEDW. fil.) LIMPR. — ster. — T. Ad Verespatak (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 11. V.). — Species haec in Flora Hungarica satis rara, et ab auctoribus solum e locis a paucis publicata est, ea nempe: e tractu Fiume (MATCOVICH, Fl. critt. di Fiume. 1879, p. 31 n. 64.), e Scepusio (HAZSLINSZKY

¹⁾ Epitome e dissertatione auctoris, quae in «Muzeumi Füzetek» tom. I (1906.), pars II., in lucem edita est Kolozsvarin anno 1908.

²⁾ T. = Transsilvania; H. = Hungaria septentrionalis.

A magy. birod. mohfl. Budapest 1885. p. 128), e Tatra Magna (CHALUBINSKI, Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensiurn, Warszawa 1886, p. 44), e comitatu Pestinensi (MATOUSCHEK in M. B. L. II. 1903. p. 94.). Prope Remec, Vidra (Jégbarlang et Ordenkusi), Szkerisora. in valle Jádvyölgý [PÉTERFI in Math. Term. tud. Közl. XXX. k. 3. sz. 1908. p. 37.].

T. fragilis (DRUMM.) LIMPR. — ster. — T. Ad balneas salsas prope Tordam (legit GYÖRFFY a. 1902 7. V.). — Planta Florae Hungaricae rara, quae hucusque tantum e Tatrae Magnae valle Nagytarpatak cognita erat, e quo loco cl. MATOUSCHEK (in Verh. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien L. 1900. p. 231.) eam publicavit.

Barbula reflexa (BRID.) BRID. — ster. — T. In valle Aranyos, inter pagos Vidaly et Offenbánya (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 8. V.). Stationes hujus speciei hungaricae, adhuc cognitae sunt: Vlegyásza (GYÖRFFY in M. B. L. III. 1904. p. 119), in monte Hajtóhegy prope Nagyág (PÉTERFI in A hunyadmegyei tört. és rég. társ. XIV. évk. 1904. p. 91.). Prope Remec [PÉTERFI in Math. Term. tud. Közl. XXX. k. 3. sz. 1908. p. 37.], in monte Dürrerberg Kesmarkiensis (Röll in «Hedwigia» XLIII. 1904. p. 133.).

B. paludosa SCHLEICH. — ster. — T. Ad balneas salsas prope Kolozs (legit GYÖRFFY a. 1902. 15. VI.). — Haec species hucusque tantum e tractu Carpathorum minorum prope Pozsony-Szent-György (KORNHUBER in Verh. Presb. IX. 1866. p. 107) et e Borszék (BAUMGARTEN Enumeratio etc. Cibinii Tom. IV. 1846. p. 111. n. 2402) cognita erat.

Grimmia (*Gasterogrimmia*) *poikilostoma* CARDOT et SEBILLE — c. frct. — T. In valle fluvii Aranyos, inter pagos Vidaly et Offenbánya. (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 8. V.)

Florae hungaricae species nova rara que, quae hucusque tantum e Gallia (Auvergne ad ripas fluminis Allier apud Pont-de-Longue, Puy-de-Dôme) leg. GASILIEN et pr. Saint-Christophe-en Oisans, leg. SEBILLE, innotuit.

Muscus hic primum in Gallia detectum, ex sententia CARDOT est: «une mousse extrêmement curieuse, qui paraît être le produit de la fécondation du *Grimmia leucophaea* par le *G. crinita* (*G. crinita* — *leucophaea*).» («Revue Bryologique» XVII. (1890.) a. p. 18.) — Hoc bryophyton, uti speciem novam, descripsit SEBILLE in «Rev. Bryol.» XXVIII. 1901. a. p. 118—123. — Exemplaria mea Transsilvanica cum diagnosi auctoris SEBILLE omnino conveniunt.

Gr. tergestina TOMM. — ster. — T. In montibus Gyaliensibus: in valle fluvii Meleg-Szamos (legit GYÖRFFY a. 1904. 17. VII.). — In Transsilvania hucusque solum cl. PÉTERFI prope Vajda-Hunyad (M. B. L. II. 1903. p. 293), Vidra, Rézbánya (Math. Term. tud. Közl. XXX. k. 3. sz. 1908. p. 40.) legit.

Gr. mollis BRYOL. EUR. — c. fret. (!) — T. In valle fluvii Aranyos, inter pagos Vidaly et Offenbánya (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 8. V.). — Species haec pulcherrima e Transsylvania nunc prima occasione publicatur.

Dryptodon Hartmanni (SCHIMP.) LIMPR. forma *propagulifera* MILDE — ster. — T. In montibus Retyezát, «Dilma mare» (legit. GYÖRFFY a. 1901. 24. VI.)

Bryum alpinum HUDS. — ster. — T. Ad balneas salsas prope Tordam; in valle fluvii Aranyos, inter pagos Vidaly et Offenbánya (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 8. V.)

Mnium spinulosum BRYOL. EUR. — c. fret. — T. In monte Királykő nempe in fauce «Crepatura-szakadék» dicta (legit JÓZSEF DIK a. 1901. 6. VIII.). — Haec species in Hungaria rara est quia hucusque solum e Slavonia pr. Točag apud Zvečevo (STOITZNER in Verh. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1870. p. 1013. n. 63) et pr. Brassó in monte nivibus tecto Bucsecs, valle Malajest (MATOUSCHEK in M. B. L. IV. 1905. p. 82) et in montibus Bihariensibus (PÉTERFI in Math. Term. tud. Közl. XXX. k. 3. sz. 1908. p. 51.) lecta fuit

Philonotis marchica (WILLD.) BRID. — ster. — T. Inter pagos Topánfalva et Zalatna (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 12. V.)

Thyridium pseudotamarisei LIMPR. — ster. — T. In valle fluvii Hideg-Szamos prope pagum Gyalu (legit GYÖRFFY a. 1902. 9. VI.)

Th. Philiberti (PHILIB.) LIMPR. — ster. — T. In valle «Plecska-völgy» nominata prope urbem Kolozsvár (legit GYÖRFFY a. 1903. 6. VII.); H. In monte «Ihla» prope Majerka (Comit. Szepes) (leg. GYÖRFFY a. 1904. 20. VII.)

Pylaisia longifolia RÖLL. — c. fret. — T. In monte «Hangenstein» prope urbem Brassó (legit J. DIK 1902. 16. I.) — Exemplaria diagnosi DRIS RÖLL (in «Hedwigia» XLII. 1903. p. 302) omnino correspondent.

Eurhynchium Stokesii (TURN.) BRYOL. EUR. — ster. — T. Ad ripas rivi Skoku in monte nivibus tecto Retyezát (comit. Hunyad) (legit GYÖRFFY a. 1901. 24. VI.)

Plagiothecium Roeseanum (HAMPE) BRYOL. EUR. — c. fret. — T. In silva «Podur» dicta, in tractu pagi Szohodol apud Topánfalva. (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 9. V.)

Hygroamblystegium fallax (BRID.) LOESKE in varietatem *spini-folium* (SCHIMP.) LIMPR. transiens. — c. fret. — T. Inter pagos Topánfalva et Zalatna (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 12. V.)

Catharinaea augustata BRID. — c. fret. — T. In silva «Podur» dicta prope pagum Szohodol apud Topánfalva (leg. GYÖRFFY et PÉTERFI a. 1902. 9. V.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Györfy Stephan [István]

Artikel/Article: [Additamenta ad floram bryologicam Hungariae. 51-53](#)