

Zusammenstellung:

	Brachvogel		Kiebitz		Bekassine		Rotschenkel	
	Stück	Brutp.	St.	Bp.	Stück	Bp.	Stück	Brutp.
Waidmoos	2	1	20	6-8	1	2?		
Oichtental	14	6-7	23	7-8	11	1?		
Trumer Seen (Salzburger Gebiet)	4-5	2	5	2	1	1?		
Egelseen	1		9	3-4				
Wallersee	13	6	c45	20	9-10	4-5	8	1-2
Eugendorf/ Strass			4	2				
Unzinger Moos	2	1	3	1				
Riedwiesen Enzersberg			6	3	1			
Flugplatz			c20	?				

Summe:
Minimalzahlen! 36 16 135 $50\frac{+}{x}$ 23 8? 8 1-2

=====

Bemerkung: x) ohne Flugplatzkiebitze. Mit diesen ca. 60 Paare.
Zahl der Bekassinenbrutpaare nach den Beobachtungen
in den Jahren 1964 und 1965

Alfred Hovorka, Wien : Brutnachweise aus dem Gebiet der Schlee-
dorfer Egelseen (Auszug aus Exkursionsliste
vom 29. Mai 1965)

Ringeltaube: ausgeflogene Jungvögel
Waldohreule: 1 abstreichender Vogel u. 1 Ex vom Horst abfliegend
Kleiber: ausgeflogene Jungvögel
Grünling: 1 Nest mit 5 frischen Eier
Singdrossel: 1 Nest mit 4 frischen Eier
Amsel: 2 Nester (1 Nest mit 5 frischen Eier, 1 Nest mit
4 Eier, stark bebrütet
Wacholderdrossel: Einige ausgeflogene Jungvögel werden gefüttert.
2 Nester frisch gebaut, 2 Nester mit Kotspuren (aus-
geflogene Junge), 1 Nest mit ca einer Woche alten
Jungvögel, 1 Nest mit 2 frischen Eier
3 Nester unkontrolliert. (?)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [024](#)

Autor(en)/Author(s): Hovorka Alfred

Artikel/Article: [Brutnachweise aus dem Gebiet der Schleedorfer Egelseen \(Auszug aus Exkursionsliste vom 29. Mai 1965\). 6](#)