

10 -

Im Spätherbst und Winter des öfteren zu sehen: Gimpel, Weidense, Rotkehlchen, Erlenzeisige, Bergfinken, Kleinspecht, Wacholderdrossel, Kernbeisser, Fasan. Im Winter 1969 sogar Seidenschwänze.

Wiedehopf im Lungau

Herr Dentist Hautzinger meldete den Totfund eines Wiedehopfes am 2.8.1970 in Weisspriachtal/Lungau in ca. 1.400 m Höhe.

---.---.---.---.---

Die ersten Seidenschwänze meldete heuer Herr Walter Wieland u.zw. 8 Ex am 29.11. in Wölting b.Tamsweg.

---.---.---.---.---

Für die Einsendung von Beobachterformularen und Brutnachweisen haben wir zu danken:

- Frau Dr. Johanna Gressel, Salzburg
- Frau Hilde Meyer, Salzburg
- Frau Dr. Frieda Lachmann, Thalgau
- Herrn Roman Eidenschink, Schwarzbach
- Herrn Walter Wieland, Tamsweg

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [040](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Kurzberichte \(Kautzinger, Totfund Wiedehopf\). 10](#)