Schmetterlinge (Lepidoptera) im Bereich der Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg): Diversität- Ökologie- Gefährdung

von Peter Huemer

VORARLBERGER
NATURSCHAU

2

SEITE 141–202
Dornbirn 1996

Zum Autor

Geboren 1959 in Feldkirch, Studium der Biologie und Erdwissenschaften mit Nebenfach Physik und Chemie an der Universität Innsbruck. 1986 Dissertation über Kleinschmetterlinge an Rosaceae. Seit 1987 im wissenschaftlichen Dienst am Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum mit Schwerpunkt Ökologie, Taxonomie und Biogeographie alpiner Schmetterlinge.

Inhalt

<i>Zusammenfassung</i>	142
1. <i>Einleitung - Zielsetzung</i>	143
2. <i>Untersuchungsgebiet, Methodik, Material</i>	144
2.1. <i>Gebietscharakterisierung</i>	144
2.2. <i>Untersuchungsstandorte</i>	146
2.3. <i>Aufsammlungs- und Registrierungsmethodik</i>	148
2.4. <i>Datum und Standorte der Begehungen</i>	150
2.5. <i>Historisches bzw. subrezentenes Datenmaterial</i>	152
3. <i>Ergebnisse - Diskussion</i>	153
3.1. <i>Artenbestand</i>	153
3.1.1. <i>Arteninventar - Familienspektrum</i>	153
3.1.2. <i>Bemerkenswerte Arten</i>	154
3.1.3. <i>Faunistische Bedeutung</i>	172
3.1.4. <i>Artenschwund - Rote Listen-Vertreter</i>	173
3.2. <i>Schmetterlingsgemeinschaften der einzelnen Lebensraumkomplexe</i>	176
3.2.1. <i>Riedwiesen</i>	176
3.2.2. <i>Kleinseggenrieder</i>	177
3.2.3. <i>Trockenvegetation</i>	177
3.2.4. <i>Fettwiesen</i>	177
3.2.5. <i>Auwälder</i>	178
3.2.6. <i>Fichtenforste</i>	179
3.3. <i>Die Streuwiesenkomplexe Bangser Ried, Unterried und Partenwiesen</i>	180
3.4. <i>Substratabhängigkeit</i>	182
3.5. <i>Naturschutzrelevante Problembereiche</i>	184
3.5.1. <i>Gefährdungsursachen</i>	184
3.5.2. <i>Schutzmaßnahmen</i>	186

Zusammenfassung

Im Rahmen eines zoologischen Grundlagenforschungsprogrammes wurden im Bereich der NSG Bangser Ried und Bangs-Matschels sowie angrenzenden Gebieten an der Unteren Ill (Feldkirch/Meiningen, Vorarlberg, Österreich) die Schmetterlingszönosen erhoben. Das Inventar umfaßt einschließlich subrezenter und historischer Meldungen 1148 Arten, das sind mehr als 50% des gesamten Vorarlberger Artenbestandes. Insgesamt 35 Arten wurden erstmals in Vorarlberg registriert, darunter auch 3 Neufunde für Österreich: *Dryadula irinae*, *Argyresthia trifasciata*, *Epermenia falciformis*. Die einzelnen Taxa werden tabellarisch aufgelistet, soweit bekannt mit Informationen zu: Raupenfutterpflanzen, Lebensraumansprüchen in Mitteleuropa bzw. im Untersuchungsgebiet, Fundpunkte, Phänologie, Bestandessituation bzw. Rote Listen-Vertreter, Vorkommen im NSG Rugeller Riet (FL) und NSG Rheindelta, Zeitraum des letzten Nachweises.

Im UG konnten einige Lepidopterenvorkommen von überregionaler-nationaler Bedeutung festgestellt werden, vor allem in den relativ feuchten Gebieten des NSG Bangser Ried SE sowie im Unterried. Darunter befinden sich extrem bedrohte Taxa wie *Epermenia falciformis*, *Coenonympha oedippus*, *Diachrysia nadeja*, *Eucartha amethystina* oder *Paradiarsia punicea*. *Ancylis rhenana* besitzt in den Streuwiesen des UG das einzige weltweit bekannte Vorkommen. Insgesamt ist aber verglichen mit subrezentem bis historischen Angaben ein drastischer Artenschwund (ca. 1/6 der Arten wurde in den letzten 25 Jahren nicht mehr registriert) zu verzeichnen, der insbesondere die hygrophilen Taxa der Riedwiesen sowie die xerothermophilen Arten der Trockenstandorte (Dammböschungen), aber auch Auwaldelemente betrifft. Besonders drastisch ist der Rückgang bei den gefährdeten Arten der nationalen Roten Liste. Von 146 insgesamt aus dem UG nachgewiesenen Rote Liste-Taxa wurden rezent nur mehr 79 nachgewiesen. Rote Listen-Arten finden sich exklusiv in den Riedwiesen, an den Trockenstandorten sowie in den Auwäldern, fehlen hingegen völlig in den Fettwiesen/Äckern sowie in Fichtenforsten.

Eine Analyse der Habitatbindung ergibt klare Präferenzen für Auwälder mit 681 hier nachgewiesenen Arten (573 exklusiv) bzw. für Riedwiesen mit 374 Arten (169 exklusiv). Den Trockenstandorten werden 105 Arten zugeordnet, wobei diese Flächen bereits vielfach zerstört sind. Ein drastischer Diversitätseinbruch ist in den intensivierten Wiesen/Weiden mit 52 Arten sowie in Fichtenforsten mit 40 Arten (2 exklusiv) zu verzeichnen.

Vergleiche zwischen den Streuwiesenkomplexen Bangser Ried SE, Unterried und Partenwiesen ergeben eine signifikante Abnahme hygrophiler Arten von Süden nach Norden. Die Partenwiesen besitzen bereits eine stark degradierte Feuchtwiesenfauna.

Die Bindung an bestimmte Lebensräume ist eng mit dem jeweiligen Substratangebot korreliert. Dementsprechend ernähren sich mit 554 Taxa (452

exklusiv) ca. 2/5 des Artenbestandes von Laubhölzern, aber nur knappe 4% (66 spp., 44 exklusiv) von Nadelhölzern. Eine besonders wichtige Nahrungsgrundlage sind weiters krautige Pflanzen für insgesamt 493 Arten (361 exklusiv) sowie Gräser s.l. für 143 Arten (98 exklusiv). Flechten, Moose und tote pflanzliche Stoffe spielen hingegen diversitätsmäßig nur eine untergeordnete Rolle.

Naturschutzrelevante Probleme sind im UG äußerst vielfältig und werden im einzelnen diskutiert. Besondere Gefährdungen sind durch die zunehmende Austrocknung, Intensivierungen, unzureichende Pflegemaßnahmen sowie durch Verfichtung gegeben. Eine Renaturierung erscheint in weiten Bereichen dringend erforderlich und es werden zur Vermeidung weiterer naturschutzrelevanter Verluste entsprechende Vorschläge gemacht.

1. Einleitung - Zielsetzung

Bereits im Jahre 1974 wurden die durch Massenbestände der Sibirischen Schwertlilie (*Iris sibirica*) weithin bekannten Streuwiesen im Bereich zwischen Unterer Ill und Rhein sowie die großflächigen Auwaldbereiche durch Landesverordnung geschützt. Seit dieser legislativen Umsetzung zur Rettung einer der großflächigsten naturnahen Landschaften im gesamten Alpenrheintal ergeben sich immer wieder Interessenskonflikte zwischen Naturschutz einerseits sowie Land- und Forstwirtschaft andererseits. Die Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels (Feldkirch) stehen aber auch durch Bestrebungen für Kraftwerksbauten an der Unteren Ill immer wieder im öffentlichen Blickpunkt. Eine akute Bedrohung der Gebiete ist trotz bestehendem Schutzstatus durch Intensivierungsmaßnahmen, aber auch durch einen vor allem in den letzten 10-15 Jahren dramatischen Rückgang des Grundwasserpegelstandes und die damit einhergehende zunehmende Austrocknung gegeben.

Die Vorarlberger Naturschau in Dornbirn hat mit Beginn des Jahres 1994 ein zoologisches Grundlagenforschungsprogramm im Lande initiiert, um für künftige Problemstellungen bereits auf rezentes Datenmaterial zurückgreifen zu können. Als wichtiger Teilbereich wurden die, teilweise noch sehr mangelhaft untersuchten, aber von ihrer Aussagekraft über Veränderungen in bestimmten Lebensräumen (Bioindikatoren) äußerst wertvollen Insekten erkannt. Schmetterlinge spielen dabei auf Grund ihrer hohen Artenzahlen und zahlreicher Spezialisten eine wichtige Rolle und sind bedingt durch ihre Bindung an Pflanzen (phytophage Lebensweise) repräsentativ für einen entscheidenden Faunenbestandteil. Es wurde daher ein Forschungsauftrag zur Untersuchung der Lebensgemeinschaften dieser Ordnung und ergänzend anderer Gruppen mit schwerpunktmäßig räuberischer Lebensweise (Spinnen und Käfer) im Gebiet der Unteren Ill erteilt.

Dank: Diese Studie wurde dankenswerterweise von der Vorarlberger Naturschau materiell und ideell gefördert, wofür hier Frau Direktor Dr. Margit SCHMID (Dornbirn) auf das herzlichste gedankt sei. Für weitere Subventionsmittel durch die Arbeitsgruppe Ökologie, im Rahmen der flußbaulichen Studien, danke ich Herrn Univ. Prof. Dr. Georg GRABHERR (Wien). Die Geländeerhebungen wurden tatkräftig durch Herrn Toni MAYR (Feldkirch) unterstützt, der auch sein Datenmaterial für Auswertungen zur Verfügung stellte. Für diverse

Hinweise, unveröffentlichte Daten, Bildmaterial und/oder Begleitung bei den Freilandhebungen danke ich schließlich den Herren Dr. Eyjolf AISTLEITNER (Feldkirch), Mag. Markus GRABHER (Hard), Dirk HAMBORG (+) (Feldbach), Roland MÜLLER (St. Gallen) und Gerold KILZER (Feldkirch). Schließlich gebührt Herrn Dr. Mario F. BROGGI (Schaan) sowie Herrn Dipl. Vw. Siegfried ERLEBACH (Innsbruck) bester Dank für die zur Verfügung gestellten Vegetationskarten bzw. Falterdias.

2. Untersuchungsgebiet, Methodik, Material

2.1 Gebietscharakterisierung

Das Untersuchungsgebiet (=UG) umschließt den gesamten Bereich der Unteren Ill (*Abb. 3*). Es wird im W und N vom Rhein begrenzt, im E durch die außerhalb der Oberau und Roten Au gelegenen waldfreien und großteils intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen sowie die Rüttenen, im S ca. durch die Mündung des Hämmerlekanals in die Ill sowie die Waldgrenze nördlich der Landesstraße L 53 von Nofels nach Bangs. Die spitzwinkelig von Ill und Rhein abgegrenzten Gebiete sind seit 1974 zu einem überwiegenden Anteil dem Naturschutzgebiet Matschels zugehörig. Als unmittelbar angrenzendes Vergleichsgebiet wurde aber auch noch das NSG Bangser Ried, umgrenzt von der österreichisch-liechtensteinischen Landesgrenze im S, der Landesstraße L 53 von Feldkirch-Bangs-Schweiz bzw. der Ortschaft Bangs im N, dem Rhein im W und einem Flurweg zwischen Bangser Mäher und Altenried im E, berücksichtigt.

Das Untersuchungsgebiet umfaßt einerseits die größten geschlossenen Waldareale (ca. 450 ha) des Alpenrheintales, andererseits aber auch großflächige Streuwiesen sowie intensiv bewirtschaftete Gebiete, entstanden aus ehemaligen Rodungsinseln, vor allem das Unterried mit einer Fläche von 50 ha und die Partenwiesen mit 36 ha. Besonders im linksseitigen Ill- sowie im rechtsseitigen Rheinvorland dominieren Weideflächen bzw. im Hangbereich der Dämme Trockenstandorte.

Botanische Charakterisierung der Streuwiesen

Ausgedehnte Pfeifengraswiesen (Molinieten) überwiegend trockener Ausprägung, mit Übergängen zu xerothermen Florenelementen entlang des Rheines und Schilfröhricht (*Phragmitetum*) u.a. in der inneren Zone des Bangser Riedes. Besonders auffallend sind die reichen Bestände der Sibirischen Schwertlilie (*Abb. 2*). Teilweise starke intensivlandwirtschaftliche Einbrüche (Fettwiesen), vor allem im Bereich der Partenwiesen, im östlichen Unterried sowie im zentralen Teil des Bangser Riedes.

Botanische Charakterisierung der Auwaldbereiche (Abb. 1)

Überwiegend Eschen-Hartholzaue (*Pruno-Fraxinetum*), teilweise stark verficchtet, in einigen Bereichen reine Fichtenanpflanzungen. Schmale Weichholzaugürtel vor allem entlang der Ill, insbesondere als Grauerlen-Auwald (*Alnetum incanae*) ausgebildet. Relikte eines ehemaligen Silberweiden-Auwaldes (*Salicetum albae*) finden sich in Form von alten Silberweiden in den Partenwiesen. Im Bangserfeld sowie im Bereich der Partenwiesen Feldgehölze, Baumgruppen und freistehende Birken (Pioniergehölze).

Abb. 1 (l.): Auwald-
randbereiche mit alten
Eichen

Abb. 2 (r.): Das
Unterried ist für die
Massenvorkommen
der Sibirischen
Schwertlilie (*Iris
sibirica*) bekannt
(Foto: E. Aistleitner)

Übersicht über die wichtigsten Vegetationseinheiten im Untersuchungsgebiet:

Riedwiesen - Molinietalia caeruleae

Molinietum caeruleae, s.l., typische Pfeifengraswiese

Molinietum caeruleae, s.l., feuchte Ausprägung

Molinietum caeruleae, s.l., trockene Ausprägung

Molinietum caeruleae, basisch, niedere Pfeifengraswiese

Molinietum arundinaceae, hohe Pfeifengraswiese

Kalkreiche Kleinseggenrieder - (Scheuchzerio-Caricetetea fuscae):

Schoenetum nigricantis, Gesellschaft der Schwarzen Kopfbirse

Trockenvegetation

Fettwiesen

Auwälder

Weichholzau

Hartholzau (überwiegend Pruno-Fraxinetum)

Pruno-Fraxinetum, Reinbestand

Pruno-Fraxinetum, verfichtet

Waldrandgemeinschaften

Fichtenforste

Der geologische Untergrund besteht aus mehr oder weniger mächtigen Torfschichten mit Lehm-Sand-Einlagerungen auf Alluvialböden der Schwemmfächer von Ill und Rhein. Im Bereich der Illmündung überwiegt feinkörniges Schwemmmaterial, hier findet sich auch ein kleiner Helvetikum-Inselberg.

2.2 Untersuchungsstandorte

Eine flächendeckende Bearbeitung der Schmetterlingsbestände im UG war aus zeitlichen und technischen Gründen nicht möglich und es wurde daher eine Auswahl von repräsentativen Untersuchungsstandorten getroffen. Diese beinhalten alle im Untersuchungsgebiet vorherrschenden Vegetationsgesellschaften (Tab. 1, Abb. 3).

Tab. 1: Untersuchungsstandorte - botanische Charakterisierung

NR	FUNDORT	VEGETATION
1	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, NW, 430 m	„Molinietum arundinaceae; Molinietum caeruleae, s.l.; Fettwiesen; Zitterpappel-Eichenau, verfichtet; Schlehen-Weißdorn-Ligustergebüsch“
2	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, NW, 430 m	„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum arundinaceae; Weichholzaufragmente“
3	Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, N, 431 m	„Molinietum arundinaceae; Molinietum caeruleae, s.l.; Weichholzaufragmente“
4	Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, S, 431 m	„Molinietum caeruleae, basisch; Molinietum caeruleae, s.l.; Weichholzau; Schoenetum nigricantis“
5	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, W, 430 m	„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum arundinaceae; Weichholzaufragmente“
6	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, N (Rote Au), 430 m	„stark verfichtetes Pruno-Fraxinetum“

- 7 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, N, 430 m
„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum arundinaceae; Fettwiesen; Eschen-Eichen-Hartholzau, verfichtet“
- 8 Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, N, 431 m
„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum arundinaceae; Weichholzaufragmente“
- 9 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Partenwiesen, W, 430 m
„Molinietum arundinaceae; Fettwiesen; Weichholzau“
- 10 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Partenwiesen, SW, 430 m
„Molinietum arundinaceae; Fettwiesen; Weichholzaufragmente; Fichtenforst“
- 11 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, NW, 430 m
„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum arundinaceae; Fichtenforst; Weichholzaufragmente“
- 12 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, N, 430 m
„Eichen-Eschen-Hartholzau, verfichtet“
- 13 Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, Zollamt-Rheindamm, 435 m
„Mesobrometum; Weichholzaufragmente“
- 14 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels E, Illdamm, 435 m
„Fichtenforst; Fettwiesen; Weichholzaufragmente“
- 15 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Bergle, 430 m
„Molinietum arundinaceae; Pruno-Fraxinetum; Fichtenforst“
- 16 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Bergle, 440 m
„Pruno-Fraxinetum“
- 17 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, S, 430 m
„Molinietum arundinaceae; Molinietum caeruleae, s.l.; Fettwiesen; Eichen-Eschen-Hartholzau, verfichtet“
- 18 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels SW, Rote Au-Baganell, 430 m
„Pruno-Fraxinetum, schwach verfichtet“
- 19 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels N, Auwald, 430 m
„Pruno-Fraxinetum; Fichtenforst“
- 20 Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, S, 431 m
„Molinietum arundinaceae; Molinietum caeruleae, basisch; Molinietum caeruleae s.l.; Weichholzau“
- 21 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Bergle, 435 m
„Pruno-Fraxinetum, schwach verfichtet“
- 22 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, SW, 430 m
„Molinietum caeruleae s.l.; Molinietum arundinaceae; Fettwiesen; Eichen-Eschen-Hartholzau, verfichtet“
- 23 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, SW (Rote Au), 430 m
„Pruno-Fraxinetum, verfichtet“
- 24 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried, 430 m
„Molinietum caeruleae, s.l.; Molinietum caeruleae, basisch; Molinietum arundinaceae“
- 25 Meiningen, Illmündung-Illdamm, 430 m
„Weichholz-Hartholzau; Pruno-Fraxinetum, verfichtet“
- 26 Meiningen, Illmündung-Illdamm, 430 m
„Trockenrasenfragmente; Eichen-Eschen-Hartholzau“
- 27 Meiningen, Rheindamm-Zollamt, 430 m
„Pruno-Fraxinetum, verfichtet; Mesobrometum; Fettwiesen“
- 28 Feldkirch-Bangs, NSG Bangser Ried, S, 431 m
„Molinietum caeruleae, basisch; Molinietum caeruleae, s.l.“
- 29 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Illdamm, 430 m
„Fichtenforst; Fettwiesen; Weichholzaufragmente“
- 30 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels E, Rote Au, 430 m
„Pruno-Fraxinetum, stark verfichtet“
- 31 Feldkirch-Gisingen, Rote Au (mittlerer Bereich), 430 m
„Pruno-Fraxinetum, verfichtet“
- 32 Feldkirch-Bangs, NSG Matschels S, Rote Au, 430 m
„Pruno-Fraxinetum, verfichtet“

Da annähernd 90% der mitteleuropäischen Lepidopterenarten nachtaktiv sind, lag der methodische Schwerpunkt in der Erhebung dieses Faunenbestandes. Durch den gleichzeitigen Einsatz automatischer Lebendlichtfallen sowie von persönlichen Lichtfängen konnten jeweils mehrere Untersuchungsflächen gleichzeitig bearbeitet werden. Die mit einem Dämmerungsrelais ausgestatteten Lichtfallen (Abb. 4) waren bis auf wenige Beobachtungsnächte (Herbst) durchgehend die gesamte Nacht in Betrieb und wurden tagsüber ausgewertet. Der Lichtfang wurde von Juni bis August meist über die gesamte Nacht betrieben, um auch spät fliegende Arten feststellen zu können. Weitere wichtige Registrierungstechniken waren das visuelle Absuchen der Vegetation nach Imagines bzw. Raupen und deren Fraßspuren sowie Handfänge im Gelände zur Erfassung tagaktiver Schmetterlinge. Ergänzend wurden schließlich noch einige Arten durch nächtlichen Fang an Marmeladeköder registriert.

Auf Grund der Mobilität der Imagines war eine Punktgenauigkeit der Aufsammlungen nur beschränkt möglich. Ganz besonders betrifft dieser Umstand die nachtaktiven und durch künstliche Lichtquellen angelockten Arten. Die jeweiligen Aufnahmeflächen umfassen daher einen Durchmesser von ca. 50 bis maximal 100 m und berücksichtigen somit in fast allen Fällen die tatsächlich besiedelten Lebensräume. Eine Zuordnung zu den Vegetationseinheiten erfolgte schließlich empirisch, basierend auf den Raupenfutterpflanzen und den bereits bekannten Informationsgrundlagen über Habitatansprüche einzelner Arten, teilweise aber auch durch direkte Larvalnachweise.

Abb. 4: Lichtfalle

Abb. 5: *Lycia zonaria* ist ein seltener Spanner eher trockener Molinieten (Foto: S. Erlebach)

Schwerpunkt der Untersuchungen war eine Aufsammlung von Datenmaterial. Die einzelnen Datensätze wurden auf dBase IV-Basis erfaßt und in die Datenbanken der Vorarlberger Naturschau bzw. des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum übernommen. Insgesamt wurden ca. 10 000 Datensätze erfaßt, ca. 2/5 davon umfassen historische bzw. subrezente Angaben, 3/5 rezente Meldungen der Jahre 1994 und 1995.

2.4 Datum und Standorte der Begehungen

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die während der Vegetationsperioden 1994 und 1995 vom Autor durchgeführten 173 Geländeerhebungen. Es werden angeführt: Tag (=T), Monat (=M) und Jahr (=J) der Erhebung, Fundort (=F), Registrierungsmethodik (=ME) (LFG=Lichtfang; LFA=Lichtfalle; TAG=Erfassung mittels Käschers bzw. visuell. Bzgl Standorte s. *Abb. 3*.)

In den Auswertungen werden zusätzlich die durch Herrn T. MAYR (Feldkirch) rezent erhobenen Datensätze berücksichtigt.

Tab. 2: Datum und Standorte der Erhebung

T	M	J	F	ME	T	M	J	F	ME
10	03	1994	1	LFG	23	09	1994	28	LFA
10	03	1994	2	LFA	24	09	1994	29	TAG
10	03	1994	3	LFA	25	09	1994	3,8	TAG
10	03	1994	4	LFA	14	10	1994	3	LFG
25	03	1994	1	LFG	14	10	1994	18	LFA
25	03	1994	2	LFA	30	10	1994	16	LFG
25	03	1994	5	LFA	31	10	1994	15	LFA
25	03	1994	4	LFA	31	10	1994	18	LFA
27	03	1994	6	TAG	25	03	1995	16	LFG
16	04	1994	7	LFG	25	03	1995	15	LFA
16	04	1994	8	LFA,TAG	25	03	1995	9	LFA
16	04	1994	4	LFA	25	03	1995	18	LFA
16	04	1994	1	LFA	25	03	1995	4	LFA
10	05	1994	4	LFA,TAG	04	04	1995	3	LFG
10	05	1994	9	LFA,TAG	04	04	1995	10	LFA
10	05	1994	10	LFA	04	04	1995	4	LFA
10	05	1994	11	LFG,TAG	23	04	1995	22	LFG
11	05	1994	13	TAG	23	04	1995	23	LFA
11	05	1994	14	LFA,TAG	23	04	1995	32	LFA
11	05	1994	12	LFG	23	04	1995	4	LFA,TAG
11	05	1994	15	LFA	24	05	1995	28	LFG
11	05	1994	16	LFA	24	05	1995	3,13	LFA
28	05	1994	9	TAG	24	05	1995	3	LFA
28	05	1994	11	TAG	24	05	1995	18	LFA
28	05	1994	1	LFA	25	05	1995	4	TAG
28	05	1994	4	LFA,TAG	25	05	1995	7	TAG
28	05	1994	30	LFA	25	05	1995	16	LFG
03	06	1994	17	LFG	25	05	1995	15	LFA
03	06	1994	9	LFA	25	05	1995	19	LFA
03	06	1994	10	LFA	25	05	1995	19	LFA
03	06	1994	18	LFA	03	06	1995	10	LFG
04	06	1994	16	LFA	03	06	1995	9	LFA
04	06	1994	19	LFA	03	06	1995	8	LFA
08	06	1994	20	LFG	04	06	1995	7	LFG
08	06	1994	4	LFA	04	06	1995	12	LFA

08	06	1994	15	LFA
08	06	1994	19	LFA
15	06	1994	1	LFG
15	06	1994	16	LFA
15	06	1994	19	LFA
15	06	1994	10	LFA
23	06	1994	21	LFG
23	06	1994	15	LFA
23	06	1994	21	LFA
23	06	1994	19	LFA
01	07	1994	28	TAG
01	07	1994	10	LFG
01	07	1994	28	LFA
01	07	1994	4	LFA
01	07	1994	18	LFA
02	07	1994	7	LFG,TAG
02	07	1994	7	LFA
02	07	1994	12	LFA
03	07	1994	25	TAG
11	07	1994	20	LFG
11	07	1994	10	LFA,TAG
12	07	1994	4	TAG
12	07	1994	24	TAG
12	07	1994	15	TAG
23	07	1994	31	TAG
23	07	1994	18	LFA,TAG
23	07	1994	18	LFA
24	07	1994	4,20	TAG
31	07	1994	22	LFG
31	07	1994	23	LFA
31	07	1994	15	LFA
31	07	1994	19	LFA
13	08	1994	24	TAG
14	08	1994	25	LFG
14	08	1994	16	LFA
14	08	1994	26	LFA
16	08	1994	27	TAG
16	08	1994	10	LFG
16	08	1994	18	LFA
16	08	1994	4	LFA
27	08	1994	7	LFG,TAG
27	08	1994	7	LFA
27	08	1994	12	LFA
28	08	1994	28	LFG
28	08	1994	4	LFA
29	08	1994	30	TAG
29	08	1994	29	TAG
29	08	1994	15	TAG
10	09	1994	5,22	TAG
11	09	1994	1	TAG
23	09	1994	11	LFG
23	09	1994	1	LFG,LFA

04	06	1995	17	LFA
20	06	1995	18	LFA
20	06	1995	10	LFA
20	06	1995	13	TAG
20	06	1995	20	LFA
20	06	1995	20	LFG
01	07	1995	17	LFG
01	07	1995	7	LFA
01	07	1995	23	LFA
01	07	1995	5	LFA
02	07	1995	28	TAG
02	07	1995	3	TAG
02	07	1995	9	TAG
02	07	1995	5	TAG
02	07	1995	9	LFG
02	07	1995	9	LFA
02	07	1995	18	LFA
15	07	1995	16	LFA
15	07	1995	14	LFA
16	07	1995	4	TAG
16	07	1995	20	LFG
16	07	1995	20	LFA
16	07	1995	4	LFA
17	07	1995	17	LFG
17	07	1995	24	LFA
17	07	1995	17	LFA
04	08	1995	7	LFG
04	08	1995	17	LFA
04	08	1995	12	LFA
05	08	1995	14	LFA
05	08	1995	16	LFA
06	08	1995	24	TAG
06	08	1995	10	TAG
06	08	1995	3	TAG
06	08	1995	30	TAG
23	08	1995	28	LFG
23	08	1995	9	LFA
23	08	1995	10	LFA
24	08	1995	24	LFG
24	08	1995	18	LFA
24	08	1995	3	LFA
17	09	1995	16	LFG
17	09	1995	14	LFA
17	09	1995	15	LFA
18	09	1995	24	TAG
18	09	1995	8	TAG
18	09	1995	23	TAG
18	09	1995	33	TAG
18	09	1995	20	LFG
18	09	1995	13	LFA
18	09	1995	13	LFA

2.5 Historisches bzw. subrezentes Datenmaterial

Problematisch bleibt die exakte geographische Zuordbarkeit der älteren Fundangaben aus dem Untersuchungsgebiet. Trotzdem sind auch diese von erheblicher Aussagekraft, da sie Veränderungen in der Faunenzusammensetzung dokumentieren. Es wurden daher alle greifbaren Informationen, die teilweise bereits 70 Jahre zurückreichen, berücksichtigt.

In *Tabelle 3* werden die Fundorte im unmittelbaren Untersuchungsgebiet bzw. in seinem Randbereich gelegene Lokalitäten aufgelistet, deren historische bzw. subrezente Angaben für diese Studie verwertet wurden. Eine genaue Lokalisierung ist nur beschränkt möglich, vor allem betrifft dies die Angaben aus „Bangs“. Auch die Vegetationsangaben sind lediglich ein grober Hinweis, da die tatsächlichen Verhältnisse zum Teil nicht mehr rekonstruierbar waren.

Nr.	Fundort	Höhe	Vegetation
I	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Unterried	430	Riedwiesen, verfichtete Hartholzau
II	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Partenwiesen	430	Riedwiesen, Fettwiesen, Weichholzaufragmente, Hartholzau
III	Feldkirch-Bangs-Nofels, NSG Matschels, Rote Au	430	verfichtete Hartholzau
IV	Feldkirch-Bangs, NSG Matschels, Bergle	440	verfichtete Hartholzau, Weichholzaufragmente, Riedwiesen, Trockenstandorte
V	Feldkirch-Meiningen, Illmündung	430	Weichholzaufragmente, verfichtete Hartholzau, Trockenstandorte
VI	Feldkirch-Nofels, Illdamm	430	Weichholzaufragmente, Trockenstandorte
VII	Feldkirch-Gisingen, Illdamm	430	Weichholzaufragmente, Trockenstandorte
VIII	Feldkirch-Gisingen, Illau	430	verfichtete Hartholzau
IX	Feldkirch-Bangs	430	?
X	Feldkirch-Bangs, Rheinau	430	Weichholzau, ?Hartholzau, Riedwiesen
XI	Feldkirch-Bangs, Rheindamm	430	Trockenstandorte
XII	Meiningen, Rote Au	430	verfichtete Hartholzau
XIII	Meiningen, Zollamt	430	verfichtete Hartholzau, Riedwiesen, Trockenstandorte

3. Ergebnisse - Diskussion

3.1 Artenbestand

Die folgende Bestandesanalyse stützt sich im wesentlichen auf eine Beurteilung der einzelnen Arten als Komponenten einer standortscharakteristischen Lepidopterenzönose. Insgesamt liegen bis heute Meldungen über 1148 Schmetterlingsarten aus dem gesamten Bereich an der Unteren Ill vor. Dies sind mehr als 50% des gesamten Artenbestandes Vorarlbergs. In den Jahren 1994 und 1995 wurden 841 Arten registriert.

3.1.1 Arteninventar-Familienspektrum

Die Artenliste (Anhang S. 190 - 202) gibt ein Kompendium über die bisher im UG registrierten Schmetterlinge. Die Artengarnituren des UG verteilen sich auf 59 Familien (Abb. 6 und 7). Erwartungsgemäß sind die Eulenfalter (Noctuidae) mit einem Gesamtanteil von 19% (224 spp.) in der höchsten Diversität vertreten. Bedingt durch die walddreichen Biozönosen erreichen die Spanner (Geometridae) mit 16% (178 spp.) und die Wickler (Tortricidae) mit 13% (147 spp.) überraschend hohe Diversitätswerte. Mit mehr als 30 Arten sind immerhin noch folgende Familien vertreten: Crambidae (Graszünsler) (54 spp.), Gracillariidae (Blattdütenmotten) (44 spp.), Coleophoridae (Sackträgermotten) (41 spp.), Gelechiidae (Palpenmotten) (39 spp.) und Nepticulidae (Zwergmotten) (32 spp.), ebenfalls bedeutend sind noch Pyralidae (Zünsler) (28 spp.), Nymphalidae (Edelfalter) (26 spp.), Lycaenidae (Bläulinge) (25 spp.), Notodontidae (Zahnspinner) (25 spp.), Arctiidae (Bärenspinner) (21 spp.) und Yponomeutidae (Gespinstmotten) (21 spp.). Insgesamt 44 Familien (18% des Gesamtartenbestandes) weisen Artenzahlen zwischen 1 und 15 auf und sind somit mit weniger als 2% an der Gesamtfaua beteiligt.

Abb. 6: Artenzahlen/
Familie

Abb. 7: Familienspektrum

3.1.2 Bemerkenswerte Arten

Die NSG Bangser Ried und Matschels weisen einen hohen Anteil an stenotopen Arten, vielfach mit deutlichen Bestandesrückgängen in Vorarlberg, oder generell im mitteleuropäischen Raum auf. Insgesamt wurden 35 Arten erstmals für Vorarlberg nachgewiesen, davon drei auch neu für Österreich. Im folgenden wird eine - auf Grund der hohen Artenzahlen - eingeschränkte Auswahl an faunistisch bemerkenswerten und/oder wegen ihrer ökologischen Ansprüche besonders interessanten Schmetterlingsarten gegeben. Berücksichtigt werden beinahe ausschließlich rezent nachgewiesene Arten. Von allen behandelten Arten werden die Verbreitung in Vorarlberg sowie Ökologie, Bestandessituation und Gefährdungsursachen diskutiert.

0162 *Pseudopostega crepusculella* (ZELLER, 1839)

FUNDORTE: 7,20.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher erst ein historischer Nachweis aus Göfis sowie rezent aus dem NSG Rheindelta.

ÖKOLOGIE: Die Fraßpflanze und Lebensweise der Raupe ist unbekannt, als mögliches Substrat wird von verschiedenen Autoren *Mentha* vermutet. Die Art ist auf Feuchtbiootope beschränkt und besiedelt im UG Molinieten unterschiedlicher Ausprägung. Imagines wurden vor allem während der Dämmerung von Anfang bis Mitte Juli registriert.

GEFÄHRDUNG: Bedingt durch die Stenotopie der Imagines ist *crepusculella* als stark gefährdet einzustufen.

0317x *Dryadula irinae* (SAVENKOV, 1989)

FUNDORT: 14.

VERBREITUNG VORARLBERG: Das einzige aus Mitteleuropa bekannte Exemplar stammt aus dem orographisch linksseitigen Bereich des Illdamms.

ÖKOLOGIE: Die ökologischen Ansprüche, insbesondere Habitat- und Substratwahl dieser höchst interessanten Art sind unbekannt. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sprechen entweder für eine lichenophage oder xylophage Lebensweise der Raupen. Das einzige Exemplar wurde Mitte Juli mittels einer Lichtfalle nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Die Gefährdungssituation läßt sich zur Zeit nicht abschätzen. Solange aber keine detaillierteren biogeographisch-ökologischen Informationen vorliegen, ist ein konkreter Schutz der Population, falls überhaupt direkte Maßnahmen nötig sein sollten, äußerst schwierig.

BEMERKUNGEN: Der Nachweis dieser von GAEDIKE (in litt.) determinierten Art, die erst 1989 in der Gattung *Archimeessia* beschrieben wurde, erscheint äußerst bemerkenswert. *D. irinae* weist äußerst charakteristische, asymmetrische Genitalstrukturen auf, die das Taxon unverwechselbar machen. Bisher war lediglich das Typenmaterial aus Lettland bekannt, eine weitere Verbreitung kann aber auf Grund des nunmehrigen Nachweises aus Österreich angenommen werden.

0416 *Caloptilia robustella* JÄCKH, 1972

FUNDORT: 20.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Die Art erzeugt als Raupe gattungstypische Jugendminen und anschließend Blattrollen an *Quercus*. Im Gegensatz zur ebenfalls an Eiche gebundenen und mit der Fraßpflanze weit verbreiteten 0415 *C. alchimiella*, tritt *robustella* viel lokaler auf und wurde lediglich einmal Mitte Juli registriert. Die Art ist stellvertretend für einige im UG auftretende *Phyllonorycter* spp. ein guter Indikator für intakte alte Eichenbestände.

GEFÄHRDUNG: Weitere Vorkommen in Vorarlberg sind einigermaßen wahrscheinlich, bedingt durch die Entfernung geeigneter alter Eichen ist die Art aber als gefährdet anzusehen.

0426 *Calybites phasianipennella* (HÜBNER, 1813)

FUNDORTE: 1,4,17,20,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Ansonsten nur aus dem NSG Rheindelta nachgewiesen.

ÖKOLOGIE: Die Raupen erzeugen unterseitige Faltenminen und später auffällige Blattrollen an *Lysimachia vulgaris*, in anderen Teilen des Areals auch an *Polygonum* und *Rumex*. Im UG wurden die Art bisher nur in den relativ feuchten Bereichen des NSG Bangser Ried sowie im Unterried festgestellt, oft in sehr hoher Individuendichte. Hauptflugzeit ist die Periode von Mitte Juli bis Ende August, sowie nach der imaginalen Überwinterung im Frühjahr.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist in Vorarlberg vermutlich in den noch vorhandenen Streuwiesen verbreitet, Nutzungsänderung bedeutet jedoch Vernichtung der derzeit starken Populationen.

BEMERKUNG: Die an *Lysimachia* lebenden Populationen unterscheiden sich konstant von jenen anderer Futterpflanzen und wurden als Form beschrieben. Der

taxonomische Status bleibt allerdings zu klären, da es sich dabei möglicherweise um eine gute Art handelt.

0564 Prays ruficeps (HEINEMANN, 1854)

FUNDORTE: 7,12,15,16,17,19,V.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt gewesen.

ÖKOLOGIE: Die Raupen leben ausschließlich in den Knospen von *Fraxinus* und sind dementsprechend vor allem auf feuchte Gehölze und im UG auf die Hartholzaubestände angewiesen. Die nahe verwandte, habituell aber deutlich unterschiedene *0563 Prays fraxinella* lebt ebenfalls an Eschen, allerdings univoltin vom Herbst bis zum Frühjahr, zuerst minierend in den Blättern, später unter der Rinde und schließlich zwischen einem versponnenen Jungtrieb. *P. ruficeps* wurde im UG regelmäßig im Bereich der Eichen-Eschen-Hartholzaue registriert.

GEFÄHRDUNG: Derzeit keine aktuelle Gefährdung ersichtlich und vermutlich in geeigneten Lebensräumen Vorarlbergs weiter verbreitet.

0577x Argyresthia trifasciata (STAUDINGER, 1871)

FUNDORTE: 7,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis! Neu für Österreich!

ÖKOLOGIE: Die Art ist an *Juniperus* gebunden und es erscheint daher zweifelhaft, ob sie im UG autochton ist. Das ursprüngliche Areal erstreckt sich vor allem auf die Südwestalpen, wo besonders *Juniperus sabina* als natürliche Fraßpflanze dient. Inzwischen hat sich *trifasciata* aber in viele Teile Europas ausgebreitet und besiedelt sekundär angepflanzte Wacholderbüsche in Gartenanlagen. Die beiden Ende Mai 1995 im UG registrierten Imagines dürften sich in einer aktiven Ausbreitungsphase befunden haben.

0741 Coleophora kuehnella (GOEZE, 1783)

FUNDORTE: 8,17.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Stenotope Art wärmebegünstigter Laubwälder mit Beständen alter Eichen. Die Raupen sind ebenso wie ein weiterer Neufund für Vorarlberg aus dem UG, *0742 C. ibipennella*, ausschließlich an *Quercus* gebunden. Die wenigen nachgewiesenen Imagines wurden Anfang Juli mittels Lichtfang nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Eine direkte Bedrohung ist derzeit im UG nicht gegeben.

0744 Coleophora zelleriella HEINEMANN, 1854

FUNDORTE: 7,12,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Charakterart feuchter Auebüsche und von Weichholzaunen. Die Raupen ernähren sich exklusiv von *Salix*. Imagines wurden mehrfach von Anfang bis Mitte Juli am Licht registriert.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist im UG derzeit ungefährdet. Lediglich eine umfassendere Entfernung der Verbuschungsstadien würde sich auf die Bestände negativ auswirken. Die Bestände sind aber in Mitteleuropa durch Biotopvernichtung deutlich rückläufig.

0833 *Coleophora inulae* WOCKE, 1876

FUNDORTE: 17,20.

VERBREITUNG VORARLBERG: *C. inulae* war bisher lediglich aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Charakterart niedriger bzw. typischer Pfeifengraswiesen eher feuchter Ausprägung mit entsprechenden Beständen von *Inula spp.* und/oder *Pulicaria*. Die Imagines wurden mehrfach Mitte Juli 1995 registriert und scheinen im UG stärkere Populationen als zB. im Rheindelta zu besitzen.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist durch Austrocknung, Verkrautung sowie potentiell durch eine konsequent frühzeitig durchgeführte Mahd erheblich gefährdet.

0864 *Coleophora wockeella* ZELLER, 1849

FUNDORTE: 1,4,7,28,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Außer den Funden im UG existieren nur wenige historische Nachweise aus dem Bereich Feldkirch-Koblach.

ÖKOLOGIE: Charakterart feuchter Molinieten mit reichen Beständen der Futterpflanze, *Stachys officinalis*. Sowohl die Imagines als auch die Raupensäcke wurden nicht selten im NSG Bangser Ried E sowie im Unterried nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist durch zunehmende Austrocknung stark gefährdet.

0918 *Elachista monosemiella* (RÖSSLER, 1881)

FUNDORTE: 4,15,20,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Charakterart für schilffreie Seeufer und Flachmoore. Die Raupen leben minierend in 2 Generationen von Oktober bis April und im Juni/Juli in den Blättern von *Phalaris arundinacea*. Die Sommergeneration entwickelt sich auch in *Phragmites*. Bevorzugte Lebensräume im UG sind die schilffreien Molinieten.

GEFÄHRDUNG: Die Art überlebt auf Grund des in der Pflanze überwinterten Raupenstadiums nur in ungemähten Bereichen.

1068 *Semioscopis strigulana* (FABRICIUS, 1775)

FUNDORTE: 1,16.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur 1 historischer Nachweis aus dem Walgau.

ÖKOLOGIE: Charakterart feuchter bis mäßig trockener Gehölze. Die Raupen ernähren sich monophag von *Populus tremula*. Die Art ist im UG vor allem auf den an Zitterpappeln reichen Auwaldbereich NW des Unterriedes konzentriert, und wurde hier im März zahlreich nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Eine direkte Bedrohung ist derzeit im UG kaum gegeben. Die Bestände sind aber in Mitteleuropa durch Biotopvernichtung deutlich rückläufig.

1117 *Aplota palpella* HAWORTH, 1828

FUNDORT: 9.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: *A. palpella* ist eine in Österreich sehr zerstreut vorkommende Art, deren Raupen exklusiv an Moosen auf alten Laubbäumen fressen. Im NSG Bangs-Matschels wurde lediglich 1 Exemplar Anfang August 1995 durch T. MAYR

©inatura Dornbirn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at
nachgewiesen, das mit Sicherheit aus den Weichholzaufragmenten westlich der Partenwiesen stammt.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist trotz ihrer Seltenheit im UG derzeit kaum gefährdet.

1199 *Cosmopteryx ziegelerella* (HÜBNER, 1810)

FUNDORTE: 3,4,8.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Charakteristische Art der Weichholzaufragmente, im UG bisher nur im NSG Bangser Ried nachgewiesen, vermutlich aber weiter verbreitet. Die Raupen wurden im Herbst zahlreich an *Humulus lupulus* festgestellt, bevorzugt an leicht besonnten Pflanzen. Gleichzeitig mit dieser Art wurde an *Humulus* auch die in Österreich nur sehr zerstreut auftretende 0411 *Caloptilia fidella* nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Derzeit besteht im UG keine akute Gefährdung. Allerdings ist vor allem auf eine Förderung naturnaher Waldrandbereiche zu achten.

1261 *Monochroa servella* (ZELLER, 1839)

FUNDORTE: 20,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur in alten Funden aus Nofels sowie aus dem NSG Bangser Ried bekannt, rezent auch aus dem NSG Rheindelta.

ÖKOLOGIE: Eine monophag an Mehlprimel (*Primula farinosa*), möglicherweise auch an anderen Primelarten lebende Gelechiide. Die Raupen minieren im Mai in Blättern, später falten sie ein Blatt um und verpuppen sich schließlich in der Raupenwohnung.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist in Bayern gefährdet und weist österreichweit wenige, teils zerstörte Vorkommen auf (vgl. KLIMESCH, 1990). Im UG wurde *servella* im Bereich der Kleinseggenrieder registriert, in weiten Bereichen des ehemaligen Vorkommens dürfte die Art durch Intensivierungsmaßnahmen bereits ausgestorben sein..

1301 *Teleiodes waggae* (NOWICKI, 1860)

FUNDORTE: 15,21.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: *T. waggae* war bisher im Bundesgebiet, trotz ihrer Bindung an Corylaceae und ein dementsprechend vielfältiges Angebot an potentiellen Habitaten, lediglich aus der Steiermark sowie Niederösterreich bekannt. Im UG wurde die Art in wenigen Individuen von Anfang Juni bis Anfang Juli nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Keine Gefährdungsmomente erkennbar.

1328 *Gelechia cuneatella* DOUGLAS, 1852

FUNDORT: 10.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Eine trophisch an *Salix*, vor allem alte *Salix alba*-Bäume gebundene Art. Das einzige bisher bekannte Exemplar aus Vorarlberg wurde am 16.8.1994 im Bereich der westlichen Partenwiesen am Licht nachgewiesen und stammt hier mit Sicherheit von den alten Silberweiden.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist mittelfristig durch Rückgang der Weichholzaureste als Folge weiterer Austrocknungstendenzen gefährdet.

1505 *Brachmia blandella* (FABRICIUS, 1798)

FUNDORT: 14.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Diese an Magerwiesen und -weiden sowie an Trockenrasen gebundene Art besitzt im UG kaum mehr geeignete Lebensräume. Der einzige imaginale Nachweis wurde mittels Lichtfalle am 15.7.1995 im Bereich der reliktären Trockenvegetation am orographisch linksseitigen Ildamm getätigt.

GEFÄHRDUNG: *B. blandella* ist durch Eutrophierung bzw. zunehmende Beschattung der Trockenrasenfragmente an den Dammkronen der Ill akut gefährdet.

1522 *Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790) (Abb. 9)

FUNDORTE: 4,7,20,28,I,XIII.

VERBREITUNG VORARLBERG: Sehr lokal bis ca. 500 m im Walgau und Rheintal.

ÖKOLOGIE: Die Raupe des Rohrbohrers lebt monophag von August - zweimal überwintert - bis zum Frühjahr im Stengel von *Phragmites*, nahe der Basis. Die Art ist im UG beinahe exklusiv auf die feuchteren Bereiche des NSG Bangser Ried beschränkt, Einzelfunde stammen aus dem Unterried. Die Imagines treten univoltin von Ende Mai bis Ende Juli auf.

GEFÄHRDUNG: In Vorarlberg vom Aussterben bedroht, österreichweit gefährdet. Durch den Fraßort der Raupe nahe des Schaftes, dürfte die Mahd kaum populationsbedrohend sein, im UG scheint aber die zunehmende Austrocknung gefährdend.

1528 *Sesia bembeciformis* (HÜBNER, 1806)

FUNDORTE: 2,5.

VERBREITUNG VORARLBERG: Zweiter Nachweis für Vorarlberg! Der bisher einzige, noch unveröffentlichte Fund, stammt erst aus dem Jahr 1993 (leg. HAMBORG, AISTLEITNER & AISTLEITNER, in Vorb.).

ÖKOLOGIE: Dieser in Österreich nur äußerst lokal auftretende und bisher lediglich aus Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark und Kärnten nachgewiesene Glasflügler wurde im NSG Bangs-Matschels im westlichen Randbereich des Unterrieds registriert. Die Fraßgänge konnten dort in Stämmchen starker *Salix cinerea*-Büsche gefunden werden (HAMBORG in litt.).

GEFÄHRDUNG: *S. bembeciformis* ist ebenso wie andere Weichholzarten mittelfristig durch Rückgang der Weichholzaureste als Folge weiterer Austrocknungstendenzen gefährdet.

1538x *Synanthedon soffneri* SPATENKA, 1983

FUNDORT: 1.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Wie zahlreiche andere Sesien ernähren sich auch die *soffneri*-Raupen xylophag, allerdings für die Familie ungewöhnlicherweise an *Lonicera*. Die Art wurde erst 1983 nahe Prag entdeckt und 1993 auch in Österreich nachgewiesen (LASTUVKA & LASTUVKA, 1995). Der Fundort im NSG Bangs-Matschels (leg. HAMBORG) befindet sich im Bereich eines verlichteten Pruno-Fraxinetums.

GEFÄHRDUNG: Derzeit scheint diese bemerkenswerte Art im UG nicht gefährdet.

1645 *Eupoecilia sanguisorbana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)

FUNDORTE: 11,28,I,XII.

VERBREITUNG VORARLBERG: Ansonsten nur aus dem NSG Rheindelta sowie in einem nicht belegten historischen Fund aus dem Gamperdonatal bekannt.

ÖKOLOGIE: Die Raupen leben von Mitte Juli bis Ende September exklusiv in den bereits reifen Blütenköpfen von *Sanguisorba officinalis*. *E. sanguisorbana* ist nach Laborbefunden zumindest partiell bivoltin (HUEMER, 1988). Als Biotope kommen im UG alle Ausbildungen des Molinietums sowie basische Kleinseggenrieder in Frage, allerdings wurden im Unterried rezent nur mehr wenige Exemplare nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Durch eine konsequente frühe Septembermahd sind zumindest die sich später entwickelnden Raupen von Vernichtung bedroht. Für Bayern wird *sanguisorbana* als stark gefährdet eingestuft.

1843 *Celypha doubledayana* (BARRETT, 1872).

FUNDORTE: 4,20,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt sowie ein nicht belegter Nachweis aus dem Gamperdonatal.

ÖKOLOGIE: Raupenfutterpflanze und Biologie der Präimaginalstadien sind unbekannt! Die Art wird ausschließlich in Flachmooren gefunden und muß als stenotop eingestuft werden. Imagines wurden im UG sowohl tagaktiv als auch durch Lichtfang nachgewiesen, lokal in hoher Abundanz. Als charakteristische Lebensräume kommen vor allem kalkreiche Kleinseggenrieder sowie nährstoffarme basische Molinieten in Frage und die Art ist somit auf das NSG Bangser Ried SE beschränkt.

GEFÄHRDUNG: Die Gefährdungssituation ist auf Grund der fehlenden larvalbiologischen Informationen unklar. Eine Bedrohung durch Mineralstoffeintrag besteht vor allem in den Randbereichen zu bereits bestehenden intensivlandwirtschaftlichen Flächen.

2022 *Ancylis rhenana* MÜLLER-RUTZ, 1920

FUNDORTE: 7,17,20,24.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lediglich historische Nachweise aus der Gegend von Klaus. Die Art war bisher weltweit nur im Typenmaterial aus dem St. Galler Rheintal sowie in 2 durch GRADL gesammelten Tieren bekannt (BURMANN & HUEMER, 1984) und wurde seit 1920 nicht mehr gefunden!

ÖKOLOGIE: Charakterart des Molinietum caeruleae s.l. sowie deutlich seltener im Molinietum arundinaceae. Im UG wurde die Art von Anfang bis Mitte Juli zahlreich am Licht nachgewiesen, vor allem an feuchten Stellen des NSG Bangser Ried sowie im Unterried, fehlt aber in den Partenwiesen. Die Lebensweise der Präimaginalstadien ist unbekannt, möglicherweise leben die Raupen an *Lathyrus*.

GEFÄHRDUNG: Eine Bedrohung ist derzeit im UG möglicherweise durch Austrocknungstendenzen gegeben und die Bestände sollten auf Grund der Bedeutung des Vorkommens kontrolliert werden.

2141x *Epermenia falciformis* (HAWORTH, 1811)

FUNDORTE: 3,7,10,11,13,17,23,24.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis! Neu für Österreich!

ÖKOLOGIE: Die bisher weitgehend verkannte Art wurde vor allem in den artenreichen Molinieten mit entsprechenden Beständen von Doldenblütlern regelmäßig nachgewiesen. Die Raupen ernähren sich im Frühling an Blättern, im Spätsommer von Blüten und Früchten verschiedener Apiaceae, und Imagines wurden in 2 Generationen von Ende Mai bis Anfang Juli sowie von Anfang August bis Ende September nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: *E. falciformis* ist potentiell durch frühzeitige Mahd bedroht, ein Faktor der vermutlich dafür verantwortlich ist, daß die Art im NSG Rheindelta nicht nachgewiesen werden konnte. Die starken Populationen im UG sind derzeit die einzig bekannten Österreichs und dementsprechend besonders schutzbedürftig.

2203 *Oidaematophorus lithodactyla* (TREITSCHKE, 1833)

FUNDORTE: 7,9,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Rezent nur noch aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Die Raupen ernähren sich im Juni oligophag von *Inula* und/oder *Pulicaria*. Im UG wurden Anfang Juli vereinzelt Imagines registriert, die vor allem in der Abenddämmerung aktiv waren. *O. lithodactyla* besiedelt alle Typen von Pfeifengraswiesen mit entsprechendem Substratangebot.

GEFÄHRDUNG: Eine direkte Gefährdung besteht derzeit nicht, die Populationen dieser Art sind aber selbstverständlich nur durch Beibehaltung einer extensiven Bewirtschaftungsweise zu erhalten.

2178 *Stenoptilia pneumonanthes* (BÜTTNER, 1880)

FUNDORTE: 4,20,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Rezent nur noch aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Eine monophag an Lungen-Enzian (*Gentiana pneumonanthe*) gebundene Art, die nur noch an kleinflächigen Stellen im Bereich niedriger Pfeifengraswiesen bzw. in nassen Molinieten typischer Ausprägung zu finden ist (Bangser Ried SE). Während die 1. Raupengeneration im August in den Enzianfrüchten frißt, leben jene der 2. Generation im Oktober an Blättern und überwintern im Stengel.

GEFÄHRDUNG: Die im UG früher vermutlich viel weiter verbreitete Art besitzt durch Austrocknungstendenzen im Bereich Matschels keine geeigneten Biotope mehr. Auch die Populationen im Bangser Ried sind auf Grund von Nahrungsmangel akut bedroht. Verschärft würde die kritische Situation für diese Art durch eine flächendeckende Mahd im September, die derzeit allerdings nicht stattfindet. Für eine dauerhafte Erhaltung des Restvorkommens wären in Abstimmung mit weiteren bedeutenden Arten im Gebiet entsprechende Pflegepläne wichtig.

2341 *Chilo phragmitella* (HÜBNER, 1810)

FUNDORTE: 4,7,20.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: *C. phragmitella* ist eine hauptsächlich an *Phragmites* gebundene Art, 161

die aber auch von *Glyceria maxima* gemeldet wird. Die Raupe lebt im Herbst in der Halmspitze, im Frühjahr bohrt sie sich in die frischen Rohrstoppeln ein. Die Verpuppung findet ebenfalls im Stengel, dicht oberhalb des Wasserspiegels statt. Im UG wurde die Art nur vereinzelt, insbesondere in den ungemähten, relativ feuchten Molinieten des südöstlichen Bangser Riedes festgestellt. Im NSG Rheindelta tritt *phragmitella* zahlreich in Molinieten unterschiedlicher pflanzensoziologischer Zusammensetzung sowie in Großseggenriedern und Schilfröhricht auf.

GEFÄHRDUNG: Die Art kann sich nur in den jahrweise ungemähten Streuwiesen oder völlig unbewirtschafteten Röhrichtern und Großseggenriedern entwickeln. Durch die jährliche, flächendeckende Mahd bestehen daher im UG kaum mehr geeignete Überlebenschancen.

2348 *Crambus uliginosella* (ZELLER, 1850)

FUNDORTE: 4,7,20.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Charakterart feuchter Molinieten, im UG daher besonders in den niederen Pfeifengraswiesen des NSG Bangser Ried SE, Einzelnachweise aber auch aus dem Unterried. Die Lebensweise der Präimaginalstadien ist unbekannt, als potentielle Futterpflanzen kommen verschiedene Riedgräser in Frage.

GEFÄHRDUNG: Eine mittelfristige Bedrohung der Art ist durch die zunehmende Austrocknung der Streuwiesen gegeben.

2406 *Nymphula stagnata* (DONOVAN, 1806)

FUNDORTE: 10,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher liegen aus Vorarlberg nur 2 historische Nachweise aus Koblach und Röns sowie rezent aus dem UG vor.

ÖKOLOGIE: Die Raupen dieses ökologisch interessanten Zünlers minieren vom Herbst - überwinternd - bis in den Frühling unter der Wasseroberfläche in verschiedenen Wasserpflanzen, vor allem Igelkolben und Teichrosen. Stehende und langsam fließende Gewässer sind daher eine Grundvoraussetzung für die Existenz dieser Art. Im UG wurden lediglich 2 Imagines zwischen Anfang Juli und Ende August erfaßt.

GEFÄHRDUNG: Durch zunehmende Austrocknung der Gewässersysteme im Bereich des NSG Bangs-Matschels ist der Teichrosenzünsler hochgradig gefährdet.

2417 *Scoparia ancipitella* (LA HARPE, 1855)

FUNDORT: 17.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: *S. ancipitella* ist ebenso wie die ebenfalls erstmals aus Vorarlberg nachgewiesene 2418 *S. conicella* ein charakteristisches Faunenelement feuchter, wärmebegünstigter Laubwälder. Die Raupen aller *Scoparia*-Arten sind trophisch an Moose gebunden. Im UG tritt *ancipitella* sehr vereinzelt auf und es wurden nur wenige Imagines Mitte Juli am Licht registriert.

GEFÄHRDUNG: Außer der Tendenz zu einer zunehmenden Verfichtung besteht derzeit keine offensichtliche aktuelle oder potentielle Gefährdungssituation für diese Art.

2422 *Eudonia pallida* (CURTIS, 1827)

FUNDORTE: 4,20.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: *E. pallida* ist eine Charakterart niedriger Pfeifengraswiesen und wurde dementsprechend im UG exklusiv im südöstlichen Bangser Ried festgestellt. Die Lebensweise der an Moose gebundenen Raupen ist noch unzureichend bekannt, die Imagines wurden im UG univoltin von Anfang bis Mitte Juli durch Lichtfang und Lebendlichtfalleneinsatz registriert.

GEFÄHRDUNG: Zunehmende Austrocknung ist auch für diese Art eine erhebliche Bedrohung.

2543 *Lasiocampa trifolii* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

FUNDORTE: 3,7,22,24,I,V,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Einige alte Nachweise aus dem Walgau und Rheintal, allerdings galt die Art in Vorarlberg als ausgestorben bzw. verschollen (AIST-LEITNER, 1992).

ÖKOLOGIE: Der Kleespinner findet sich auf unterschiedlichen feuchten Wiesen mit extensiver Bewirtschaftung. Im UG wurde die Art insbesondere im Unterried registriert, wo die Imagines teilweise in erhöhter Abundanz von Ende Juli bis Ende August registriert werden konnten. Die Raupen ernähren sich polyphag von verschiedensten krautigen Pflanzen und Gräsern.

GEFÄHRDUNG: Eine direkte Bedrohung ist derzeit im UG kaum gegeben. Es handelt sich aber um die einzige noch bekannte Population Vorarlbergs.

2545 *Euthrix potatoria* (LINNAEUS, 1758)

FUNDORTE: 4,7,9,10,20,22,I,V,IX,X.

VERBREITUNG VORARLBERG: Auf die Riedwiesen der Tallagen des Rheintales und Walgaus beschränkt.

ÖKOLOGIE: Die Art bevorzugt stark vernässte Wiesen, Großseggenrieder und Schilfröhricht, wo sich die Raupen von verschiedenen Gräsern wie *Phragmites* ernähren. Die Imagines wurden im UG sowohl im Unterried als auch auf den Parthenwiesen selten nachgewiesen, häufiger im NSG Bangser Ried SE.

GEFÄHRDUNG: Eine österreichweit bedrohte Art, deren Populationen in Vorarlberg durch verschiedene anthropogene Maßnahmen wie Siedlungsbau und landwirtschaftliche Intensivierung vielfach bereits vernichtet bzw. stark dezimiert wurden und die Art in der lokalen Roten Liste als vom Aussterben bedroht angesehen wird. Im NSG Matschels dürfte die zunehmende Austrocknung bedrohend sein und bereits zu Rückgängen in der Individuendichte geführt haben.

2610b *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) (Abb. 8)

FUNDORT: V.

VERBREITUNG VORARLBERG: Aus den Tallagen kaum Meldungen (z.B. Hangender Stein bei Nüziders), im Gebirge noch weiter verbreitet.

ÖKOLOGIE: Der Apollofalter ist durch die monophage Lebensweise der Raupen an *Sedum album*-reiche Stellen angewiesen. Dementsprechend findet sich die Art vor allem auf felsigem Gelände montaner bis subalpiner Lagen. Die Population im

UG war anthropogen bedingt und konnte sich auf den südwestexponierten trockenen Dämmen, unmittelbar unterhalb der Hängebrücke ansiedeln. Hier war die Art noch bis Ende der 70iger Jahre massenhaft. Rezent konnte sie aber nicht mehr nachgewiesen werden.

GEFÄHRDUNG: Auf Grund der fortgeschrittenen Verbuschung im Bereich der Illmündung ist der Apollofalter trotz Aufnahme in das Washingtoner Artenschutzabkommen inzwischen ausgestorben!

2615 *Leptidea reali* REISSINGER, 1989

FUNDORT: 10.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis! Vermutlich ist die Art in den Streuwiesen der Tallagen weiter verbreitet, blieb aber bisher unerkannt.

ÖKOLOGIE: Die Lebensweise dieses erst vor wenigen Jahren erkannten und bisher mit dem allgemein verbreiteten Senfweißling (*2614 Leptidea sinapis*) vermengte Art ist noch wenig bekannt. Sie dürfte aber nach neuesten Untersuchungen schwerpunktmäßig auf feuchten Wiesen in tieferen Lagen vorkommen. Der einzige bisher mit Sicherheit für Vorarlberg nachgewiesene Falter wurde Anfang August 1995 im Bereich der westlichen Partenwiesen belegt und genitaldeterminiert.

GEFÄHRDUNG: Allfällige bedrohende Faktoren können erst bei weiteren ökologischen und biogeographischen Informationen ausgemacht werden. Auch die Gesamtverbreitung in Vorarlberg bleibt klärungsbedürftig, und vermutlich befinden sich unter den *sinapis*-Meldungen auch einige zu *reali*-gehörende Nachweise.

2636 *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758)

FUNDORTE: I,V,VIII,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lokal nachgewiesen vor allem aus dem Rheintal und Walgau.

ÖKOLOGIE: Der Große Schillerfalter ist im Raupenstadium auf besonnte Weiden angewiesen. Die Falter finden sich bevorzugt an Schlagflächen in den Auwäldern. Im UG war die Art noch in den 60er Jahren zahlreich anzutreffen. Inzwischen ist sie aber ebenso wie der Kleine Schillerfalter (*2637 Apatura ilia*) offensichtlich sehr selten geworden oder bereits ausgestorben.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist, sofern sie im Gebiet noch auftreten sollte, durch zunehmende Verbuschung bzw. Aufforstung von Waldlichtungen extrem bedroht.

2697 *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763)

FUNDORTE: 3,4,10,20,24,I,II,V,IX,X.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lokal nachgewiesen aus den Flachmooren des Rheintales und Walgaus in sehr geringer Elevation bis zu 570 m.

ÖKOLOGIE: Die Art bevorzugt als Larvalhabitat ungemähte Bereiche vor allem des Molinions, aber auch das Caricion davallianae sowie Brachestadien des Mesobromion (EBERT, 1992). Hier leben die Raupen im Spätsommer sowie nach der Überwinterung bis Juni an verschiedenen Süß- und Sauergräsern wie zB. *Carex acutiformis*, *Molinia caerulea*, *Bromus erectus*, *Festuca rubra* und *Calamagrostis*

epigejos. Im NSG Rheindelta besiedelt *dryas* vor allem die niederen Pfeifengraswiesen saurer Standorte, im UG wurde sie ebenfalls bevorzugt auf diesen Flächen angetroffen, allerdings auch in den viel trockeneren hohen Pfeifengraswiesen. Die Falter benötigen zusätzlich blütenreiche Biotope.

GEFÄHRDUNG: Der Blauäugige Waldportier weist in Vorarlberg dramatische Populationsrückgänge auf und sein baldiges Aussterben aufgrund von Lebensraumverlust wird befürchtet (AISTLEITNER, 1992). Wichtig für die Erhaltung der Art ist vor allem eine frühestens Mitte bis Ende September durchgeführte Mahd, da die Eiablage nur auf ungemähten Flächen erfolgt, bzw. eine Mahd in mehrjährigen Abständen für manche Parzellen.

2729 *Coenonympha oedippus* (FABRICIUS, 1787) (Abb. 11)

FUNDORTE: 4,20,I,II,IX,X.

VERBREITUNG VORARLBERG: Durchwegs historische Meldungen aus dem Rheintal, vor allem der Umgebung von Feldkirch! Die Art galt als ausgestorben bzw. verschollen (AISTLEITNER, 1992). Aus der Schweiz liegt nur mehr 1 Nachweis aus Sennwald vor, 2 weitere aus Liechtenstein, wobei die Population des NSG Ruggeller Riet in direktem Kontakt zu den Vorarlberger Beständen steht. Aus Österreich gibt es nur mehr eine Rezentmeldung aus dem Gebiet von Moosbrunn (Niederösterreich). In Deutschland sowie in einigen weiteren europäischen Ländern wurde das Moor-Wiesenvögelchen durch Meliorierungsmaßnahmen bereits ausgerottet.

ÖKOLOGIE: Die einzige noch nachgewiesene Population von *C. oedippus* lebt vor allem E der kleinflächigen Weichholzaue im NSG Bangser Ried SE, und zwar im Bereich eines eher artenarmen basischen Molinietums auf sehr feuchtem Untergrund. Hier wurden Mitte-Ende Juli 1994-1995 noch einige Falter nachgewiesen. Die Raupen ernähren sich einerseits ziemlich unspezifisch von verschiedenen Sumpfgräsern, sind aber andererseits an bestimmte kleinklimatische Bedingungen wie zB. eine hohe Bodenfeuchtigkeit sowie eine entsprechende Bewirtschaftungsform (extensive einmalige Herbstmahd) angewiesen. Im südlichen Teil des Areals, so vor allem in Norditalien existieren auch kleine Bestände auf Trockenwiesen.

GEFÄHRDUNG: Das Moor-Wiesenvögelchen ist eine der am stärksten bedrohten Tagfalterarten Europas und die Restpopulation im UG ist dringend schutz- und kontrollbedürftig. Eine indirekte Bedrohung ist derzeit im UG durch die zunehmende Austrocknung gegeben. Besondere Beachtung verdient aber auch die zeitgerechte Durchführung der Mahd, umso mehr als im Bereich des Vorkommens manche Flächen bereits durch Bewirtschaftungsaufgabe zunehmend verbuschen. Die ehemals individuenstarken Populationen des Unterriedes konnten trotz mehrfacher Begehungen nicht mehr konstatiert werden und sind vermutlich bereits ausgestorben.

2772 *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779)

FUNDORTE: 4,7,15,20,24,28,I,II,IX,X,XII.

VERBREITUNG VORARLBERG: Zahlreiche Meldungen aus dem Rheintal und Walgau, viele der lokalen Vorkommen sind aber inzwischen erloschen!

ÖKOLOGIE: Charakterart der Molinieten, aber auch an Bächen und Gräben sowie

in Großseggenriedern wo die Futterpflanze der Raupe, *Sanguisorba officinalis*, vorkommt. Die Raupen leben bis zum L4 Stadium in den Blütenköpfen und suchen dann die Nester von Wirtsameisen (*Myrmica scabrinoides* und *M. laevinodis*) auf, wo sie sich von der Ameisenbrut ernähren. Die Falter sind ebenfalls sehr stark an den Großen Wiesenknopf als Nektarpflanze gebunden. Sie wurden im UG in weiter Verbreitung auf den Pfeifengraswiesen unterschiedlichster Ausprägung festgestellt, meistens gemeinsam mit der in ähnlicher ökologischer Nische lebenden 2773 *Maculinea nausithous*.

GEFÄHRDUNG: Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist im gesamten mitteleuropäischen Areal stark gefährdet. Trockenlegung, Intensivierung und Aufgabe der traditionellen Nutzung sind die wesentlichen Faktoren für die dramatischen Populationsrückgänge der vergangenen 2-3 Jahrzehnte. Im UG besteht eine potentielle Gefährdung durch die Ausnutzung des frühen Mähtermins, der nur wenigen Raupen Überlebenschancen geben würde. Ein weiterer Negativfaktor, der auch von EBERT (1991) eingehend diskutiert wird, ist die mechanische Schädigung des Bodens (Verdichtung) durch schwere landwirtschaftliche Maschinen, da dies die Existenz der Wirtsameisen gefährdet. Empfehlenswert wäre daher eine Rückverlegung der Mahd auf Ende September und möglichst mehrjähriges Brachfallenlassen ausgewählter Flächen.

2832 *Scopula caricaria* (REUTTI, 1853)

FUNDORTE: 4,7,9,15,20,28,I,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lokale Populationen in Streuwiesen des Rheintales.

ÖKOLOGIE: Eine Charakterart von Molinieten, bevorzugt auf feuchteren Standorten. Die Raupen ernähren sich von verschiedenen krautigen Pflanzen, gerne an *Centaurea*. Imagines wurden im UG univoltin von Anfang Juli bis Ende August registriert.

GEFÄHRDUNG: Eine Gefährdung ist bei Beibehaltung der extensiven Streuenutzung kaum gegeben, negative Auswirkungen sind durch weitere Austrocknungstendenzen zu erwarten.

3120 *Discoloxia blomeri* (CURTIS, 1832)

FUNDORTE: 7,9,12,15,16,18,23,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lokal im Rheintal, Walgau und dem Großen Walsertal, bis in mittlere Lagen.

ÖKOLOGIE: Bivoltine Art, deren Raupen sich ausschließlich von Ulmen ernähren. Im UG wurden die Imagines regelmäßig Ende Mai und wiederum Anfang Juli bis Ende August in der Hartholzau festgestellt.

GEFÄHRDUNG: Die Bestandesentwicklung ist in Österreich durch Entfernen von Auwaldresten sowie durch das Ulmensterben generell regressiv und die Art gilt in der Roten Liste als gefährdet.

3197 *Lycia zonaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Abb. 5)

FUNDORTE: 2,4,11,VIII.

VERBREITUNG VORARLBERG: Äußerst lokal im Rheintal, allerdings nur historische Nachweise. Rezent wurde die Art aber im benachbarten Ruggeller Riet nachgewiesen.

ÖKOLOGIE: Die Raupen ernähren sich polyphag von verschiedenen krautigen Pflanzen, gerne an *Centaurea*. Die Falter wurden im UG auf basischen Molinieten sowie auf typischen Pfeifengraswiesen festgestellt. Im größten Teil des Gesamtareals ist *zonaria* hingegen an Trockenrasen gebunden. Während das Weibchen flugunfähig ist, kam das spät nachts fliegende männliche Geschlecht von Anfang bis Ende März in Anzahl zum Licht.

GEFÄHRDUNG: Die Bestandesentwicklung ist in Österreich durch Intensivierungsmaßnahmen deutlich regressiv und die Art gilt in der Roten Liste als gefährdet.

3238 *Theria primaria* (HAWORTH, 1809)

FUNDORTE: 1,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem Großraum Feldkirch nachgewiesen. Es sind dies zugleich auch die einzigen Fundorte Österreichs.

ÖKOLOGIE: Eine Charakterart der Schlehenhecken, die im UG dementsprechend am südexponierten *Prunus spinosa*-reichen Waldrand im Unterried N registriert wurde.

GEFÄHRDUNG: Die Bestandesentwicklung sollte auf Grund der nationalen Bedeutung dieses Vorkommens genau beobachtet werden. Die Art ist stark an besonnte Schlehenhecken gebunden, deren Entfernung daher einer Ausrottung gleichkommen würden.

3293 *Drymonia querna* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

FUNDORTE: 7,9,10,16,17.

VERBREITUNG VORARLBERG: Auf die unteren Tallagen des Rheintales, Walgau und Bregenzerwaldes beschränkt; Höhenverbreitung bis ca. 700 m.

ÖKOLOGIE: Eine monophag an Eichen gebundene Art die im UG selten von Anfang bis Mitte Juli im Bereich der *Quercus*-reichen Auwaldrandlagen registriert werden konnte.

GEFÄHRDUNG: Die Art wird - ähnlich wie die im UG ebenfalls nachgewiesene 3290 *Drymonia melagona* - österreichweit als gefährdet angesehen, wurde aber nicht in die Vorarlberger Rote Liste miteinbezogen. Allerdings besteht auch hier auf Grund der Substratwahl und Habitatansprüche eine aktuelle Gefährdung, vor allem durch Siedlungs- und Straßenbau bzw. forstwirtschaftliche Maßnahmen.

3305 *Gluphisia crenata* (ESPER, 1785)

FUNDORTE: 4,7,9,I,V,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Wenige Nachweise aus dem Rheintal und Walgau.

ÖKOLOGIE: Die Raupen leben univoltin im Kronenbereich alter Schwarzpappeln, seltener an anderen *Populus*-Arten. Bevorzugt werden Auwälder, Lichtungen, Gehölze und Parklandschaft besiedelt. Die Art wurde vereinzelt von Mitte Mai bis Ende Juli vor allem im Bereich von Weichholzauresten registriert.

GEFÄHRDUNG: Durch die Vernichtung von Auwaldresten bzw. zunehmende Umwandlung in Fichtenforste bedroht.

3329 *Tumatha senex* (HÜBNER, 1808)

FUNDORTE: 20,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erst rezent als Landesneufund aus dem Frastanzer Ried gemeldet (AISTLEITNER & HUEMER, 1984), sowie weiters aus dem NSG Rheindelta. ÖKOLOGIE: Charakterart von Schilfröhricht, moorigen Waldwiesen und Torfwiesen. Die Lebensweise der Raupe ist noch wenig bekannt, sie soll nach Literaturhinweisen an Lebermoosen und Erlenflechten leben. Der Rundflügelbär wurde im UG von Mitte Juli bis Ende August lediglich in den besonders feuchten Molinieten des NSG Bangser Ried SE registriert.

GEFÄHRDUNG: Die Art ist österreichweit stark gefährdet und wird in Vorarlberg als vom Aussterben bedroht eingestuft. Im NSG Rheindelta ist sie noch in individuenreichen Populationen vertreten, im UG durch die zunehmende Austrocknung aber sehr lokal und nur aus dem südöstlichen Bangser Ried bekannt.

3333 *Pelosia muscerda* (HUFNAGEL, 1766)

FUNDORTE: 4,7,9,20,22,28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Es liegen lediglich wenige historische Meldungen aus dem Großraum Feldkirch und Hohenems sowie Rezentnachweise vom NSG Rheindelta vor.

ÖKOLOGIE: *P. muscerda* wurde im UG bevorzugt im Bereich von Weichholzaubeständen nachgewiesen. Die Raupen leben an Algen und Flechten, besonders auf Erlen. Imagines treten univoltin auf und wurden Mitte Juli bis Ende August in Anzahl am Licht nachgewiesen.

GEFÄHRDUNG: Die Art galt in Vorarlberg bis vor kurzem als verschollen bzw. vom Aussterben bedroht (AISTLEITNER, 1992). Eine akute Bedrohung besteht derzeit nicht. Allerdings sind die potentiellen Lebensräume (Weichholzaue-Bruchwald) im Gebiet nur fragmentarisch ausgebildet.

3400 *Hypenodes humidalis* DOUBLEDAY, 1850

FUNDORTE: 1,4,11,20,22,28,I,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Wenige Meldungen aus dem Rheintal und dem westlichen Walgau, rezent nur noch aus dem NSG Rheindelta.

ÖKOLOGIE: Über die Lebensweise dieses Flachmoorspezialisten liegen nur spärliche Informationen vor. Demnach sollen die Raupen an Riedgräsern fressen. Die wenigen registrierten Imagines flogen von Ende Juli bis Anfang September ans Licht. Die Art konnte in den unterschiedlichsten Ausbildungen des Molinietums einschließlich der hohen Pfeifengraswiese festgestellt werden, fehlt aber bei trockeneren Bodenverhältnissen.

GEFÄHRDUNG: *H. humidalis* ist in Österreich stark gefährdet und auch die potentiellen und aktuellen Lebensräume in Vorarlberg sind rückläufig.

3499 *Deltote bankiana* (FABRICIUS, 1775)

FUNDORTE: 1,3,4,5,7,8,9,10,13,17,20,28,I,II,V,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Lokal verbreitet im Rheintal und Walgau, in Tallagen.

ÖKOLOGIE: Die Raupen dieser Art leben im Spätsommer an verschiedenen *Cyperus*- und *Carex*-Arten sowie an anderen Gräsern. Die Falter wurden im UG von Ende

Mai bis Ende Juli, lokal zahlreich, nachgewiesen. Bevorzugte Pflanzengesellschaften sind Molinieten unterschiedlichster Ausprägung.

GEFÄHRDUNG: *D. bankiana* verzeichnete in den letzten 2-3 Jahrzehnten in Vorarlberg eine stark rückläufige Bestandesentwicklung. Ursachen dafür waren vor allem Verbauungen und landwirtschaftliche Intensivierungen. Die Populationen im UG sind aber derzeit nicht akut bedroht. Die verwandte 3498 *Deltote uncula* wurde hingegen nur mehr relikitär im Bereich einer niedrigen Pfeifengraswiese bzw. eines Kleinseggenriedes festgestellt.

3505 *Eublemma parva* (HÜBNER, 1808)

FUNDORT: 17.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur in einem Einzelexemplar aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Die ökologischen Ansprüche dieser Art sind dringend untersuchungsbedürftig. Nach dem nunmehrigen Zweitnachweis für Vorarlberg, der wiederum aus einer artenreichen Pfeifengraswiese stammt, erscheint die Möglichkeit eines autochthonen Vorkommens in Streuwiesen durchaus gegeben. Die Raupen leben oligophag an verschiedenen Compositen und im UG würde vor allem *Inula* in Frage kommen. Der einzige imaginale Nachweis wurde Mitte Juli 1995 mit einer Lichtfalle getätigt.

GEFÄHRDUNG: *E. parva* gilt in Österreich als vom Aussterben bedroht und weitere Untersuchungen zur Bodenständigkeit und ökologischen Ansprüchen dieser Art wären daher dringend erforderlich.

3520 *Diachrysia nadeja* (OBERTHÜR, 1880)

FUNDORTE: 4,7,9,10,20,I.

VERBREITUNG VORARLBERG: Ansonsten nur ein älterer Nachweis aus dem Frastanzer Ried. Im benachbarten NSG Ruggeller Riet ist die Art hingegen sehr häufig. Bemerkenswerterweise fehlt die Art im NSG Rheindelta völlig. Die Populationen des UG sind die einzigen derzeit bekannten Österreichs!

ÖKOLOGIE: Die Lebensweise der Raupen ist nur unzureichend bekannt. In Gefangenschaft ernähren sie sich von *Urtica*, vermutlich dürfte aber ein breiteres Spektrum an krautigen Pflanzen gefressen werden. Bevorzugte Pflanzengesellschaften sind hochwüchsige Pfeifengraswiesen eher trockenerer Ausprägung.

GEFÄHRDUNG: Eine in Österreich hochgradig bedrohte Art, obwohl sie in der Roten Liste nicht aufgeführt wird.

3574b *Pyramidcampa berbera svenssoni* (FLETCHER, 1968)

FUNDORT: 18.

VERBREITUNG VORARLBERG: Erstnachweis!

ÖKOLOGIE: Eine leicht mit der im UG häufig auftretenden 3573 *Pyramidcampa pyramidea* zu verwechselnde Art, deren Raupen an verschiedenen Laubhölzern fressen. Der Erstnachweis für Vorarlberg stammt aus einem verfrichteten Pruno-Fraxinetum und wurde Ende August 1995 mit einer Lichtfalle getätigt.

GEFÄHRDUNG: Derzeit ist keine wesentliche Bestandsbedrohung ersichtlich.

3635 *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803)

FUNDORTE: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,17,20,21,22,24,I,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Sehr lokal verbreitet im Walgau und Rheintal.

ÖKOLOGIE: Die Raupen ernähren sich von Juli bis Mitte September von verschiedenen Apiaceae wie *Peucedanum officinale*, *Silaum silaus* und *Daucus carota*. *E. amethystina* ist im UG eine häufige Art die sporadisch 2 Generationen aufweisen dürfte. Die 1. Faltergeneration wurde zwischen Anfang Mai und Mitte Juli registriert, die 2. Generation von Ende Juli bis Ende August. Bevorzugte Pflanzengesellschaften sind hochwüchsige Pfeifengraswiesen eher trockenerer Ausprägung. Im NSG Rheindelta wurde die Amethysteule hingegen auf artenreichen niederen Pfeifengraswiesen saurer Böden, aber auch in mineralreichen Molinieten sowie Kleinseggenriedern basischen Untergrundes festgestellt, allerdings viel seltener als im UG.

GEFÄHRDUNG: Eine in Österreich hochgradig bedrohte Art, die in der Roten Liste als vom Aussterben bedroht eingestuft wird. Neben den wenigen noch aktuellen Populationen in Vorarlberg sind lediglich 2 weitere Fundorte aus Niederösterreich und der Steiermark bekannt. Eine Rückverlegung der Mahd wäre für die Erhaltung der Art empfehlenswert, da derzeit ein Teil der Raupen durch frühzeitiges Mähen gefährdet wird.

3645 *Cosmia affinis* (LINNAEUS, 1767)

FUNDORTE: 16,I,IX.

VERBREITUNG VORARLBERG: Die Art wurde historisch durch GRADL aus dem Großraum Feldkirch gemeldet (BURMANN & HUEMER, 1988). Die Nachweise aus dem UG sind die einzigen rezenten Funde in Vorarlberg.

ÖKOLOGIE: Die Raupen sind nach Literaturmeldungen trophisch ausschließlich an Ulmen gebunden, allerdings befinden sich in der Sammlung der Vorarlberger Naturschau auch aus *Quercus* gezüchtete Exemplare. Im UG wurden die Imagines sehr selten in der Hartholzau festgestellt.

GEFÄHRDUNG: Die Bestandesentwicklung ist in Österreich durch Restbiotopzerstörung und Ulmensterben regressiv und die Art gilt in der Roten Liste als gefährdet.

3657 *Fissipunctia ypsilon* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

FUNDORTE: 4,9,10,17,22.

VERBREITUNG VORARLBERG: Die Art wird lokal aus den großen Talschaften gemeldet.

ÖKOLOGIE: Eine charakteristische Art von Au- und Bruchwäldern. Die Raupen ernähren sich von den Blättern verschiedener Pappelarten sowie von Bruchweide. Die Imagines wurden im UG im Juli vor allem im Randbereich von Weichholzaunen besonders westlich der Partenwiesen registriert.

GEFÄHRDUNG: Die Art weist in Vorarlberg durch Vernichtung der Auwälder erhebliche Bestandeseinbußen auf.

Abb. 8 (o.l.): Der Apollo (*Parnassius apollo*) ist infolge Verbuschung am Illdamm ausgestorben (Foto: S. Erlebach)

Abb. 9 (o.r.): Der Rohrbohrer (*Phragmataecia castaneae*) ist typisch für feuchte Bodenverhältnisse

Abb. 10 (u.l.): Der Skabiosenscheckenfalter (*Eurodrys aurinia*) konnte nur noch in den feuchtesten Bereichen niederer Molinien registriert werden (Foto: E. Aistleitner)

Abb. 11 (u.r.): Das Moorwiesenvögelchen (*Coenonympha oedippus*) besitzt im Untersuchungsgebiet eines der letzten Vorkommen in Österreich (Foto: O. Danesch)

3770 *Archanara neurica* (HÜBNER, 1808)

FUNDORTE: 4,20

VERBREITUNG VORARLBERG: Ansonsten nur aus dem Frastanzer Ried sowie dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Hygrophile Art die dementsprechend ausschließlich im südöstlichen Bangser Ried registriert werden konnte. Als Raupensubstrat kommen verschiedene Poaceae in Frage, vor allem *Phragmites* und *Phalaris*. Die wenigen Imaginalfunde wurden Mitte Juli am Licht getätigt.

GEFÄHRDUNG: *A. neurica* gilt österreichweit als stark gefährdet und ist im UG mittelfristig insbesondere durch weitere Austrocknungsprozesse bedroht.

3901 *Paradiarsia punicea* (HÜBNER, 1803)

FUNDORTE: 4,9,10,20,I,V.

VERBREITUNG VORARLBERG: Sehr lokal in den Tallagen des Walgaus und Rheintales.

ÖKOLOGIE: *P. punicea* ist eine Charakterart der Flach- und Hochmoore sowie von Zwischenmooren. Ihre Raupen leben unspezifisch von verschiedenen krautigen Pflanzen. Im NSG Rheindelta tritt die Art in Kleinseggenriedern und Molinieten auf, bevorzugt aber eindeutig niedere Pfeifengraswiesen saurer Böden. Auf letzterer Vegetationsgesellschaft wurden die Imagines im NSG Bangser Ried in Anzahl nachgewiesen, im Bereich der trockeneren, hochgrasigen Molinieten aber nur mehr extrem einzeln und möglicherweise nicht mehr bodenständig.

GEFÄHRDUNG: Die Art verzeichnete in den vergangenen Jahrzehnten in Mitteleuropa extreme Bestandesrückgänge und ist österreichweit vom Aussterben bedroht! Die Bestandesentwicklung im UG erscheint bedenklich, da *punicea* subrezent auch im Unterried noch zahlreich nachgewiesen wurde, dort aber infolge zunehmender Austrocknung inzwischen weitestgehend verschwunden ist.

3923 *Xestia sexstrigata* (HAWORTH, 1809)

FUNDORTE: 28.

VERBREITUNG VORARLBERG: Bisher nur aus dem NSG Rheindelta bekannt.

ÖKOLOGIE: Charakterart von Verlandungsmooren, die im UG lediglich einmal Ende August 1995 am Licht registriert wurde. Die Art dürfte ähnlich wie im NSG Rheindelta auf die feuchte Ausbildung des typischen Molinietums sowie auf die niedrigen Pfeifengraswiesen beschränkt sein.

GEFÄHRDUNG: Die Bestände dieser Art dürften im UG mittelfristig vor allem durch Grundwasserabsenkungen bedroht sein.

3.1.3 Faunistische Bedeutung

Insgesamt wurden bisher im Gebiet der Unteren Ill inkl. des NSG Bangser Ried 1148 Schmetterlingsarten nachgewiesen. Die Qualität des Artenbestandes wird durch zahlreiche lokale und/oder gefährdete Taxa, einschließlich der 35 Landesneufunde untermauert. Ein besonders reichhaltiges Spektrum ist den Auwäldern sowie den Streuwiesen zuzuordnen. Allerdings treten im Vergleich zum NSG Rheindelta die hygrophilen Arten deutlich zurück und viele der dort nachgewiesenen Schmetterlinge fehlen im UG völlig (vgl. HUEMER, 1994).

mit zumindest nationaler Bedeutung auf. In den Streuwiesen finden sich Besonderheiten wie das Moor-Wiesenvögelchen (2729 *Coenonympha oedippus*) oder 3901 *Paradiarsia punicea*, beide im gesamten Bundesgebiet vom Aussterben bedroht. Österreichweit einzigartig ist das Vorkommen von 0317x *Dryadula irinae* sowie 2022 *Ancylis rhenana*, ein Wickler der seit 70 Jahren als verschollen galt und dessen einzige weltweit bekannte Population im UG fliegt. Auch 3238 *Theria primaria* sowie 3520 *Diachrysia nadeja* finden sich in Österreich nur hier sowie an 1-2 weiteren Flugplätzen in Vorarlberg.

3.1.4. Artenschwund - Rote Listen-Vertreter

Eine Analyse des Artenbestandes ergibt, daß 197 Arten, also mehr als 1/6 des Gesamtbestandes, in den letzten 25 Jahren nicht mehr registriert werden konnten. 87 Arten wurden das letztmal vor 1950 festgestellt, weitere 110 sind spätestens seit 1970 verschollen. Hinzu kommen noch einige Arten die noch bis in die späten 70er oder sogar 80iger Jahre auftraten, inzwischen aber vermutlich ebenfalls ausgestorben sind. Obwohl einige der verschollenen Taxa möglicherweise doch noch im UG wiedergefunden werden könnten, muß für einen erheblichen Teil ein durch unterschiedliche Faktoren verursachtes Aussterben angenommen werden. Diese postulierte Extinktion betrifft bezeichnenderweise tatsächlich besonders drastisch die Rote-Listen Arten, also jene mit österreichweit mehr oder weniger starker Gefährdung.

Insgesamt 200 der im UG registrierten Schmetterlingsarten werden in der österreichischen bzw. bayerischen Roten Liste aufgelistet. 128 Taxa wurden in den vergangenen 25 Jahren noch nachgewiesen, 72 sind hingegen seit mindestens 1970 verschollen

Von den 6 österreichweit vom Aussterben bedrohten Arten konnten rezent noch 4 festgestellt werden, von den 29 stark gefährdeten nur noch 10 und den 107 gefährdeten nur noch 61, hinzu kommen noch 4 potentiell gefährdete Arten mit neueren Nachweisen. Gesamt also ein Rückgang von 146 Arten der nationalen Rote Listen auf 79 noch rezent nachgewiesene Taxa, also nur mehr knapp die Hälfte (Abb. 12).

Der Rückgang betrifft insbesondere die Arten der Trockenlebensräume sowie hygrophile Elemente der Streuwiesen.

Die Verteilung der Rote Listen Arten auf die wichtigsten Großlebensräume im UG zeigt eine klare Konzentration auf Streuwiesen einschließlich Kleinseggenriedern, Trockenstandorte sowie Auwälder (Abb. 14). Fettwiesen und Fichtenforste bieten hingegen keiner einzigen gefährdeten Art geeignete Entwicklungsmöglichkeiten. Interessant ist ein Vergleich der verschollenen Rote-Listen Arten sowie der zur Zeit noch auftretenden auf Grund ihrer Biotopansprüche (Abb. 13 und 14). Dramatische Verluste ergeben sich vor allem in den Trockenbiotopen aber auch im Bereich der Auwaldzönosen, sodaß rezent die Streuwiesen die wichtigsten Refugialräume für gefährdete Faunenelemente darstellen.

Abb. 12: Verlust von Rote Liste Arten

Abb. 13: Biotope verschollener Rote Liste-Arten

Abb. 14: Biotope
rezent nachgewiesener Rote
Liste-Arten

Trotz dieses bedenklichen Diversitätsverlustes bieten vor allem die Riedwiesen der Naturschutzgebiete Bangs und Matschels auch heute noch mehreren Schmetterlingsarten Lebensraum, die in Österreich als vom Aussterben bedroht (Gefährdungsstufe 1 der Roten Listen) angesehen werden müssen (2729 *Coenonympha oedippus* (Moor-Wiesenvögelchen), 3505 *Eublemma parva*, 3635 *Eucartha amethystina* (Amethysteule), 3901 *Pardiarsia punicea*) oder bundesweit stark gefährdet sind (u.a. 2772 *Maculinea teleius*, 2773 *Maculinea nausithous*, 3329 *Tumatha senex*, 3333 *Pelosia muscerda*, 3770 *Archanara neurica*). Hinzu kommen zahlreiche hochgradig gefährdete Kleinschmetterlingsarten, für die allerdings österreichweit noch keine Roten Listen existieren, aber auch Arten aus Großschmetterlingsfamilien, deren Gefährdung in Vorarlberg bisher noch nicht untersucht wurde (Geometridae, Noctuidae). Manche dieser Arten besitzen in Vorarlberg die einzigen Vorkommen Österreichs und sind extrem bedroht (zB. 3520 *Diachrysa nadeja*).

Von den in Österreich nachgewiesenen 8 Schmetterlingsarten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) kommen rezent noch 5 im UG vor (2688 *Eurodryas aurinia*, 2729 *Coenonympha oedippus*, 2772 *Maculinea teleius*, 2773 *Maculinea nausithous*, 3377 *Euplagia quadripunctaria*) eine weitere (2538 *Eriogaster catax*) ist seit vielen Jahrzehnten verschollen. Dieses extrem gehäufte Auftreten von Arten der FFH-Richtlinie ist eine Verpflichtung für den Gesetzgeber, entsprechende Artenschutzmaßnahmen einzuleiten und die bereits ausgewiesenen Schutzgebiete an der Unteren III in das Natura 2000 Netz einzubringen.

3.2 Schmetterlingsgemeinschaften der einzelnen Lebensraumkomplexe
Schmetterlinge sind, vor allem bedingt durch eine vielfach stenöke Lebensweise der Präimaginalstadien, an bestimmte Fraßpflanzen und Lebensräume gebunden. Das Beziehungsgefüge ist meistens sehr komplex und umfaßt neben geeignetem Substrat auch Faktoren wie Mikroklima, Vegetationsstruktur, physiologischer Zustand der Pflanzen, Bewirtschaftungsformen etc.

Die Verteilung der einzelnen Arten auf Lebensräume erfolgte auf Grund der jeweiligen Registrierungslokalität sowie der bekannten ökologischen Ansprüche. Die Spezialisierungsgrade in *Abb. 15* beziehen sich lediglich auf das UG, d.h. etliche der hier an bestimmte Lebensräume gebundenen Arten kommen in anderen Teilen des Gesamtareals in weiteren Pflanzengesellschaften vor. Insgesamt beurteilt sind Auwälder, Riedwiesen und Trockenstandorte deutlich artenreicher als Fettwiesen und Fichtenforste (*Abb. 15*).

3.2.1 Riedwiesen

Die zur Streuegewinnung bewirtschafteten Riedwiesen, sind weitaus überwiegend dem Typus der Pfeifengraswiesen zuzuordnen. Im nördlichen Teil des UG (Unterried, Partenwiesen, Bangser Ried W), dominieren eher trockenere, hochwüchsige Molinieten, im südlichen Teil (Bangser Ried E) eher niedrige Pfeifengraswiesen. Die Wiesen werden traditionell einschürig bewirtschaftet, im UG überwiegend erst ab Mitte September, vereinzelt und gesetzlich gedeckt aber auch schon Anfang September.

Die Riedwiesen weisen eine Artenzahl von 374 auf. 169 Schmetterlingstaxa wurden exklusiv in Streuwiesen registriert, wovon 77 mehr oder weniger stark an die Molinieten i.w.S. gebunden sind und in diesen Lebensräumen in Vorarlberg ein Verbreitungsoptimum besitzen. Darunter befindet sich ein ganz erheblicher Anteil der für das Gesamtgebiet der Unteren III bedeutsamen Arten wie zB. 0053 *Stigmella sanguisorbae*, 0864 *Coleophora wockeella*, 2141x *Epermenia falciformis*, 1645 *Eupoecilia sanguisorbana*, 2022 *Ancylis rhenana*, 2348 *Crambus uliginosella*, 2543 *Lasiocampa trifolii*, 2772 *Maculinea teleius*, 2773 *Maculinea nausithous*, 2951 *Eulithis pyraliata*, 3197 *Lycia zonaria*, 3499 *Deltote bankiana*, 3520 *Diachrysis nadeja* und 3635 *Eucarta amethystina*.

Eine unterschiedliche Artenzusammensetzung konnte vor allem zwischen dem eher feuchten Molinietum caeruleae und dem ebenfalls feuchten, basischen Molinietum caeruleae einerseits sowie der trockenen Ausbildung der typischen Pfeifengraswiese und dem Molinietum arundinaceae andererseits registriert werden (s. 3.3.). Im Bereich der typischen Pfeifengraswiesen wurden 259 Arten nachgewiesen, in den niederen Pfeifengraswiesen 136 spp. und in den hohen Pfeifengraswiesen 212 spp. Diese Befunde entsprechen auch etwa den floristischen Diversitätsdivergenzen.

Ausschließlich in den niederen Pfeifengraswiesen sowie in den feuchtesten Bereichen der typischen Molinieten wurden u.a. 2178 *Stenoptilia pneumonanthos*, 2422 *Eudonia pallida*, 2729 *Coenonympha oedippus*, 3329 *Tumatha senex*, 3757 *Amphipoea fucosa*, 3770 *Archanara neurica*, 3837 *Mythimna straminea* und 3923 *Xestia sexstrigata* nachgewiesen. Die Mehrzahl der Lepidopterenarten besiedelt ohne klare Präferenzen unterschiedliche Molinieten, wobei generell

hygrophile Arten sowohl quantitativ als auch in ihrer Artenzahl mit zunehmender Trockenheit abnehmen.

3.2.2 Kleinseggenrieder

Kleinseggenrieder finden sich in geringer Ausdehnung im südöstlichen NSG Bangser Ried. Hier existieren auch kleinflächige Großseggenesellschaften, die allerdings lepidopterologisch nicht eigens untersucht wurden. Auf Grund der engen Verzahnung mit Pfeifengraswiesen unterschiedlicher Typisierung, vor allem aber mit niederen, basischen Molinieten, war eine exakte Zuordnung der im umgebenden Gebiet registrierten Lepidopteren schwierig, und bleibt mit Unsicherheitsfaktoren behaftet. Vermutlich dürfte eine größere Zahl der Arten aus den Molinieten zumindest in Teilpopulationen auch Kleinseggenrieder besiedeln. Eine spezialisierte Fauna ist jedoch kaum vorhanden, von den 20 zugeordneten Arten besitzen aber mehrere in den Kleinseggenriedern Verbreitungsschwerpunkte, wie zB. die an *Primula farinosa* gebundene 1261 *Monochroa servella*, 1843 *Celypha doubledayana*, 2688 *Eurodryas aurinia* und 3498 *Deltote uncula*. Diese Arten wurden lediglich noch in den feuchtesten Bereichen niederer Molinieten registriert.

Die Kleinseggenrieder sind nach Untersuchungen im Rheindelta ebenfalls sehr artenarm und die meisten Vertreter finden sich auch dort zusätzlich in den niederen Pfeifengraswiesen (HUEMER, 1994).

3.2.3 Trockenvegetation

Trockenstandorte finden sich an der Unteren Ill bevorzugt an exponierten Dämmen von Ill und Rhein, kleinflächig auch an Straßenböschungen (Zollamt Bangs) bzw. am Matscheler Bergle. Durch den weitgehenden Süd-Nordverlauf der Dämme und die damit verbundene Ost- bzw. Westexposition sind die Bedingungen aber suboptimal. Vor allem rechtsseitig der Ill existieren durch starke Beschattung infolge von Fichtenanpflanzungen, aber auch durch Viehtritt ungünstige Rahmenbedingungen. Besonders günstige Verhältnisse herrschten hingegen bis vor wenigen Jahren noch am rechten Illufer im Mündungsbereich mit Südwestexposition.

Insgesamt weisen diese Trockenstandorte unterschiedlicher Vegetationszusammensetzung eine relativ große Diversität auf. Von den 105 diesem Lebensraumkomplex zugeordneten Schmetterlingsarten sind annähernd die Hälfte (46 spp.) stenotop an diesen Lebensraum gebunden. Allerdings ist gerade in diesem Bereich, vor allem durch zunehmende Verbuschung der Dämme, Beweidung und Beschattung durch Fichtenanpflanzungen ein extremer Artenschwund zu verzeichnen, der u.a. die Tagfalter 2610b *Parnassius apollo*, 2674 *Melitaea didyma*, 2680 *Mellicta aurelia*, 2786 *Agrodiaetus damon* und 2788 *Plebicula dorylas* oder die österreichweit vom Aussterben bedrohte 3960 *Agrotis vestigialis* betrifft. Insgesamt 22 Arten der Trockenbiotope bleiben verschollen.

3.2.4 Fettwiesen

Basierend auf anthropogen verursachtem Mineralstoffeintrag (Düngung, Beweidung) haben sich in einigen Bereichen aus den ehemaligen Molinieten Fettwiesen

entwickelt. Besonders ungünstig ist die Situation in den Partenwiesen (vor allem im östlichen Teil) sowie im mittleren Bereich des NSG Bangser Ried, das durch Fettwiesen und Grünlandstreifen de facto aufgespalten ist. Etwas besser ist die Situation im Unterried, dessen Vegetation aber im östlichsten Teil ebenfalls völlig in Fettwiesen umgewandelt wurde, ansonsten findet sich Intensivbewirtschaftung hier aber nur in einzelnen Parzellen. Diese Flächen werden regelmäßig gedüngt und 2-3 mal jährlich gemäht. Intensivierte Weideflächen finden sich überdies durchgehend im orographisch linksseitigen Ill- sowie im rechtsseitigen Rheinvorland.

Ackerflächen u.a. mit Maisanbau sind im UG von untergeordneter Bedeutung.

Die intensiv bewirtschafteten Wiesen sind sehr arten- und individuenarm und können nur mehr von 52 Schmetterlingsarten besiedelt werden, die alle auch in anderen Lebensräumen, vor allem den Streuwiesen, auftreten.

Die Ursachen für diesen drastischen Verlust an ökologischer Wertigkeit liegen einerseits am völlig unzureichenden, da einseitigem Nahrungsangebot, andererseits aber auch an der für viele Arten lebensfeindlichen Mehrfachmahd, der Änderung der mikroklimatischen Verhältnisse sowie der Änderung des physiologischen Zustandes der Pflanzen durch Mineralstoffanreicherung.

3.2.5 Auwälder

Die Eschen-Traubenkirschen-Hartholzaue, mehr oder weniger durchsetzt mit Fichten, findet sich im größten Teil des NSG Matschels sowie rechtsseitig der Ill. Reinbestände existieren im nördlichsten Bereich nahe der Illmündung. Weichholzaufragmente sind vor allem in Form eines schmalen Gehölzstreifens am linken Illufer sowie rechtsufrig ausgebildet, Fragmente aber auch im westlichen Teil der Partenwiesen sowie im NSG Bangser Ried.

Von den 681 den Auwälder zugeordneten Arten sind 573 im UG exklusiv an diesen Lebensraum gebunden. 332 Vertretern der Hartholzaue inkl. Waldrandbereiche stehen lediglich 91 Taxa der Weichholzaue gegenüber, der Rest ist unspezifisch in beiden Bereichen anzutreffen. Beispiele dafür sind die beiden Schillerfalter 2636 *Apatura iris* und 2637 *A. illia*.

Für die Hartholzaue typisch sind neben vielen anderen Arten (vgl. Anhang) die Landesneufunde 0678 *Coleophora milvipennis*, 1304 *Teleiodes wague*, 1897 *Epinoia abbreviana* und 2098 *Strophedra nitidana*. Entsprechend dem Substratangebot finden sich weiters zahlreiche gefährdete Arten wie z.B. 3238 *Theria primaria*, eine Art der Schleenhecken oder die an Ulmen gebundenen 3120 *Discoloxia blomeri* und 3645 *Cosmia affinis*.

Besonders charakteristisch für die Weichholzaue sind z.B. 0744 *Coleophora zelleriella*, 1199 *Cosmopterix zieglerella*, 1328 *Gelechia cuneatella*, 3333 *Pelosia muscerda* und 3636 *Ipimorpha retusa*.

Die außergewöhnlich hohen Artenzahlen sind vor allem auf die in einigen Teilen des UG noch vorhandenen naturnahen Waldparzellen mit reich strukturierten Waldrandbereichen, und einem entsprechenden reichhaltigen Substratangebot begründet.

3.2.6 Fichtenforste

Beinahe der gesamte Bereich der Hartholzaue ist von Fichten mehr oder weniger stark durchsetzt. Vor allem im nördlichsten und westlichen Teil des UG finden sich auch großflächig reine Fichtenforste.

Die Fichtenmonokulturen sind erwartungsgemäß mit insgesamt nur 40 Lepidopteren sehr artenarm, wobei der weitaus überwiegende Teil (38 spp.) auch im verfichteten Pruno-Fraxinetum registriert wurde. Darunter befinden sich auch einige Forstschädlinge wie 1911 *Epinotia tedella* und 3321 *Lymantria monacha*.

Ursachen für die Artenarmut ist vor allem das völlig unzureichende Nahrungs- und Strukturangebot. Hinzu kommen noch die ungünstigen mikroklimatischen Voraussetzungen (Temperaturabfall, Lichtmangel etc.).

Abb. 15: Artenverteilung auf die Hauptlebensräume

3.3 Die Streuwiesenkomplexe Bangser Ried, Unterried und Partenwiesen

Die 3 räumlich voneinander durch Wald und/oder intensivlandwirtschaftliche Zonen deutlich abgegrenzten Biotopkomplexe Bangser Ried (südöstlicher Teil), Unterried und Partenwiesen unterscheiden sich in der Artenzusammensetzung ganz erheblich voneinander.

Vergleiche von Artengemeinschaften lassen sich mit Hilfe des Sörensen-Quotienten berechnen, der die Zahl gemeinsamer Arten berücksichtigt:

$$QS (\%) = 2G/S_A + S_B \times 100$$

G = Zahl der in beiden Gebieten gemeinsam vorkommenden Arten

S_A, S_B = Zahl der Arten in Gebiet A bzw. B

Die Artenzusammensetzung divergiert deutlich zwischen den Teilflächen Bangser Ried und Unterried einerseits bzw. Unterried und Partenwiesen andererseits (Tab. 4, 5 und 6). Das Unterried weist mit 255 Arten die höchste Diversität auf, etliche Taxa stammen aber aus den strukturreichen Waldrandgemeinschaften und besiedeln von hier die angrenzenden Bereiche der Streuwiesen. Im Bangser Ried wurden hingegen nur 203 Arten den Streuwiesen zugeordnet und in den Partenwiesen 188 Species. Die Faunenähnlichkeiten sind trotz geographischer Nähe bereits deutlich reduziert, weisen aber für Bangser Ried - Unterried noch Werte von 73,4% auf, für Unterried -Partenwiesen immerhin noch 69,1% und fallen für Bangser Ried - Partenwiesen auf einen Wert von 64,5%. Interessant sind die Faunenaffinitäten bei reduzierter Analyse stenotoper (weitgehend hygrophiler) Taxa der Molinieten i.w.S. Erhöhte Faunenähnlichkeit besteht hier wiederum zwischen Bangser Ried und Unterried mit 76,4%, während Bangser Ried - Partenwiesen Ähnlichkeitswerte von nur mehr 58,3% und Unterried - Partenwiesen von 62,2% aufweisen. Die Partenwiesen müssen daher bereits als stark degradiertes Stadium ehemals artenreicher Feuchtwiesen beurteilt werden. Besonders das Bangser Ried weist einen signifikant höheren Anteil an Spezialisten auf (Tab. 6: 68 spp. im Bangser Ried, 55 spp. im Unterried, 35 spp. in den Partenwiesen) 16 von insgesamt 77 stenotopen Arten konnten exklusiv im Bangser Ried nachgewiesen werden, hingegen lediglich 5 im Unterried und 2 in den Partenwiesen. Die ansonsten weitgehende Übereinstimmung der spezialisierten Lepidopterenzönosen im Bangser Ried und Unterried und die starke Verarmung im Bereich der Partenwiesen belegt die ungünstigen, vor allem auf Bodentrockenheit zurückzuführenden mikroklimatischen Rahmenbedingungen im nördlichen Großraum des UG.

Tab. 4: Sörensen-Quotienten für alle autochthonen Taxa

	Bangser Ried	Unterried	Partenwiesen
Bangser Ried	100%	73,4%	64,5%
Unterried	73,4%	100%	69,1%
Partenwiesen	64,5%	69,1%	100%

Tab. 5: Sörensen-Quotienten für stenotope Taxa

	Bangser Ried	Unterried	Partenwiesen
Bangser Ried	100%	76,4%	58,3%
Unterried	76,4%	100%	62,2%
Partenwiesen	58,3%	62,2%	100%

	BR	UR	PW		BR	UR	PW
0053 <i>Stigmella sanguisorbae</i>	+	+	-	2422 <i>Eudonia pallida</i>	+		
0089 <i>Stigmella poterii</i>		+		2543 <i>Lasiocampa trifolii</i>		+	
0090 <i>Stigmella ulmariae</i>	+	+		2545 <i>Euthrix potatoria</i>	+	+	+
0162 <i>Pseudopostega crepusculella</i>	+	+		2662 <i>Brenthis ino</i>	+	+	+
0426 <i>Calybites phasianipennella</i>	+	+		2688 <i>Eurodryas aurinia</i>	+	-	
0639 <i>Glyphipterix thrasonella</i>	+	+		2697 <i>Minois dryas</i>	+	+	+
0759 <i>Coleophora conspicuella</i>	+	+	+	2729 <i>Coenonympha oedippus</i>	+	-	-
0783 <i>Coleophora caespitiella</i>	+		+	2772 <i>Maculinea teleius</i>	+	+	+
0787 <i>Coleophora alticolella</i>	+			2773 <i>Maculinea nausithous</i>	+	+	+
0788 <i>Coleophora taeniipennella</i>	+		+	2832 <i>Scopula caricaria</i>	+	+	+
0833 <i>Coleophora inulae</i>	+	+		2842 <i>Scopula immutata</i>	+	+	+
0864 <i>Coleophora wockeella</i>	+	+		2951 <i>Eulithis pyraliata</i>	+	+	+
0918 <i>Elachista monosemiella</i>	+		+	3197 <i>Lycia zonaria</i>	+	+	
1195 <i>Mompha epilobiella</i>	+	+		3329 <i>Tumatha senex</i>	+		
1202 <i>Cosmopterix scribaiella</i>			+	3369 <i>Diacrisia sannio</i>	+	+	
1261 <i>Monochroa servella</i>	+			3400 <i>Hypenodes humidalis</i>	+	+	
1265 <i>Monochroa lutulentella</i>	+	+	+	3498 <i>Deltote uncula</i>	+		
1522 <i>Phragmataecia castaneae</i>	+	+		3499 <i>Deltote bankiana</i>	+	+	+
1603 <i>Prochoreutis myllerana</i>		+		3520 <i>Diachrysia nadeja</i>	+	+	+
1616 <i>Phtheochroa inopiana</i>	+	+		3635 <i>Eucarta amethystina</i>	+	+	+
1634 <i>Phalonidia permixtana</i>	+	+	+	3735 <i>Apamea unanimitas</i>			+
1645 <i>Eupoecilia sanguisorbana</i>	+	+		3738 <i>Apamea ophiogramma</i>	+	-	+
1697 <i>Acleris aspersana</i>	+	+	+	3755 <i>Rhizedra lutosa</i>	+		
1748 <i>Sparganothis pilleriana</i>	+	+	+	3756 <i>Amphipoea oculea nictitans</i>	+	+	+
1795 <i>Bactra lancealana</i>	+	+	+	3757 <i>Amphipoea fucosa</i>	+		
1796 <i>Bactra lacteana</i>	+	+		3759 <i>Hydraecia micacea</i>		+	
1805 <i>Endothenia quadrimaculana</i>	+			3766 <i>Celaena leucostigma</i>	+	+	

Tab. 6: Stenotope Streuwiesenarten (+ rezente Nachweise; - historische Nachweise; BR Bangser Ried; UR Unterried; PW Partenwiesen))

©Ginzburg Dornbirn, Austria, download unter www.bioloozentrums.at

1843 <i>Celypha doubledayana</i>	+			3770 <i>Archanaura neurica</i>	+		
1948 <i>Eucosma scutana</i>	+	+	+	3776 <i>Chortodes minima</i>	+	+	
2022 <i>Ancylis rhenana</i>	+	+		3792 <i>Lacanobia splendens</i>	+	+	+
2141x <i>Epermenia falciformis</i>		+	+	3831 <i>Mythimna turca</i>	+	+	+
2178 <i>Stenoptilia pneumonanthos</i>	+			3836 <i>Mythimna pudorina</i>	+	+	+
2182 <i>Stenoptilia succisae</i>		+		3837 <i>Mythimna straminea</i>	+		
2196 <i>Oidaematophorus carphodactylus</i>	+	+	+	3838 <i>Mythimna impura</i>	+	+	+
2203 <i>Oidaematophorus lithodactyla</i>	+	+		3853 <i>Orthosia gracilis</i>		+	+
2341 <i>Chilo phragmitella</i>	+	+		3873 <i>Diarsia rubi</i>	+	-	
2348 <i>Crambus uliginosella</i>	+	+		3901 <i>Pardiarsia punicea</i>	+	-	+
2374 <i>Catoptria margaritella</i>	+	+	+	3923 <i>Xestia sexstrigata</i>	+		
2387 <i>Xanthocrambus lucellus</i>	+	+					

3.4 Substratabhängigkeit

Schmetterlinge sind im Raupenstadium zum weitaus überwiegenden Teil an chlorophyllhaltiges Pflanzensubstrat angewiesen. Einige wenige Vertreter sind auch befähigt tote pflanzliche oder tierische Substanzen zu verwerten. Die Abhängigkeit der Lepidopterenarten vom Futterpflanzenangebot im UG wird in *Abb. 16* dargestellt.

Laubhölzer

Ca. 40% des Artenbestandes (452 spp.) sind exklusiv an Laubhölzer gebunden, weitere 102 Species partiell. Darunter befinden sich 175 monophage Schmetterlinge mit strenger Bindung an eine einzige Pflanzenart oder Gattung, u.a. an *Quercus* (34 spp.), *Salix* und *Populus* (24 bzw. 19 spp.), aber auch *Betula* (15 spp.) und *Prunus* (13 spp.) sowie an einigen weiteren Laubhölzern wie *Alnus* (9 spp.), *Corylus* (6 spp.) und *Ulmus* (6 spp.). Oligophagie (Bindung an eine oder mehrere näher verwandte Pflanzenfamilien) tritt bei 127 Arten auf und betrifft vor allem Salicaceae (26 spp.) und Rosaceae (44 spp.) sowie Betulaceae (22 spp.). 150 Arten ernähren sich unspezifisch von diversen Laubholzgewächsen.

Eine entsprechende Vielfalt an Laubhölzern ist von entscheidender Bedeutung für die derzeit vorhandene Diversität an Schmetterlingen.

Nadelhölzer

Die insgesamt 44 exklusiven Nadelholzfresser, sind lediglich knapp 4% des Gesamtartenbestandes und kaum 1/10 des Artenbestandes an Laubhölzern.

182 Weitere 22 Schmetterlingsarten ernähren sich von zumindest sporadisch von

Nadelhölzern. Monophage Taxa finden sich vor allem an *Picea* (13 spp.), selten an *Pinus* (4 spp.) und *Larix* (3 spp.). Der überwiegende Anteil der Nadelholzspezialisten lebt oligophag an Pinaceae (18 spp.).

Abb. 16: Substratabhängigkeit

Krautige Pflanzen

Neben den Laubhölzern sind die sogenannten krautigen Pflanzen die wichtigste Nahrungsressource für Lepidopteren im Gebiet der Unteren Ill. Sie spielen in sämtlichen vorhandenen Lebensräumen eine mehr oder weniger große Rolle. Insgesamt 493 Arten ernähren sich von krautigem Substrat, 361 spp. exklusiv. Monophage Taxa finden sich in insgesamt 122 Arten, insbesondere an *Rubus* (10 spp.), *Galium* (8 spp.), *Hypericum* (6 spp.), *Thymus* (5 spp.), *Viola* und *Sanguisorba officinalis* (jeweils 4 spp.) sowie zahlreichen anderen Pflanzenarten bzw. Gattungen. Oligophagie tritt mit 132 Arten vor allem an Fabaceae (31 spp.), Compositae (25 spp.), Lamiaceae und Apiaceae (jeweils 15 spp.), Brassicaceae (9 spp.), und Rosaceae (6 spp.) auf. 107 Arten ernähren sich polyphag von verschiedensten krautigen Pflanzen.

Krautige Pflanzen bilden überdies in Form eines entsprechenden Blütenangebotes für viele Imagines, ganz besonders unter den Tagfalter, die entscheidende Nahrungsgrundlage.

Gräser s.l. (inkl. Poaceae, Juncaceae, Cyperaceae)

Die Gräser s.l. sind vor allem in den Streuwiesen unterschiedlicher Typisierung als Substrat für Schmetterlingsraupen wichtig. Von den insgesamt 143 an Fraßpflanzen aus dieser Gruppe gebundenen Arten, ernähren sich 98 exklusiv von Gräsern i.w.S., 86 oligophag an Poaceae und verwandten Familien. Monophagie tritt nur bei 9 Arten auf, am ehesten noch an *Phragmites* mit 4 Species.

Flechten, Moose, modernde Blätter, Totholz

Eine Reihe von Schmetterlingsarten ist trophisch an Flechten, Moose, tote pflanzliche Stoffe u.a. für Lepidopteren eher ungewöhnliche Substrate angewiesen. Insgesamt 18 Arten ernähren sich von Flechten (14 exklusiv), 25 spp. sind an Moose gebunden (19 exklusiv), 19 spp. an modernde Blätter und ähnliches Substrat sowie 7 spp. an verpilztes Totholz. Obwohl die Artenzahlen im Vergleich zu phytophagen Zönosen niedrig sind, bildet dieses Artensegment doch eine wichtige Komponente intakter Lebensgemeinschaften. Vor allem die Verwerter toter pflanzlicher Substanz sind Indikatoren für funktionierende Zersetzungsprozesse.

3.5 Naturschutzrelevante Problembereiche

3.5.1 Gefährdungsursachen

Die für den auffallenden Arten- und Individuenrückgang an Schmetterlingen verantwortlichen Gefährdungsmechanismen im UG sind multifaktoriell. Besonders problematisch sind die derzeit kontraproduktiv wirkenden Nutzungsansprüche einerseits sowie Schutzvorgaben andererseits. Dies betrifft alle wichtigen, für den Naturschutz relevanten Lebensräume an der Unteren Ill. Hinzu kommen weitere gefährdende Momente für eine Durchsetzung der Schutzzinhalte, insbesondere die zunehmende Grundwasserabsenkung sowie regionale Verbuschungstendenzen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Gefährdungsmechanismen der einzelnen Großlebensräume diskutiert.

Riedwiesen

- zunehmende Austrocknung:

Austrocknungserscheinungen sind möglicherweise durch die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre bedingt, eine weiterer Ursachenkomplex ist im markanten Absinken des Grundwasserspiegels zu finden. Bedingt durch Tagwasserstau ist die Situation im südöstlichen Bangser Ried trotz niedrigem Grundwasserpegel deutlich günstiger als im Unterried bzw. Matschels. Vegetationsmäßig wirkt sich die Grundwasserabsenkung vor allem im westlichen Unterried bereits durch vermehrte Störungsanzeiger (zB. Goldruten) als Folge von Eutrophierungstendenzen aus. Die Ursachen dafür liegen in der im Zuge fehlender Vernässung erfolgten Mineralisierung und damit Nährstofffreisetzung der obersten

Torfschichten, die hier im Wurzelbereich der Pflanzen liegen (GRABHER & LUTZ, 1995). Die östlichen Bereiche des Unterriedes mit bereits ursprünglich sehr trockenen Molinieten sowie die Partenwiesen sind aber floristisch von einer Grundwasserabsenkung weniger betroffen. GRABHER & LUTZ (1995) erwarten vor allem in Matschels einen allmählichen Übergang zu Halbtrockenrasen (Stachyo-Brometum).

Schmetterlinge, aber auch Heuschrecken (GÄCHTER, 1995), deuten dieses mögliche Szenarium bereits klar an, und es fehlen bereits heute die typischen Feuchtgebietsarten im Bereich der Partenwiesen zu einem erheblichen Teil.

- Intensivierung:

Intensivierung ist zwar gesetzlich verboten und die Streuwiesen sind daher nicht mehr direkt von Zerstörung bedroht. Ein Problembereich ergibt sich aber durch Mineralstoffeintrag aus den gedüngten Zonen in die extensiv bewirtschafteten Streuwiesen sowie durch die, als Folge von Austrocknungserscheinungen, freigesetzten Mineralstoffe. Fettwiesen sind als Lebensraum für Schmetterlinge durch Mangel an Futterpflanzen sowie durch ungeeignete Bewirtschaftungsformen praktisch wertlos (vgl. HUEMER, 1994).

- fehlende oder mangelhafte Pflegemaßnahmen:

Die gesetzlich erlaubte Vorverlegung der Mahd auf 1. September ist eine erhebliche potentielle Bedrohung für viele besonders standortstypische Arten (*2141x Epermenia falciformis*, *2729 Coenonympha oedippus*, *2772 Maculinea teleius*, *2773 Maculinea nausithous*, *3635 Eucartha amethystina* etc.). In Praxis wird aber derzeit noch der größte Teil der Streuwiesen frühestens ab Mitte September gemäht. Ähnlich problematisch wäre aber auch eine Aufgabe der Extensivbewirtschaftung, durch nachfolgende Verbuschung.

Auwaldbereiche

- Verfichtung:

Die ursprünglichen Auwälder im UG wurden durch massive forstliche Eingriffe, vor allem Anpflanzungen standortsfremder Fichten grundlegend verändert. Diese Entwicklung dauert immer noch an und bedroht in zunehmendem Ausmaß die Lebensgemeinschaften der Auwälder (vgl. auch vorhergehende Kapitel).

- Austrocknung:

Ein direkter Einfluß des Grundwasserrückganges auf die Faunenbestände im Auwaldbereich konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, auch die Krautschicht wird kaum vom Grundwasserstand beeinflusst (GRABHER & LUTZ, 1995). Fehlende Überschwemmungen und möglicherweise mikroklimatische Änderungen als Folge zunehmender Trockenheit könnten jedoch eine wichtige Ursache für das Verschwinden einiger typischer Auwaldarten gewesen sein.

Trockenbiotop

- Verbuschung:

Die Ill- und Rheindämme waren bis vor wenigen Jahren wichtige Refugialräume für wärmeliebende Schmetterlings- aber auch Pflanzenarten. Vor allem die

Trockenstandorte des orographisch rechtsseitigen Illdammes sind durch Verbuschung hochgradig gefährdet. Zahlreiche xerothermophile Faunenelemente wie zB. der noch bis Anfang der 80iger Jahre vorkommende Apollofalter sind inzwischen verschollen.

- Intensivierung:

Ein weiterer Bedrohungsfaktor für die Trockenstandorte ist die Beweidung, mit entsprechender Intensivierung sowie Trittschäden durch übermäßigen Viehbe-
stoß (besonders im linksseitigen Illvorland).

Kleingewässer, Gießen

- Austrocknung:

Die lepidopterologisch artenarmen, aber potentiell mit sehr interessanten Zöno-
sen ausgestatteten Kleingewässer sind durch zunehmende Austrocknung extrem
bedroht. Einzig der Spirsbach weist noch eine permanente Wasserführung
auf, wird allerdings durch den Rhein gespeist. Andere Kleingewässer wie vor
allem der Unterriedgraben und der Leimenbach fallen heute großteils trocken.
Wichtige semiaquatische Zeigerarten wurden nur mehr in einzelnen Exemplaren
registriert und stammen vor allem aus dem Hechtloch südlich des Matschelser
Bergles.

- Reinigungen, Eutrophierung:

Weitere sich auf die Diversität negativ auswirkende Faktoren sind die „Reini-
gungen“ der Randbereiche sowie der Gewässer selbst. Eutrophierung durch
umliegende Intensivflächen wirkt sich ebenfalls auf die wenigen semiaquatisch
lebenden Arten, mit potentiellen Vorkommen ungünstig aus.

3.5.2 Schutzmaßnahmen

Die wesentlichen Naturwerte im Bereich der NSG Bangser Ried und Matschels
sind vor allem in den Streuwiesen, aber auch in den noch naturnahen Auwaldbe-
reichen zu finden.

Die Erhaltung der rezent nachgewiesenen Schmetterlingspopulationen, teil-
weise mit überregionaler bis nationaler Bedeutung (das Vorkommen des Moor-
Wiesenvögelchens ist zweifellos international relevant), und somit gleichzeitig ein
Schutz für tausende weitere Tierarten kann mittelfristig nur durch folgende Maß-
nahmen gewährleistet werden

- Beibehaltung der traditionellen einmaligen Mahd, möglichst im Oktober
- Stabilisierung bzw. Anhebung des Grundwasserpegels
- Entflechtung von intensivlandwirtschaftlichen und extensiven Flächen
(Pufferzonen)
- möglichst umfassende Aushagerung von Fettwiesen
- Entfernung standortsfremder Fichtenäcker
- Aufforstungen mit standortsgerechten Laubhölzern
- Ausweisung von Naturwaldzellen mit entsprechenden Totholzanteilen

Die bereits stark degradierten ehemaligen Halbtrockenrasen mit einer weitgehend verschwundenen spezialisierten Fauna könnten durch entsprechende Pflegeprogramme revitalisiert werden. Nötig wäre vor allem:

- Entfernung von Verbuschungsstadien
- extensive Bewirtschaftung (Mahd)
- Einschränkung der intensiven Beweidung (Zonenbeschränkung bzw. niedrigere Viehbestoßung)

4. Literaturauswahl

AISTLEITNER, E. (1992): Faunistik, Phaenologie und Anmerkungen zur Biologie ausgewählter Familien der Schmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) in Vorarlberg, Austria occ. - Diss. Univ. Innsbruck, 1132 pp. [unveröffentlicht].

AISTLEITNER, E. & HUEMER, P. (1983). Neue und bemerkenswerte Noctuiden-Funde aus Vorarlberg (Lep.: Noct.). - Z. ArbGem. öst. Ent. 35: 84-100.

AISTLEITNER, E. & HUEMER, P. (1984): Einige neue und interessante Macrolepidopteren-Funde aus Vorarlberg, Austria occ. (Lepidoptera: Geometroidea und Noctuoidea. - Z. ArbGem. öst. Ent. 36: 95-100.

ARBEITSGEMEINSCHAFT NORDBAYERISCHER ENTOMOLOGEN (1992): Schmetterlinge. In: Rote Liste der gefährdeten Tiere Bayerns. - Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 111: 206-256.

BERGMANN, A. (1954-1955): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. - Urania Verlag, Leipzig/Jena, Bd. 4: 1060 pp, Bd. 5: 1267 pp.

BURMANN, K. & HUEMER, P. (1984): Die Kleinschmetterlingssammlung von Prof. Franz Gradl in der Vorarlberger Naturschau, Dornbirn. - Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, Suppl. 1, 64 pp.

BURMANN, K. & HUEMER, P. (1988): Die Großschmetterlingssammlung von Prof. Franz Gradl in der Vorarlberger Naturschau, Dornbirn. - Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, Suppl. 3, 64 pp.

EBERT, G. (Hrsg.) (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Ulmer Verlag, Stuttgart, Bd. 1: 552 pp, Bd. 2: 535 pp.

EBERT, G. (Hrsg.) (1994): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Ulmer Verlag, Stuttgart, Bd. 3: 518 pp, Bd. 4: 535 pp.

EMMET, A.M. (Hrsg.) (1979): A Field Guide to the Smaller British Lepidoptera. - British Ent. & Nat. Hist. Soc., London, 271 pp.

ERHARDT, A. (1985): Wiesen und Brachland als Lebensraum für Schmetterlinge. Eine Feldstudie im Tavetsch (GR). Birkhäuser Verlag, Basel, 154 pp.

FREINA, J.DE & WITT, T. (1987): Die Bombyces und Sphinges der Westpaläarktis (Insecta, Lepidoptera). - Edition FW, München, 1: 708 pp.

GÄCHTER, E. (1995): Untersuchungen zur Heuschreckenfauna im Projektgebiet „Untere Ill“ und Bedeutung natürlicher Flußläufe für eine spezialisierte Fauna. 21 pp. [unveröffentlichtes Manuskript].

GEPP, J. (Hrsg.) (1986): Auengewässer als Ökozellen. Grüne Reihe (BMGU), Band 4, 2. Auflage, Wien, 322 pp.

GRABHER, M. & BLUM, V. (1990): Naturschutzgebiet Rheindelta. RAMSAR Bericht 1: 1-158, Umweltbundesamt Wien.

- GRABHER, M. & LUTZ, S. (1995): Vorprojekt Flußbauliche Sanierung/Renaturierung Untere Ill. Arbeitsgruppe Ökologie: Teilbericht Vegetation. 18 pp. [unveröffentlichtes Manuskript].
- GRABHERR, G. & POLATSCHKEK, A. (1986): Lebensräume und Flora Vorarlbergs. Dornbirn, 263 pp.
- HUEMER, P. (1988): Kleinschmetterlinge an Rosaceae unter besonderer Berücksichtigung ihrer Vertikalverbreitung. - Neue ent. Nachr. 20: 1-376.
- HUEMER, P. (1990): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Schmetterlingen (Lepidoptera) der Innauen bei Kufstein/Langkampfen (Nordtirol, Österreich). - Veröff. tirol. Landesmus. Ferdinandeum 69: 59-106.
- HUEMER, P. (1991): Bestandesaufnahme der Schmetterlinge (Lepidoptera) im Gebiet der Lech-Akkumulationsstrecke zwischen Stanzach und Forchach (Nordtirol, Österreich). Veröff. tirol. Landesmus. Ferdinandeum, Suppl. 4, 57 pp.
- HUEMER, P. (1994): Schmetterlinge (Lepidoptera) im Naturschutzgebiet Rheindelta (Vorarlberg, Österreich): Artenbestand, Ökologie, Gefährdung. Linzer biol. Beitr. 26: 3-132.
- HUEMER, P., REICHL, E.R. & WIESER, C. (RED.) (1994): Großschmetterlinge (Macrolepidoptera). In: GEPP, J. (Hrsg.), Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, p. 215-264.
- HUEMER, P. (1995): Zoologische Bewertungen von Leitorganismen (Schmetterlinge) im Bereich der Unteren Ill. 52 pp. [unveröffentlichtes Manuskript].
- HUEMER, P. (1995): Faunistisch-ökologische Erfassungen von Wirbellosen im Bereich der Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg, Österreich). Teil 1: Bestandsaufnahme und ökologische Bewertung der Schmetterlinge. 130 pp. [unveröffentlichtes Manuskript].
- HUEMER, P. (1996): Frühzeitige Mahd, ein bedeutender Gefährdungsfaktor für Schmetterlinge der Streuwiesen (NSG Rheindelta, Vorarlberg, Österreich). Berichte der Vorarlberger Naturschau 1: 265-300.
- HUEMER, P. & TARMANN, G. (1993): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die einzelnen Bundesländer. Veröff. tirol. Landesmus. Ferdinandeum, Suppl. 5, 224 pp.
- JÄGER, L. (1990): Tagfalter im Ruggeller Riet. - Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg 18: 417-420.
- KASY, F. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des WWF-Naturreservates Marchauen/Marchegg (mit Nani-Au) in Niederösterreich. - Z. ArbGem. öst. Ent. Bd. 41, Suppl., 24 pp.
- KLIMESCH, J. (1990): In: KUSDAS, K. & REICHL, E.R., Die Schmetterlinge Oberösterreichs, Teil 6: Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge I. Linz, 332 pp.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Verlag J. Neumann-Neudamm, Melsungen, 792 pp.
- LASTUVKA, Z. & LASTUVKA, A. (1995): An Illustrated Key to European Sesiidae (Lepidoptera). - Fac. Agron., Mendel Univ. agricult. forest., Brno, 174 pp.
- LAZOWSKI, W. (1990): Flussauen in Österreich. Report Umweltbundesamt, 32 pp, Wien.
- LERAUT, P. (1980): Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. - Suppl. a Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., Paris, 334 pp.

- MEINEKE, J.-U. (1982): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) der Verlandungsmoore des württembergischen Alpenvorlandes. Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Komplex Flachmoor - Übergangsmoor - Hochmoor. - Dissertation Universität Tübingen, 494 pp. [unveröffentlicht]
- MÜLLER, R. & GRIMM, K. (1990): Zur Kenntnis der Nachtschmetterlings-Fauna des Ruggeller Rietes (Insecta: Lepidoptera). - Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg, Bd. 18: 235-256.
- PALM, E. (1986): Nordeuropas Pyralider (Lepidoptera: Pyralidae). - Danmarks Dyreliv 3: 287 pp.
- PALM, E. (1989): Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophoridae). - Danmarks Dyreliv 4: 247 pp.
- PRÖSE, H. (1987): „Kleinschmetterlinge“: Wissensstand, Erhebungen und Artenschutzproblematik. Anhang: Artenliste der in Bayern und den angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). - Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 77: 37-102.
- RAZOWSKI, J. (1970): Cochyliidae. Microlepidoptera Palearctica, (MP). - Verlag G.Fromme & Co., Wien, II: 528 pp.
- REZBANYAI, L. (1981): Zur Insektenfauna des Siedereiteiches bei Hochdorf, Kanton Luzern. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ (Nachtgrossfalter). - Ent. Ber. Luzern 5: 17-67.
- REZBANYAI-RESER, L. (1989): Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Neudorf, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). - Ent. Ber. Luzern 22: 21-102.
- REZBANYAI-RESER, L. (1992): Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei Maschwanden ZH. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). - Ent. Ber. Luzern 27: 25-114
- SCHNACK, K. (Hrsg.) (1985): Catalogue of the Lepidoptera of Denmark. - Ent. Meddr. 52 (2-3): 1-163.
- SCHÜTZE, K.T. (1931): Die Biologie der Kleinschmetterlinge unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nährpflanzen und Erscheinungszeiten. - Frankfurt a.M., 235 pp.
- SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten Gefährdung Schutz. - Basel, XI + 516 pp.
- TRAUGOTT-OLSEN, E. & SCHMIDT NIELSEN, E. (1977): The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna ent. scand. 6: 1-299.

Anschrift des Autors:

Mag. Dr. Peter Huemer

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Naturwissenschaftliche Sammlungen

Feldstraße 11a

A-6020 Innsbruck

Anhang: Artenverzeichnis

Legende:

* = Erstnachweis bzw. einziger Nachweis für Vorarlberg!

AUNR = Artnummer nach HUEMER & TARMANN (1993); diese Nummer wird auch für die Datenbank verwendet.**GATARTAUT** = Gattungs- und Artname (bzw. Familienname) sowie Autor und Jahreszahl der Erstbeschreibung.

AU	GATARTAUT		
NR			
	MICROPTERIGIDAE		
0002	<i>Micropteryx aureatella</i> (SCOPOLI, 1763)	0089	<i>Stigmella poterii</i> (STAINTON, 1857)
0003	<i>Micropteryx aruncella</i> (SCOPOLI, 1763)	0090	<i>Stigmella ulmariae</i> (WOCKE, 1879)
0004	<i>Micropteryx tunbergella</i> (FABRICIUS, 1787)	0094	<i>Stigmella hemargyrella</i> (KOLLAR, 1832)
0007	<i>Micropteryx rothenbachii</i> FREY, 1856	0097	<i>Stigmella basiguttella</i> (HEINEMANN, 1862)
0010	<i>Micropteryx calthella</i> (LINNAEUS, 1761)	0133	<i>Ectoedemia intumella</i> (ZELLER, 1848)
	ERIOCRANIIDAE	0134	<i>Ectoedemia hannoverella</i> (GLITZ, 1872)
0014	<i>Dyseriocrania subpurpurella</i> (HAWORTH, 1828)	0135	<i>Ectoedemia turbidella</i> (ZELLER, 1848)
0016	<i>Heringocrania unimaculella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)*	0137	<i>Ectoedemia argyropeza</i> (ZELLER, 1839)
0017	<i>Eriocrania sparrmannella</i> (BOSC, 1791)*	0142	<i>Ectoedemia albifasciella</i> (HEINEMANN, 1871)
0020	<i>Eriocrania sangii</i> (WOOD, 1891)*	0151	<i>Ectoedemia angulifasciella</i> (STAINTON, 1849)
0021	<i>Eriocrania semipurpurella</i> (STEPHENS, 1835)*	0154	<i>Ectoedemia rubivora</i> (WOCKE, 1860)
	HEPIALIDAE		OPOSTEGIDAE
0023	<i>Triodia sylvina</i> (LINNAEUS, 1761)	0162	<i>Pseudopostega crepusculella</i> (ZELLER, 1839)
0024	<i>Korscheltellus lupulinus</i> (LINNAEUS, 1758)		HELIOZELIDAE
0027	<i>Phymatopus hectus</i> (LINNAEUS, 1758)	0163	<i>Heliozela sericiella</i> (HAWORTH, 1828)
0028	<i>Hepialus humuli</i> (LINNAEUS, 1758)	0165	<i>Heliozela resplendella</i> (STAINTON, 1851)
	NEPTICULIDAE	0166	<i>Antispila metallella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
0031	<i>Stigmella naturnella</i> (KLIMESCH, 1936)	0167	<i>Antispila treitschkiella</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843)*
0032	<i>Stigmella lapponica</i> (WOCKE, 1862)		ADELIDAE
0039	<i>Stigmella luteella</i> (STAINTON, 1857)	0170	<i>Nematopogon schwarziellus</i> (ZELLER, 1839)
0040	<i>Stigmella glutinosae</i> (STAINTON, 1858)	0174	<i>Nematopogon swammerdamella</i> (LINNAEUS, 1758)
0042	<i>Stigmella microtheriella</i> (STAINTON, 1854)	0177	<i>Nemophora metallica</i> (PODA, 1761)
0043	<i>Stigmella prunetorum</i> (STAINTON, 1855)	0180	<i>Nemophora violaria</i> RAZOWSKI, 1978
0044	<i>Stigmella aceris</i> (FREY, 1857)	0185	<i>Nemophora degeerella</i> (LINNAEUS, 1758)
0048	<i>Stigmella anomalella</i> (GOEZE, 1783)	0187	<i>Nemophora ochsenheimerella</i> (HÜBNER, 1813)
0050	<i>Stigmella ulmivora</i> (FOLOGNE, 1860)	0192	<i>Adela croesella</i> (SCOPOLI, 1763)
0053	<i>Stigmella sanguisorbae</i> (WOCKE, 1865)	0200	<i>Cauchas rufimitrella</i> (SCOPOLI, 1763)
0056	<i>Stigmella paradoxa</i> (FREY, 1858)		INCURVARIIDAE
0058	<i>Stigmella crataegella</i> (KLIMESCH, 1936)	0202	<i>Incurvaria praelatella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
0061	<i>Stigmella oxyacanthella</i> (STAINTON, 1854)	0203	<i>Incurvaria oehlmanniella</i> (HÜBNER, 1796)
0064	<i>Stigmella desperatella</i> (FREY, 1856)	0209	<i>Incurvaria masculella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
0065	<i>Stigmella hybnerella</i> (HÜBNER, 1796)	0214	<i>Lampronia flavimitrella</i> (HÜBNER, 1817)
0067	<i>Stigmella flosactella</i> (HAWORTH, 1828)	0215	<i>Lampronia morosa</i> ZELLER, 1852*
0070	<i>Stigmella salicis</i> (STAINTON, 1854)		TISCHERIIDAE
0073	<i>Stigmella obliquella</i> (HEINEMANN, 1862)	0225	<i>Tischeria ekebladella</i> (BJERKANDER, 1795)
0075	<i>Stigmella trimaculella</i> (HAWORTH, 1828)	0226	<i>Tischeria dodonaea</i> STAINTON, 1858
0078	<i>Stigmella plagicolella</i> (STAINTON, 1854)	0228	<i>Tischeria marginea</i> (HAWORTH, 1828)
0082	<i>Stigmella splendidissima</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)		

0231	<i>Tischeria angusticollata</i> (DUPONCHEL, 1843)	0477	<i>Phyllonorycter cerasicolella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
	PSYCHIDAE	0478	<i>Phyllonorycter lantanaella</i> (SCHRANK, 1802)
0260	<i>Psyche casta</i> (PALLAS, 1767)	0479	<i>Phyllonorycter salictella</i> (ZELLER, 1846)
0276	<i>Epichnopteryx plumella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	0484	<i>Phyllonorycter strigulatella</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)
0284	<i>Canephora hirsuta</i> (PODA, 1761)	0487	<i>Phyllonorycter tristrigella</i> (HAWORTH, 1828)
0294	<i>Sternhopteryx fusca</i> (HAWORTH, 1809)	0488	<i>Phyllonorycter oxyacanthae</i> (FREY, 1856)
	TINEIDAE	0491	<i>Phyllonorycter blancardella</i> (FABRICIUS, 1781)
0317x	<i>Dryadaula irinae</i> (SAVENKOV, 1989)*	0496	<i>Phyllonorycter lautella</i> (ZELLER, 1846)
0324	<i>Nemapogon granella</i> (LINNAEUS, 1758)	0500	<i>Phyllonorycter nicellii</i> (STAINTON, 1851)
0326	<i>Nemapogon wolffiella</i> KARSHOLT & NIELSEN, 1976	0501	<i>Phyllonorycter coryli</i> (NICELLI, 1851)
0331	<i>Nemapogon clematella</i> (FABRICIUS, 1781)	0503	<i>Phyllonorycter froelichiella</i> (ZELLER, 1839)
0346	<i>Monopis obviella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	0504	<i>Phyllonorycter maestingella</i> (MÜLLER, 1764)
0349	<i>Monopis monachella</i> (HÜBNER, 1796)	0507	<i>Phyllonorycter harrisella</i> (LINNAEUS, 1761)
0364	<i>Tinea trinotella</i> THUNBERG, 1794	0509	<i>Phyllonorycter roboris</i> (ZELLER, 1839)
	BUCCULATRICIDAE	0512	<i>Phyllonorycter muelleriella</i> (ZELLER, 1839)*
0375	<i>Bucculatrix ulmella</i> ZELLER, 1848	0515	<i>Phyllonorycter emberizaepenella</i> (BOUCHE, 1834)
0376	<i>Bucculatrix thoracella</i> (THUNBERG, 1794)	0524	<i>Phyllonorycter geniculella</i> (RAGONOT, 1874)
0378	<i>Bucculatrix bechsteinella</i> (BECHSTEIN & SCHARFENBERG, 1805)	0525	<i>Phyllocnistis saligna</i> (ZELLER, 1839)
0379	<i>Bucculatrix frangutella</i> (GOEZE, 1783)	0527	<i>Phyllocnistis unipunctella</i> (STEPHENS, 1834)
0380	<i>Bucculatrix cidarella</i> (ZELLER, 1839)		YPONOMEUTIDAE
0384	<i>Bucculatrix nigricomella</i> (ZELLER, 1839)	0528	<i>Scythropia crataegella</i> (LINNAEUS, 1767)
0386	<i>Bucculatrix cristatella</i> (ZELLER, 1839)	0529	<i>Yponomeuta evonymella</i> (LINNAEUS, 1758)
	ROESLERSTAMMIIDAE	0530	<i>Yponomeuta padella</i> (LINNAEUS, 1758)
0397	<i>Roeslerstammia erxebella</i> (FABRICIUS, 1787)	0532	<i>Yponomeuta cagnagella</i> (HÜBNER, 1813)
	GRACILLARIIDAE	0535	<i>Yponomeuta plumbella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
0399	<i>Caloptilia syringella</i> (FABRICIUS, 1794)	0538	<i>Zelleria hepariella</i> STAINTON, 1849
0402	<i>Caloptilia cuculipennella</i> (HÜBNER, 1796)	0557	<i>Cedestis gysseleniella</i> ZELLER, 1839
0405	<i>Caloptilia elongella</i> (LINNAEUS, 1761)	0563	<i>Prays fraxinella</i> (BJERKANDER, 1784)
0406	<i>Caloptilia roscipennella</i> (HÜBNER, 1796)	0564	<i>Prays ruficeps</i> (HEINEMANN, 1854)
0408	<i>Caloptilia rufipennella</i> (HÜBNER, 1796)	0569	<i>Argyresthia amiantella</i> ZELLER, 1847*
0411	<i>Caloptilia fidella</i> (REUTTI, 1853)	0577x	<i>Argyresthia trifasciata</i> STAUDINGER*
0412	<i>Caloptilia hemidactylella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)*	0580	<i>Argyresthia goedartella</i> (LINNAEUS, 1758)
0415	<i>Caloptilia alchimiella</i> (SCOPOLI, 1763)	0581	<i>Argyresthia brockeella</i> (HÜBNER, 1813)
0416	<i>Caloptilia robustella</i> JÄCKH, 1972*	0583	<i>Argyresthia retinella</i> ZELLER, 1839
0417	<i>Caloptilia stigmatella</i> (FABRICIUS, 1781)	0584	<i>Argyresthia ivella</i> (HAWORTH, 1828)
0418	<i>Caloptilia falconipennella</i> (HÜBNER, 1813)*	0588	<i>Argyresthia albistria</i> (HAWORTH, 1828)
0426	<i>Calybitis phasianipennella</i> (HÜBNER, 1813)	0589	<i>Argyresthia spinosella</i> STAINTON, 1849
0427	<i>Eucalybitis auroguttella</i> (STEPHENS, 1835)	0590	<i>Argyresthia pruniella</i> (CLERCK, 1759)
0434	<i>Acrocercops brongniardella</i> (FABRICIUS, 1798)	0591	<i>Argyresthia bonnetella</i> (LINNAEUS, 1758)
0436	<i>Parornix anglicella</i> (STAINTON, 1850)	0592	<i>Argyresthia conjugella</i> ZELLER, 1839
0439	<i>Parornix devoniella</i> (STAINTON, 1850)	0594	<i>Argyresthia semifusca</i> (HAWORTH, 1828)
0447	<i>Parornix torquilella</i> (ZELLER, 1850)		YPSOLOPHIDAE
0449	<i>Callisto denticulella</i> (THUNBERG, 1794)	0599	<i>Ypsolopha dentella</i> (FABRICIUS, 1775)
0459	<i>Phyllonorycter populifoliella</i> (TREITSCHKE, 1833)	0600	<i>Ypsolopha falcella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
0461	<i>Phyllonorycter sagitella</i> (BJERKANDER, 1790)	0601	<i>Ypsolopha asperella</i> (LINNAEUS, 1761)
0462	<i>Phyllonorycter comparella</i> (DUPONCHEL, 1843)	0608	<i>Ypsolopha parenthesesella</i> (LINNAEUS, 1761)
0466	<i>Phyllonorycter corylifoliella</i> (HÜBNER, 1796)	0609	<i>Ypsolopha ustella</i> (CLERCK, 1759)
0470	<i>Phyllonorycter quercifoliella</i> (ZELLER, 1839)	0611	<i>Ypsolopha vittella</i> (LINNAEUS, 1758)
0472	<i>Phyllonorycter ulmifoliella</i> (HÜBNER, 1817)		PLUTELLIDAE
0476	<i>Phyllonorycter pomonella</i> (ZELLER, 1846)	0619	<i>Plutella xylostella</i> (LINNAEUS, 1758)
		0632	<i>Digitivalva pulicariae</i> (KLIMESCH, 1956)
		0634	<i>Acrolepiopsis assectella</i> (ZELLER, 1839)

GLYPHIPTERIGIDAE

- 0639 *Glyphipterix thrasonella* (SCOPOLI, 1763)
 0644 *Glyphipterix simplicella* (STEPHENS, 1834)

BEDELLIIDAE

- 0647 *Bedellia somnulentella* (ZELLER, 1847)

LYONETIIDAE

- 0663 *Lyonetia clerkella* (LINNAEUS, 1758)

COLEOPHORIDAE

- 0672 *Coleophora lutipennella* (ZELLER, 1838)
 0675 *Coleophora gryphipennella* (HÜBNER, 1796)
 0676 *Coleophora flavipennella* (DUPONCHEL, 1843)
 0677 *Coleophora adjectella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861*
 0678 *Coleophora milvipennis* ZELLER, 1839*
 0685 *Coleophora coracipennella* (HÜBNER, 1796)
 0686 *Coleophora serratella* (LINNAEUS, 1761)
 0687 *Coleophora spinella* (SCHRANK, 1802)
 0693 *Coleophora fuscocuprella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855
 0695 *Coleophora luscinaepennella* (TREITSCHKE, 1833)
 0701 *Coleophora violacea* (STRÖM, 1783)
 0705 *Coleophora binderella* (KOLLAR, 1832)
 0706 *Coleophora ahenella* WOCKE, 1876
 0707 *Coleophora albitarsella* ZELLER, 1849
 0709 *Coleophora trifolii* (CURTIS, 1832)
 0711 *Coleophora lineolea* (HAWORTH, 1828)*
 0716 *Coleophora hemerobiella* (SCOPOLI, 1763)
 0725 *Coleophora niveicostella* ZELLER, 1839
 0728 *Coleophora discordella* ZELLER, 1839
 0736 *Coleophora deauratella* LIENIG & ZELLER, 1846
 0737 *Coleophora mayrella* (HÜBNER, 1813)
 0739 *Coleophora bernoulliella* (GOEZE, 1783)
 0740 *Coleophora albidella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 0741 *Coleophora kuehnella* (GOEZE, 1783)*
 0742 *Coleophora ibipennella* ZELLER, 1849*
 0744 *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854*
 0759 *Coleophora conspicuella* ZELLER, 1849
 0772 *Coleophora lixella* ZELLER, 1849
 0773 *Coleophora ornatipennella* (HÜBNER, 1796)
 0779 *Coleophora pennella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 0780 *Coleophora loricella* (HÜBNER, 1817)
 0783 *Coleophora caespitiella* ZELLER, 1839
 0787 *Coleophora alticolella* ZELLER, 1849
 0788 *Coleophora taenipennella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855
 0789 *Coleophora sylvaticella* WOOD, 1892*
 0828 *Coleophora trochilella* (DUPONCHEL, 1843)*
 0833 *Coleophora inulae* WOCKE, 1876
 0843 *Coleophora follicularis* (VALLOT, 1802)
 0856 *Coleophora paripennella* ZELLER, 1839*
 0864 *Coleophora wockeella* ZELLER, 1849
 0869 *Pseudatemelia josephinae* (TOLL, 1956)*

ELACHISTIDAE

- 0884 *Perittia herrichiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
 0888 *Elachista gleichenella* (FABRICIUS, 1781)
 0905 *Elachista albifrontella* (HÜBNER, 1817)
 0914 *Elachista humilis* ZELLER, 1850
 0915 *Elachista canapennella* (HÜBNER, 1813)
 0918 *Elachista monosemiella* (RÖSSLER, 1881)
 0919 *Elachista argentella* (CLERCK, 1759)
 0927 *Elachista subocellea* (STEPHENS, 1834)
 0955 *Elachista chrysoodesmella* ZELLER, 1850*
 0956 *Elachista megeriella* (HÜBNER, 1810)
 0961 *Elachista adscitella* STANTON, 1851
 0974 *Cosmiotes freyerella* (HÜBNER, 1825)
 0985 *Anchinia cristalis* (SCOPOLI, 1763)
 0989 *Ethmia dodecea* (HAWORTH, 1828)
 0990 *Ethmia quadrilella* (GOEZE, 1783)
 0993 *Ethmia pusiella* (LINNAEUS, 1758)
 0997 *Ethmia bipunctella* (FABRICIUS, 1775)
 1000 *Agonopterix heracliana* (LINNAEUS, 1758)
 1010 *Agonopterix kaekeritziana* (LINNAEUS, 1767)
 1013 *Agonopterix liturosa* (HAWORTH, 1811)
 1014 *Agonopterix conterminella* (ZELLER, 1839)
 1015 *Agonopterix ocellana* (FABRICIUS, 1775)
 1023 *Agonopterix astrantiae* (HEINEMANN, 1870)
 1025 *Agonopterix yeatiana* (FABRICIUS, 1781)
 1029 *Agonopterix angelicella* (HÜBNER, 1813)
 1031 *Agonopterix pallorella* (ZELLER, 1839)
 1032 *Agonopterix arenella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1035 *Agonopterix ciliella* (STANTON, 1849)
 1046 *Depressaria depressana* (FABRICIUS, 1775)
 1050 *Depressaria pimpinellae* ZELLER, 1839
 1063 *Depressaria albipunctella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1068 *Semioscopis strigulana* (FABRICIUS, 1785)
 1069 *Semioscopis steinkellneriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER)
 1071 *Semioscopis avellanella* (HÜBNER, 1793)

CHIMABACHIDAE

- 1075 *Diurnea fagella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1077 *Dasystema salicella* (HÜBNER, 1796)

CARCINIDAE

- 1078 *Carcina quercana* (FABRICIUS, 1775)

BATRACHEDRIDAE

- 1080 *Batrachedra praeangusta* (HAWORTH, 1828)
 1081 *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839)

OECOPHORIDAE

- 1092 *Tichonia tinctella* (HÜBNER, 1796)
 1093 *Batia unitella* (HÜBNER, 1796)
 1100 *Borkhausenia minutella* (LINNAEUS, 1758)
 1102 *Bisigna procerella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

1108	<i>Harpella forcicella</i> (SCOPOLI, 1763)	1446	<i>Platyedra subcinerea</i> (HAWORTH, 1828)
1110	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (STANTON, 1849)	1448	<i>Thiotricha subocellea</i> (STEPHENS, 1834)*
1111	<i>Herrichia excelsella</i> STAUDINGER, 1879	1468	<i>Syncopacma taeniolella</i> (ZELLER, 1839)
1117	<i>Aplota palpella</i> (HAWORTH, 1828)*	1472	<i>Syncopacma albipalpella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)
	SYMMOCIDAE	1477	<i>Anacampsis populella</i> (CLERCK, 1759)
1131	<i>Oegoconia quadripuncta</i> (HAWORTH, 1828)	1484	<i>Mesophleps silacella</i> (HÜBNER, 1796)
	SCYTHRIDIDAE	1495	<i>Dichomeris derasella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1166	<i>Scythris laminella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1500	<i>Dichomeris latipennella</i> (REBEL, 1937)
	BLASTOBASIDAE	1505	<i>Brachmia blandella</i> (FABRICIUS, 1798)*
1179	<i>Hypatopa binotella</i> (THUNBERG, 1794)	1510	<i>Helcystogramma rufescens</i> (HAWORTH, 1828)
	MOMPHIDAE	1512	<i>Acompsia cinerella</i> (CLERCK, 1759)
1195	<i>Mompha epilobiella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1514	<i>Acompsia tripunctella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
	COSMOPTERIGIDAE		COSSIDAE
1197	<i>Pancalia latreillella</i> CURTIS, 1830	1518	<i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758)
1199	<i>Cosmopterix zieglerella</i> (HÜBNER, 1810)*	1522	<i>Phragmataecia castaneae</i> (HÜBNER, 1790)
1201	<i>Cosmopterix orichalcea</i> STANTON, 1861	1523	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761)
1202	<i>Cosmopterix scribaniella</i> (ZELLER, 1850)		SESIIDAE
	GELECHIIDAE	1527	<i>Sesia apiformis</i> (CLERCK, 1759)
1258	<i>Argolamprotes micella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1528	<i>Sesia bembeciformis</i> (HÜBNER, 1806)
1259	<i>Monochroa tenebrella</i> (HÜBNER, 1817)	1530	<i>Paranthrene tabaniformis</i> (ROTTEMBURG, 1775)
1261	<i>Monochroa servella</i> (ZELLER, 1839)	1533	<i>Synanthedon spheciformis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1265	<i>Monochroa lutulentella</i> (ZELLER, 1839)	1535	<i>Synanthedon culciformis</i> (LINNAEUS, 1758)
1279	<i>Eulamprotes unicolorella</i> (DUPONCHEL, 1843)	1536	<i>Synanthedon formicaeformis</i> (ESPER, 1783)
1280	<i>Eulamprotes atrella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)*	1538	<i>Synanthedon andrenaeformis</i> (LASPEYRES, 1801)
1285	<i>Bryotropha senectella</i> (ZELLER, 1839)	1538x	<i>Synanthedon soffneri</i> SPATENKA, 1983*
1289	<i>Bryotropha terrella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1539	<i>Synanthedon vespiformis</i> (LINNAEUS, 1761)
1293	<i>Recurvaria nanella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1565	<i>Synanthedon tenthrediniformis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1294	<i>Recurvaria leucatella</i> (CLERCK, 1759)		ZYGAENIDAE
1300	<i>Parachronistis albiceps</i> (ZELLER, 1839)	1576	<i>Zygaena loti</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1301	<i>Teleiodes vulgella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1577	<i>Zygaena viciae</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1304	<i>Teleiodes wagae</i> (NOWICKI, 1860)*	1580	<i>Zygaena filipendulae</i> (LINNAEUS, 1758)
1307	<i>Teleiodes proximella</i> (HÜBNER, 1796)	1582	<i>Zygaena loniceræ</i> (SCHEVEN, 1777)
1310	<i>Teleiodes fugitivella</i> (ZELLER, 1839)	1587	<i>Zygaena purpuralis</i> (BRÜNNICH, 1763)
1314	<i>Teleiodes luculella</i> (HÜBNER, 1813)		LIMACODIDAE
1316	<i>Teleiodes sequax</i> (HAWORTH, 1828)	1598	<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766)
1322	<i>Gelechia rhombella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1599	<i>Heterogenea asella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1326	<i>Gelechia sororculella</i> (HÜBNER, 1817)		CHOREUTIDAE
1328	<i>Gelechia cuneatella</i> DOUGLAS, 1852*	1603	<i>Prochoreutis myllerana</i> (FABRICIUS, 1794)*
1332	<i>Gelechia nigra</i> (HAWORTH, 1828)	1607	<i>Choreutis pariana</i> (CLERCK, 1759)
1336	<i>Psoricoptera gibbosella</i> (ZELLER, 1839)		TORTRICIDAE
1345	<i>Chionodes luctuella</i> (HÜBNER, 1793)	1609	<i>Olindia schumacherana</i> (FABRICIUS, 1785)
1350	<i>Chionodes distinctella</i> (ZELLER, 1839)	1611	<i>Isotrias rectifasciana</i> (HAWORTH, 1811)
1352	<i>Chionodes electella</i> (ZELLER, 1839)	1616	<i>Phtheochroa inopiana</i> (HAWORTH, 1811)
1368	<i>Athrips mouffetella</i> (LINNAEUS, 1758)	1629	<i>Phalonidia manniana</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)
1413	<i>Caryocolum vicinella</i> (DOUGLAS, 1851)		

1634	<i>Phalonidia permixtana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1772	<i>Pandemis corylana</i> (FABRICIUS, 1794)
1637	<i>Agapeta zoegana</i> (LINNAEUS, 1767)	1773	<i>Pandemis cerasana</i> (HÜBNER, 1786)
1645	<i>Eupoecilia sanguisorbana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)	1774	<i>Pandemis heparana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1648	<i>Aethes cnicana</i> (WESTWOOD, 1854)	1775	<i>Pandemis dumetana</i> (TREITSCHKE, 1835)
1649	<i>Aethes rubigana</i> (TREITSCHKE, 1830)	1776	<i>Syndemis musculana</i> (HÜBNER, 1799)
1654	<i>Aethes smeathmanniana</i> (FABRICIUS, 1781)	1778	<i>Aphelia viburnana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1656	<i>Aethes tesserana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1779	<i>Aphelia paleana</i> (HÜBNER, 1793)
1663	<i>Aethes hartmanniana</i> (CLERCK, 1759)	1782	<i>Dichelia histronana</i> (FRÖLICH, 1828)
1674	<i>Cochylidia heydeniana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	1787	<i>Clepsis rurinana</i> (LINNAEUS, 1758)
1682	<i>Cochylis pallidana</i> ZELLER, 1847	1793	<i>Adoxophyes orana</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)
1685	<i>Cochylis nana</i> (HAWORTH, 1811)	1795	<i>Bactra lancealana</i> (HÜBNER, 1799)
1686	<i>Falseuncaria ruficiliana</i> (HAWORTH, 1811)	1796	<i>Bactra lacteana</i> CARADJA, 1916
1687	<i>Spatalistis bifasciana</i> (HÜBNER, 1787)	1800	<i>Endothenia marginana</i> (HAWORTH, 1811)
1688	<i>Tortrix viridana</i> (LINNAEUS, 1758)	1805	<i>Endothenia quadrimaculana</i> (HAWORTH, 1811)
1689	<i>Aleimma loeflingianum</i> (LINNAEUS, 1758)	1808	<i>Eudemis porphyra</i> (HÜBNER, 1799)
1692	<i>Acleris holmiana</i> (LINNAEUS, 1758)	1813	<i>Pseudosciaphila branderiana</i> (LINNAEUS, 1758)
1693	<i>Acleris laterana</i> (FABRICIUS, 1794)	1814	<i>Apotomis semifasciana</i> (HAWORTH, 1811)
1695	<i>Acleris sparsana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1816	<i>Apotomis lineana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1696	<i>Acleris rhombana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1818	<i>Apotomis capreana</i> (HÜBNER, 1817)
1697	<i>Acleris aspersana</i> (HÜBNER, 1817)	1819	<i>Apotomis betuletana</i> (HAWORTH, 1811)
1698	<i>Acleris ferrugana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1821	<i>Apotomis sauciana</i> (FRÖLICH, 1828)
1699	<i>Acleris notana</i> (DONOVAN, 1806)	1823	<i>Orthotaenia undulana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1702	<i>Acleris schalleriana</i> (LINNAEUS, 1761)	1824	<i>Hedya salicella</i> (LINNAEUS, 1758)
1712	<i>Acleris cristana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1825	<i>Hedya dimidialba</i> (RETZIUS, 1783)
1717	<i>Acleris abietana</i> (HÜBNER, 1822)*	1826	<i>Hedya pruniana</i> (HÜBNER, 1799)
1719	<i>Acleris literana</i> (LINNAEUS, 1758)	1831	<i>Celypha rufana</i> (SCOPOLI, 1763)
1720	<i>Acleris emargana</i> (FABRICIUS, 1775)	1832	<i>Celypha striana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1723	<i>Neosphaleroptera nubilana</i> (HÜBNER, 1799)	1840	<i>Celypha lacunana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1725	<i>Doloploca punctulana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1842	<i>Celypha rivulana</i> (SCOPOLI, 1763)
1726	<i>Exapate congelatella</i> (CLERCK, 1759)	1843	<i>Celypha doubledayana</i> (BARRETT, 1872)
1728	<i>Tortricodes alternella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1844	<i>Celypha aurofasciana</i> (HAWORTH, 1811)
1729	<i>Eana argentana</i> (CLERCK, 1759)	1852	<i>Phiaris olivana</i> (TREITSCHKE, 1830)
1730	<i>Eana osseana</i> (SCOPOLI, 1763)	1865	<i>Olethreutes arcuella</i> (CLERCK, 1759)
1732	<i>Eana penziana</i> (THUNBERG, 1791)	1867	<i>Pseudohermenias abietana</i> (FABRICIUS, 1787)
1733	<i>Eana incanana</i> (STEPHENS, 1852)	1870	<i>Lobesia reliquana</i> (HÜBNER, 1825)
1736	<i>Cnephasia incertana</i> (TREITSCHKE, 1835)	1883	<i>Rhopobota naevana</i> (HÜBNER, 1817)
1737	<i>Cnephasia stephensiana</i> (DOUBLEDAY, 1849)	1886	<i>Spilonota ocellana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1739	<i>Cnephasia asseclana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1891	<i>Epinotia solandriana</i> (LINNAEUS, 1758)
1748	<i>Sparganothis pilleriana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1897	<i>Epinotia abbreviana</i> (FABRICIUS, 1794)*
1749	<i>Eulia ministrana</i> (LINNAEUS, 1758)	1898	<i>Epinotia subocellana</i> (DONOVAN, 1806)
1750	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i> (FABRICIUS, 1775)	1899	<i>Epinotia bilunana</i> (HAWORTH, 1811)
1756	<i>Capua vulgana</i> (FRÖLICH, 1828)	1902	<i>Epinotia immundana</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)
1759	<i>Archips oporana</i> (LINNAEUS, 1758)	1904	<i>Epinotia tetraquetra</i> (HAWORTH, 1811)
1760	<i>Archips podana</i> (SCOPOLI, 1763)	1906	<i>Epinotia nisella</i> (CLERCK, 1759)
1763	<i>Archips xylosteana</i> (LINNAEUS, 1758)	1908	<i>Epinotia tenerana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
1764	<i>Archips rosana</i> (LINNAEUS, 1758)	1911	<i>Epinotia tedella</i> (CLERCK, 1759)
1766	<i>Choristoneura diversana</i> (HÜBNER, 1817)	1915	<i>Epinotia signatana</i> (DOUGLAS, 1845)
1769	<i>Ptycholomoides aeriferanus</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	1921	<i>Epinotia nanana</i> (TREITSCHKE, 1835)
1770	<i>Ptycholoma lecheana</i> (LINNAEUS, 1758)	1923	<i>Epinotia huebneriana</i> KOCÁK, 1980
1771	<i>Pandemis cinnamomeana</i> (TREITSCHKE, 1830)		

- 1924 *Epinotia pygmaeana* (HÜBNER, 1799)
 1927 *Zeiraphera ratzeburgiana* (SAXESEN, 1840)
 1929 *Zeiraphera isertana* (FABRICIUS, 1794)
 1930 *Zeiraphera griseana* (HÜBNER, 1799)
 1944 *Eucosma cana* (HAWORTH, 1811)
 1946 *Eucosma hohenwartiana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1948 *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893)
 1951 *Eucosma campoliliana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1964 *Gypsonoma dealbana* (FRÖLICH, 1828)
 1968 *Gypsonoma sociana* (HAWORTH, 1811)
 1969 *Gypsonoma oppressana* (TREITSCHKE, 1835)
 1971 *Epiblema sticticana* (FABRICIUS, 1794)
 1980 *Epiblema cirsiana* (ZELLER, 1843)
 1985 *Notocelia cynosbatella* (LINNAEUS, 1758)
 1987 *Notocelia uddmanniana* (LINNAEUS, 1758)
 1988 *Notocelia roborana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 1990 *Notocelia rosaeolana* (DOUBLEDAY, 1850)
 1991 *Notocelia trimaculana* (HAWORTH, 1811)
 1993 *Coccyx turionella* (LINNAEUS, 1758)*
 1999 *Rhyacionia pinivorana* (LIENIG & ZELLER, 1846)
 2002 *Eucosmomorpha albersana* (HÜBNER, 1813)
 2003 *Enarmonia fomosana* (SCOPOLI, 1763)
 2010 *Ancylis geminana* (DONOVAN, 1806)
 2014 *Ancylis apicella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2018 *Ancylis mitterbacheriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2022 *Ancylis rhenana* MÜLLER-RUTZ, 1920
 2025 *Cydia compositella* (FABRICIUS, 1775)
 2030 *Cydia caecana* (SCHLÄGER, 1847)
 2034 *Cydia jungiella* (CLERCK, 1759)
 2048 *Cydia succedana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2051 *Cydia microgrammana* (GUENÉE, 1845)
 2054 *Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)
 2060 *Cydia strobilella* (LINNAEUS, 1758)
 2071 *Cydia penkleriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2072 *Cydia fagiglandana* (ZELLER, 1841)
 2075 *Lathronympha strigana* (FABRICIUS, 1775)
 2076 *Pammene aurana* (FABRICIUS, 1775)
 2079 *Pammene fasciana* (LINNAEUS, 1761)
 2084 *Pammene albuginana* (GUENÉE, 1845)
 2088 *Pammene rhediella* (CLERCK, 1759)
 2098 *Strophedra nitidana* (FABRICIUS, 1794)*
 2102 *Dichrorampha plumbana* (SCOPOLI, 1763)
 2109 *Dichrorampha consortana* STEPHENS, 1852
 2123 *Dichrorampha petiverella* (LINNAEUS, 1758)
- EPERMENIIDAE**
- 2141 *Epermenia illigerella* (HÜBNER, 1813)
 2141x *Epermenia falciformis* (HAWORTH, 1811)*
- PTEROPHORIDAE**
- 2170 *Platyptilia gonodactyla* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2178 *Stenoptilia pneumonanthes* (BÜTTNER, 1880)
 2182 *Stenoptilia succisae* GIBEAUX & NEL, 1991
 2194 *Adaina microdactyla* (HÜBNER, 1813)
 2196 *Oidaematophorus carphodactylus* (HÜBNER, 1813)
 2203 *Oidaematophorus lithodactyla* (TREITSCHKE, 1833)
 2206 *Pterophorus pentadactylus* (LINNAEUS, 1758)
 2208 *Merrifieldia leucodactyla* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2216 *Emmelina monodactyla* (LINNAEUS, 1758)
- PYRALIDAE**
- 2222 *Achroia grisella* (FABRICIUS, 1794)
 2224 *Aphomia sociella* (LINNAEUS, 1758)
 2228 *Hypsoxygia costalis* (FABRICIUS, 1775)
 2231 *Synaphe punctalis* (FABRICIUS, 1775)
 2233 *Orthopygia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758)
 2239 *Endotricha flammealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2243 *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763)
 2244 *Laodamia faecella* (ZELLER, 1839)
 2248 *Salebriopsis albicilla* (HERRICH-SCHÄFFER, 1849)
 2259 *Phycita roborella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2260 *Dioryctria abietella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2262 *Dioryctria schuetzeella* FUCHS, 1899
 2263 *Dioryctria sylvestrella* (RATZEBURG, 1840)
 2266 *Hypochalcia ahenella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2268 *Hypochalcia lignella* (HÜBNER, 1796)*
 2280 *Pempeliella ornata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2282 *Pempeliella dilutella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)*
 2284 *Nephoterix angustella* (HÜBNER, 1796)
 2287 *Acrobasis sodalella* ZELLER, 1848
 2289 *Conobathra tumidana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2292 *Trachycera advenella* (ZINCKEN, 1818)
 2306 *Eccopisa effractella* ZELLER, 1848
 2307 *Assara terebrella* (ZINCKEN, 1818)
 2308 *Euzophera pinguis* (HAWORTH, 1811)
 2313 *Nyctegretis lineana* (SCOPOLI, 1786)
 2323 *Phycitodes maritima* (TENGGSTRÖM, 1848)
 2324 *Phycitodes binaevella* (HÜBNER, 1813)
 2332 *Ephestia elutella* (HÜBNER, 1796)
- CRAMBIDAE**
- 2341 *Chilo phragmitella* (HÜBNER, 1810)
 2345 *Chrysoteuchia culmella* (LINNAEUS, 1758)
 2346 *Crambus pascuella* (LINNAEUS, 1758)
 2348 *Crambus uliginosella* (ZELLER, 1850)*
 2351 *Crambus pratella* (LINNAEUS, 1758)
 2352 *Crambus lathonellus* (ZINCKEN, 1817)
 2354 *Crambus perlata* (SCOPOLI, 1763)
 2357 *Agriphila tristella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2358 *Agriphila inquinatella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2359 *Agriphila selasella* (HÜBNER, 1813)

- 2360 *Agriphila straminella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2364 *Catoptria permutatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)
- 2374 *Catoptria margaritella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2378 *Catoptria falsella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2381 *Catoptria verellus* (ZINCKEN, 1817)
- 2387 *Xanthocrambus lucellus* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)
- 2397 *Platytes alpinella* (HÜBNER, 1813)
- 2401 *Elophila nymphaeata* (LINNAEUS, 1758)
- 2406 *Nymphula stagnata* (DONOVAN, 1806)
- 2414b *Scoparia subfusca zelleri* (WOCKE, 1855)
- 2415 *Scoparia basistrigalis* KNAGGS, 1866
- 2416 *Scoparia ambigualis* (TREITSCHKE, 1829)
- 2417 *Scoparia ancipitella* (LA HARPE, 1855)*
- 2418 *Scoparia conicella* (LA HARPE, 1863)*
- 2421 *Dipleurina lacustrata* (PANZER, 1804)
- 2422 *Eudonia pallida* (CURTIS, 1827)
- 2424 *Eudonia truncicoella* (STANTON, 1849)
- 2429 *Eudonia delunella* (STANTON, 1849)
- 2431 *Eudonia mercurella* (LINNAEUS, 1758)
- 2437 *Evergestis forficalis* (LINNAEUS, 1758)
- 2439 *Evergestis pallidata* (HUFNAGEL, 1767)
- 2445 *Cynaeda dentalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2455 *Pyrausta aurata* (SCOPOLI, 1763)
- 2456 *Pyrausta purpuralis* (LINNAEUS, 1758)
- 2460 *Pyrausta despicata* (SCOPOLI, 1763)
- 2464 *Pyrausta nigrata* (SCOPOLI, 1763)
- 2467 *Pyrausta cingulata* (LINNAEUS, 1758)
- 2477 *Sitochroa palealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2478 *Sitochroa verticalis* (LINNAEUS, 1758)
- 2480 *Microstega pandalis* (HÜBNER, 1825)
- 2481 *Microstega hyalinalis* (HÜBNER, 1796)
- 2484 *Ostrinia nubilalis* (HÜBNER, 1796)
- 2486 *Eurrhyncha hortulata* (LINNAEUS, 1758)
- 2487 *Perinephela lancealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2488 *Phlyctaenia coronata* (HUFNAGEL, 1767)
- 2490 *Phlyctaenia stachydalis* (ZINCKEN, 1821)
- 2498 *Opsibotys fuscalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2502 *Udea prunalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2505 *Udea olivalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2517 *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796)
- 2518 *Mecyna flavalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2521 *Nomophila noctuella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2524 *Diasemia reticularis* (LINNAEUS, 1761)
- 2528 *Pleuroptya ruralis* (SCOPOLI, 1763)
- THYRIDIDAE**
- 2531 *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763)
- LASIOCAMPIDAE**
- 2532 *Malacosoma neustrium* (LINNAEUS, 1758)
- 2535a *Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758)
- 2536 *Poecilocampa populi* (LINNAEUS, 1758)
- 2538 *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758)
- 2542a *Lasiocampa quercus* (LINNAEUS, 1758)
- 2543 *Lasiocampa trifolii* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 2544 *Macrothylacia rubi* (LINNAEUS, 1758)
- 2545 *Euthrix potatoria* (LINNAEUS, 1758)
- 2551 *Odonestis pruni* (LINNAEUS, 1758)
- 2552 *Dendrolimus pini* (LINNAEUS, 1758)
- ENDROMIDIDAE**
- 2555 *Endromis versicolora* (LINNAEUS, 1758)
- SPHINGIDAE**
- 2556 *Agrius convolvuli* (LINNAEUS, 1758)
- 2558 *Sphinx ligustri* (LINNAEUS, 1758)
- 2559 *Hyloicus pinastri* (LINNAEUS, 1758)
- 2561 *Smerinthus ocellatus* (LINNAEUS, 1758)
- 2562 *Mimas tiliae* (LINNAEUS, 1758)
- 2563 *Laothoe populi* (LINNAEUS, 1758)
- 2564 *Hemaris tityus* (LINNAEUS, 1758)
- 2565 *Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758)
- 2567 *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758)
- 2571 *Hyles euphorbiae* (LINNAEUS, 1758)
- 2572 *Hyles gallii* (ROTTEMBURG, 1775)
- 2575 *Deilephila elpenor* (LINNAEUS, 1758)
- 2576 *Deilephila porcellus* (LINNAEUS, 1758)
- SATURNIIDAE**
- 2578 *Saturnia pavonia* (LINNAEUS, 1758)
- 2583 *Aglia tau* (LINNAEUS, 1758)
- HESPERIIDAE**
- 2584 *Carterocephalus palaemon* (PALLAS, 1771)
- 2586 *Thymelicus sylvestris* (PODA, 1761)
- 2587 *Thymelicus lineolus* (OCHSENHEIMER, 1808)
- 2589 *Hesperia comma* (LINNAEUS, 1758)
- 2590b *Ochlodes venatus faunus* TURATI, 1905
- 2591 *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758)
- 2592 *Carcharodes alceae* (ESPER, 1780)
- 2594 *Carcharodes flocciferus* (ZELLER, 1847)
- 2595 *Spialia sertorius* (HOFFMANSEGG, 1804)
- 2596 *Pyrgus malvae* (LINNAEUS, 1758)
- 2598 *Pyrgus armoricanus* OBERTHÜR, 1910
- 2606b *Pyrgus fritillarius valesiacus* MABILLE, 1876
- PAPILIONIDAE**
- 2610b *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758)
- 2613 *Papilio machaon* LINNAEUS, 1758
- 2614 *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758)
- 2615 *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758)
- 2615x *Leptidea reali* REISSINGER, 1989*
- 2621 *Colias crocea* (GEOFFREY, 1785)
- 2622 *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758)
- 2623 *Colias alfarcariensis* RIBBE, 1905

- 2625 *Gonepteryx rhamni* (LINNAEUS, 1758)
 2626 *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758)
 2627 *Pieris brassicae* (LINNAEUS, 1758)
 2628 *Pieris rapae* (LINNAEUS, 1758)
 2631 *Pieris napi* (LINNAEUS, 1758)
 2635 *Anthocharis cardamines* (LINNAEUS, 1758)
- NYMPHALIDAE**
- 2636 *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758)
 2637 *Apatura ilia* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2639 *Limnitis camilla* (LINNAEUS, 1764)
 2640 *Limnitis populi* (LINNAEUS, 1758)
 2644 *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758)
 2647 *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758)
 2648 *Inachis io* (LINNAEUS, 1758)
 2649 *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758)
 2650 *Cynthia cardui* (LINNAEUS, 1758)
 2651 *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758)
 2652 *Polygonia c-album* (LINNAEUS, 1758)
 2654 *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758)
 2656 *Mesoacidalia aglaja* (LINNAEUS, 1758)
 2657 *Fabriciana adippe* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2658 *Fabriciana niobe* (LINNAEUS, 1758)
 2662 *Brenthis ino* (ROTTEMBURG, 1775)
 2666 *Clossiana selene* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2667 *Clossiana euphrosyne* (LINNAEUS, 1758)
 2669 *Clossiana titania* (ESPER, 1793)
 2670 *Clossiana dia* (LINNAEUS, 1767)
 2672 *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758)
 2674 *Melitaea didyma* (ESPER, 1779)
 2676 *Melitaea diamina* (LANG, 1789)
 2677 *Mellicta athalia* (ROTTEMBURG, 1775)
 2680 *Mellicta aurelia* (NICKERL, 1850)
 2688 *Eurodryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775)
- SATYRIDAE**
- 2689 *Melanargia galathea* (LINNAEUS, 1758)
 2697 *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763)
 2709 *Erebia aethiops* (ESPER, 1777)
 2710 *Erebia medusa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2726 *Maniola jurtina* (LINNAEUS, 1758)
 2728 *Aphantopus hyperanthus* (LINNAEUS, 1758)
 2729 *Coenonympha oedippus* (FABRICIUS, 1787)
 2733 *Coenonympha glycerion* (BORKHAUSEN, 1788)
 2734 *Coenonympha pamphilus* (LINNAEUS, 1758)
 2735 *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764)
 2736 *Pararge aegeria* (LINNAEUS, 1758)
 2737 *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1767)
 2738 *Lasiommata maera* (LINNAEUS, 1758)
 2740 *Lopinga achine* (SCOPOLI, 1763)
 2742 *Hamearis lucina* (LINNAEUS, 1758)
- LYCAENIDAE**
- 2743 *Callophrys rubi* (LINNAEUS, 1758)
 2745 *Quercusia quercus* (LINNAEUS, 1758)
 2746 *Fixsenia pruni* (LINNAEUS, 1758)
 2747 *Satyrium w-album* (KNOCH, 1782)
 2748 *Satyrium spini* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2749 *Satyrium ilicis* (ESPER, 1779)
 2755 *Lycæna tityrus* (PODA, 1761)
 2759 *Syntarucus piriithous* (LINNAEUS, 1767)
 2761 *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775)
 2766 *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758)
 2770 *Glaucopsyche alexis* (PODA, 1761)
 2771 *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758)
 2772 *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779)
 2773 *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779)
 2774 *Maculinea alcon* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2776 *Plebejus argus* (LINNAEUS, 1758)
 2777 *Lycæides idas* (LINNAEUS, 1761)
 2779 *Aricia agestis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2780b *Aricia artaxerxes allous* (GEYER, 1836)
 2785 *Cyaniris semiargus* (ROTTEMBURG, 1775)
 2786 *Agrodiaetus damon* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2788 *Plebicula dorylas* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2791 *Lysandra coridon* (PODA, 1761)
 2792 *Lysandra bellargus* (ROTTEMBURG, 1775)
 2794 *Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775)
- DREPANIDAE**
- 2797 *Watsonalla binaria* (HUFNAGEL, 1767)
 2798 *Watsonalla cultraria* (FABRICIUS, 1775)
 2799 *Drepana falcataria* (LINNAEUS, 1758)
 2803 *Thyatira batis* (LINNAEUS, 1758)
 2804 *Habrosyne pyritoides* (HUFNAGEL, 1766)
 2805 *Tethea ocularis* (LINNAEUS, 1767)
 2806 *Tethea or* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2807 *Tetheella fluctuosa* (HÜBNER, 1803)
 2808 *Ochropacha duplariis* (LINNAEUS, 1761)
 2810 *Achyla flavicornis* (LINNAEUS, 1758)
- GEOMETRIDAE**
- 2813 *Archiearis parthenias* (LINNAEUS, 1761)
 2816 *Alsophila aescularia* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2820 *Geometra papilionaria* (LINNAEUS, 1758)
 2823 *Hemithoa aestivaria* (HÜBNER, 1799)
 2824 *Chlorissa viridata* (LINNAEUS, 1758)
 2825 *Chlorissa cloraria* (HÜBNER, 1813)
 2827 *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763)
 2828 *Hemistola biliosata* (DE VILLERS, 1789)
 2831 *Scopula immorata* (LINNAEUS, 1758)
 2832 *Scopula caricaria* (EUTTI, 1853)
 2834 *Scopula umbelaria* (HÜBNER, 1813)
 2835 *Scopula nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767)
 2836 *Scopula virgulata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 2837 *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763)
 2839 *Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)
 2842 *Scopula immutata* (LINNAEUS, 1758)
 2843 *Scopula ternata* (SCHRANK, 1802)
 2845 *Scopula floslactata* (HAWORTH, 1809)
 2852 *Idaea serpentata* (HUFNAGEL, 1767)
 2855 *Idaea muricata* (HUFNAGEL, 1766)
 2862 *Idaea biselata* (HUFNAGEL, 1767)

2863	<i>Idaea inquinata</i> (SCOPOLI, 1763)	2990	<i>Melanthia procellata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2868	<i>Idaea dimidiata</i> (HUFNAGEL, 1767)	2992	<i>Pareulype berberata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2875	<i>Idaea aversata</i> (LINNAEUS, 1758)	2996	<i>Hydria cervicalis</i> (SCOPOLI, 1763)
2882	<i>Cyclophora annulata</i> (SCHULZE, 1775)	2999	<i>Triphosa dubitata</i> (LINNAEUS, 1758)
2888	<i>Cyclophora punctaria</i> (LINNAEUS, 1758)	3000	<i>Philereme vetulata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2890	<i>Cyclophora linearia</i> (HÜBNER, 1799)	3001	<i>Philereme transversata</i> (HUFNAGEL, 1767)
2891	<i>Timandra griseata</i> (PETERSEN, 1902)	3008	<i>Epirrita dilutata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2902	<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3009	<i>Epirrita christyi</i> (ALLEN, 1906)
2904	<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (LINNAEUS, 1758)	3011	<i>Operophtera brumata</i> (LINNAEUS, 1758)
2909	<i>Xanthorhoe biriviata</i> (BORKHAUSEN, 1794)	3015	<i>Perizoma alchemillatum</i> (LINNAEUS, 1758)
2910	<i>Xanthorhoe designata</i> (HUFNAGEL, 1767)	3019	<i>Perizoma minoratum</i> (TREITSCHKE, 1828)
2912	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3020	<i>Perizoma blandiatum</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2913	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (CLERCK, 1759)	3021	<i>Perizoma albulatum</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2914	<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i> (CLERCK, 1759)	3022	<i>Perizoma flavofasciatum</i> (THUNBERG, 1792)
2915	<i>Xanthorhoe montanata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3030	<i>Eupithecia tenuiata</i> (HÜBNER, 1813)
2916	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (LINNAEUS, 1758)	3032	<i>Eupithecia haworthiata</i> DOUBLEDAY, 1856
2918	<i>Catarhoe rubidata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3034	<i>Eupithecia plumbeolata</i> (HAWORTH, 1809)
2919	<i>Catarhoe cuculata</i> (HUFNAGEL, 1767)	3035	<i>Eupithecia abietaria</i> (GOEZE, 1781)
2920	<i>Epirrhoe hastulata</i> (HÜBNER, 1790)	3037	<i>Eupithecia linariata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2922	<i>Epirrhoe tristata</i> (LINNAEUS, 1759)	3042	<i>Eupithecia exigua</i> (HÜBNER, 1813)
2923	<i>Epirrhoe alternata</i> (MÜLLER, 1764)	3045	<i>Eupithecia valenianata</i> (HÜBNER, 1813)
2928	<i>Camptogramma bilineata</i> (LINNAEUS, 1758)	3050	<i>Eupithecia venosata</i> (FABRICIUS, 1787)
2934	<i>Entephria caesiata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3055	<i>Eupithecia extraversaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
2936	<i>Earophila badiata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3056	<i>Eupithecia centaureata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2938	<i>Mesoleuca albicillata</i> (LINNAEUS, 1758)	3060	<i>Eupithecia selinata</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1861
2940	<i>Lampropteryx suffumata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3063	<i>Eupithecia veratraria</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1848
2942	<i>Cosmorhoe ocellata</i> (LINNAEUS, 1758)	3067	<i>Eupithecia satyrata</i> (HÜBNER, 1813)
2944	<i>Nebula tophaceata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3073	<i>Eupithecia tripunctaria</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1852
2947	<i>Eulithis prunata</i> (LINNAEUS, 1758)	3075	<i>Eupithecia subfuscata</i> (HAWORTH, 1809)
2951	<i>Eulithis pyraliata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3076	<i>Eupithecia icterata</i> (VILLERS, 1789)
2952	<i>Ecliptopera silaceata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3080	<i>Eupithecia subumbrata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
2953	<i>Ecliptopera capitata</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)	3085	<i>Eupithecia distinctaria</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1861
2954	<i>Chloroclysta siterata</i> (HUFNAGEL, 1767)	3089	<i>Eupithecia indigata</i> (HÜBNER, 1813)
2956	<i>Chloroclysta citrata</i> (LINNAEUS, 1761)	3093	<i>Eupithecia innotata</i> (HUFNAGEL, 1767)
2957	<i>Chloroclysta truncata</i> (HUFNAGEL, 1767)	3096	<i>Eupithecia abbreviata</i> STEPHENS, 1831
2959	<i>Pfemyra rubiginata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3099	<i>Eupithecia ericeata</i> (RAMBUR, 1833)*
2960	<i>Pennithera firmata</i> (HÜBNER, 1822)	3100	<i>Eupithecia lanceata</i> (HÜBNER, 1825)
2962a	<i>Thera variata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3102	<i>Eupithecia tantiliaria</i> BOISDUVAL, 1840
2964	<i>Thera britannica</i> (TURNER, 1925)	3104	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (HAWORTH, 1809)
2965	<i>Thera stragulata</i> (HÜBNER, 1809)	3105	<i>Chloroclystis v-ata</i> (HAWORTH, 1809)
2969	<i>Electrophaes corylata</i> (THUNBERG, 1792)	3106	<i>Calliclystis chloerata</i> (MABILLE, 1870)
2978	<i>Colostygia pectinataria</i> (KNOCH, 1781)	3107	<i>Calliclystis rectangulata</i> (LINNAEUS, 1758)
2979	<i>Hydriomena furcata</i> (THUNBERG, 1784)	3112	<i>Aplocera plagiata</i> (LINNAEUS, 1758)
2980	<i>Hydriomena impluviata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3114	<i>Aplocera praeformata</i> (HÜBNER, 1826)
2983	<i>Horisme vitalbata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3116	<i>Odezia atrata</i> (LINNAEUS, 1758)
2985	<i>Horisme tersata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3120	<i>Discoloxia blomeri</i> (CURTIS)
		3122	<i>Euchoeca nebulata</i> (SCOPOLI, 1763)
		3124	<i>Asthena anseraria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
		3126	<i>Hydrelia sylvata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

- 3127 *Minoa murinata* (SCOPOLI, 1763)
 3129 *Trichopteryx polycommata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3130 *Trichopteryx carpinata* (BORKHAUSEN, 1794)
 3132 *Pterapherapteryx sexalata* (RETZIUS, 1763)
 3134 *Acasis viretata* (HÜBNER, 1799)
 3137 *Calospilus sylvatus* (SCOPOLI, 1763)
 3138 *Lomaspilis marginata* (LINNAEUS, 1758)
 3139 *Ligdia adustata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3143 *Semiothisa notata* (LINNAEUS, 1758)
 3144 *Semiothisa alternata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3145 *Semiothisa signaria* (HÜBNER, 1809)
 3146 *Semiothisa liturata* (CLERCK, 1759)
 3147 *Semiothisa clathrata* (LINNAEUS, 1758)
 3149 *Semiothisa artesiaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3156 *Itame brunneata* (THUNBERG, 1784)
 3160 *Cepphis advenaria* (HÜBNER, 1790)
 3163 *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)
 3164 *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS, 1767)
 3166 *Opisthognaptis luteolata* (LINNAEUS, 1758)
 3167 *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767)
 3173 *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)
 3176 *Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)
 3178 *Ennomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)
 3181 *Selenia dentaria* (FABRICIUS, 1775)
 3182 *Selenia lunularia* (HÜBNER, 1788)
 3183 *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767)
 3185 *Odontoptera bidentata* (CLERCK, 1759)
 3187 *Crocallis elinguaris* (LINNAEUS, 1758)
 3188 *Ourapteryx sambucaria* (LINNAEUS, 1758)
 3189 *Colotois pennaria* (LINNAEUS, 1761)
 3190 *Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)
 3193 *Apocheima pilosarium* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3194 *Lycia hirtaria* (CLERCK, 1759)
 3197 *Lycia zonaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3199 *Biston strataris* (HUFNAGEL, 1767)
 3200 *Biston betularius* (LINNAEUS, 1758)
 3201 *Agriopis leucophaearia* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3202 *Agriopis bajaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3204 *Agriopis marginaria* (FABRICIUS, 1777)
 3205 *Erannis defoliaria* (CLERCK, 1759)
 3209 *Peribatodes rhomboidaris* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3210 *Peribatodes secundarius* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3213 *Cleora cinctaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3214 *Deileptenia ribeata* (CLERCK, 1759)
 3215 *Alcis repandatus* (LINNAEUS, 1758)
 3216 *Alcis bastelbergeri* (HIRSCHKE, 1908)
 3219 *Hypomecis roboraria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3221 *Serraca punctinalis* (SCOPOLI, 1763)
 3225 *Ectropis crepuscularia* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3226 *Paradarisa consonaria* (HÜBNER, 1799)
 3227 *Parectropis similaria* (HUFNAGEL, 1767)
 3229 *Ematurga atomaria* (LINNAEUS, 1758)
 3231 *Bupalus piniarius* (LINNAEUS, 1758)
 3232 *Cabera pusaria* (LINNAEUS, 1758)
 3234 *Cabera exanthemata* (SCOPOLI, 1763)
 3235 *Lomographa bimaculata* (FABRICIUS, 1775)
 3236 *Lomographa temerata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3238 *Theria primaria* (HAWORTH, 1809)
 3239 *Campaea margaritata* (LINNAEUS, 1767)
 3241 *Hylaea fasciaria* (LINNAEUS, 1758)
 3246 *Charissa obscurata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3270 *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763)
- NOTODONTIDAE**
- 3276 *Phalera bucephala* (LINNAEUS, 1758)
 3278 *Cerura vinula* (LINNAEUS, 1758)
 3281 *Furcula furcula* (CLERCK, 1759)
 3282 *Furcula bifida* (BRAHM, 1787)
 3283 *Stauropus fagi* (LINNAEUS, 1758)
 3284 *Peridea anceps* (GOEZE, 1781)
 3285 *Notodonta dromedarius* (LINNAEUS, 1767)
 3287 *Notodonta ziczac* (LINNAEUS, 1758)
 3288 *Notodonta tritopha* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3290 *Drymonia melagone* (BORKHAUSEN, 1790)
 3291 *Drymonia dodonea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3292 *Drymonia ruficornis* (HUFNAGEL, 1766)
 3293 *Drymonia querna* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3295 *Harpysia milhauseri* (FABRICIUS, 1775)
 3296 *Pheosia tremula* (CLERCK, 1759)
 3297 *Pheosia gnoma* (FABRICIUS, 1776)
 3298 *Ptilophora plumigera* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3299 *Pterostoma palpinum* (CLERCK, 1759)
 3300 *Ptilodon capucina* (LINNAEUS, 1758)
 3301 *Ptilodontella cucullina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3305 *Gluphisia crenata* (ESPER, 1785)
 3306 *Clostera anachoreta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3307 *Clostera curtula* (LINNAEUS, 1758)
 3308 *Clostera anastomosis* (LINNAEUS, 1758)
 3309 *Clostera pigra* (HUFNAGEL, 1766)
- LYMANTRIIDAE**
- 3313 *Calliteara fascelina* (LINNAEUS, 1758)
 3314 *Calliteara pudibunda* (LINNAEUS, 1758)
 3317 *Orgyia antiqua* (LINNAEUS, 1758)
 3318 *Teia recens* (HÜBNER, 1819)
 3320 *Lymantria dispar* (LINNAEUS, 1758)
 3321 *Lymantria monacha* (LINNAEUS, 1758)
 3323 *Leucoma salicis* (LINNAEUS, 1758)
 3326 *Euproctis chrysothoea* (LINNAEUS, 1758)

- 3327 *Sphrageidus similis* (FUESSLY, 1775)
- ARCTIIDAE**
- 3328 *Nudaria mundana* (LINNAEUS, 1761)
- 3329 *Tumatha senex* (HÜBNER, 1808)
- 3331 *Miltochrista miniata* (J.R.FORSTER, 1771)
- 3332 *Cybosia mesomella* (LINNAEUS, 1758)
- 3333 *Pelosia muscerda* (HUFNAGEL, 1766)
- 3335 *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758)
- 3336 *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758)
- 3337 *Eilema deplana* (ESPER, 1787)
- 3338 *Eilema griseola* (HÜBNER, 1803)
- 3339 *Eilema lurideola* (ZINCKEN, 1817)
- 3340 *Eilema complana* (LINNAEUS, 1758)
- 3342 *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808)
- 3346 *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766)
- 3356 *Phragmatobia fuliginosa* (LINNAEUS, 1758)
- 3361 *Spilosoma luteum* (HUFNAGEL, 1766)
- 3362 *Spilosoma lubricipedum* (LINNAEUS, 1758)
- 3368 *Rhyparia purpurata* (LINNAEUS, 1758)
- 3369 *Diacrisia sannio* (LINNAEUS, 1758)
- 3372 *Arctia caja* (LINNAEUS, 1758)
- 3376 *Callimorpha dominula* (LINNAEUS, 1758)
- 3377 *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761)
- NOCTUIDAE**
- 3385 *Trisateles emortualis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3388 *Herminia tarsicrinalis* (KNOCH, 1782)
- 3389 *Treitschkendia tarsipennalis* (TREITSCHKE, 1835)
- 3390 *Herminia grisealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3392 *Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758)
- 3397a *Rivula sericealis* (SCOPOLI, 1763)
- 3399 *Colobochyla saicalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3400 *Hypenodes humidalis* DOUBLEDAY, 1850
- 3403 *Hypena proboscidalis* (LINNAEUS, 1758)
- 3404 *Hypena rostralis* (LINNAEUS, 1758)
- 3408 *Phytometra viridaria* (CLERCK, 1759)
- 3409 *Scoliopteryx libatrix* (LINNAEUS, 1758)
- 3413 *Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758)
- 3414 *Catocala nupta* (LINNAEUS, 1758)
- 3418 *Catocala electa* (VIEWEG, 1790)
- 3422 *Ephesia fulminea* (SCOPOLI, 1763)
- 3433 *Lygephila pastinum* (TREITSCHKE, 1826)
- 3435 *Lygephila cracca* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3442 *Callistege mi* (CLERCK, 1759)
- 3443 *Euclidia glyphica* (LINNAEUS, 1758)
- 3445 *Laspeyria flexula* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3450 *Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
- 3452 *Nola aerugula* (HÜBNER, 1793)
- 3456 *Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1762)
- 3457 *Nycteola degenerana* (HÜBNER, 1799)
- 3460 *Earias clorana* (LINNAEUS, 1761)
- 3462 *Bena prasinana* (LINNAEUS, 1758)
- 3463 *Pseudopsis fagana* (FABRICIUS, 1781)
- 3464 *Panthea coenobita* (ESPER, 1785)
- 3466 *Colocasia coryli* (LINNAEUS, 1758)
- 3469 *Moma alpinum* (OSBECK, 1778)
- 3470 *Acronicta alni* (LINNAEUS, 1767)
- 3471 *Acronicta cuspis* (HÜBNER, 1813)
- 3473 *Acronicta psi* (LINNAEUS, 1758)
- 3475 *Acronicta leporina* (LINNAEUS, 1758)
- 3476 *Acronicta megacephala* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3477 *Acronicta strigosa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3479 *Acronicta auricoma* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3480 *Acronicta euphorbiae* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3481 *Acronicta rumicis* (LINNAEUS, 1758)
- 3482 *Craniophora ligustri* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3487 *Cryphia algae* (FABRICIUS, 1775)
- 3491 *Cryphia domestica* (HUFNAGEL, 1766)
- 3493 *Emmelia trabaelis* (SCOPOLI, 1763)
- 3496 *Protodeltote pygarga* (HUFNAGEL, 1766)
- 3497 *Deltode deceptoria* (SCOPOLI, 1763)
- 3498 *Deltote uncula* (CLERCK, 1759)
- 3499 *Deltote bankiana* (FABRICIUS, 1775)
- 3500 *Pseudeustrotia candidula* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3505 *Eublemma parva* (HÜBNER, 1808)
- 3511 *Euchalcia variabilis* (PILLER, 1783)
- 3515 *Lamprotes c-aureum* (KNOCH, 1781)
- 3516 *Panchrysia deaurata* (ESPER, 1787)
- 3518 *Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758)
- 3520 *Diachrysia nadeja* (OBERTHÜR, 1880)
- 3522 *Diachrysia chryson* (ESPER, 1789)
- 3523 *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850)
- 3524 *Plusia festucae* (LINNAEUS, 1758)
- 3526 *Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758)
- 3527 *Autographa pulchrina* (HAWORTH, 1809)
- 3529 *Autographa jota* (LINNAEUS, 1758)
- 3530 *Autographa bractea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3534 *Syngrapha interrogationis* (LINNAEUS, 1758)
- 3538 *Abrostola triplasia* (LINNAEUS, 1758)
- 3539 *Abrostola trigemina* (WERNEBURG, 1864)
- 3549 *Cucullia umbraticae* (LINNAEUS, 1758)
- 3558 *Cucullia scrophulariae* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
- 3560 *Cucullia lychnitis* RAMBUR, 1833
- 3561 *Cucullia verbasci* (LINNAEUS, 1758)
- 3569 *Calliergis ramosa* (ESPER, 1786)
- 3573 *Pyramidampa pyramidea* (LINNAEUS, 1758)
- 3574b *Pyramidampa berbera svenssoni* (FLETCHER, 1968)*
- 3575 *Pyramidampa perflua* (FABRICIUS, 1787)
- 3577 *Amphipyra tragopoginis* (CLERCK, 1759)
- 3581 *Heliolithis viriplaca* (HUFNAGEL, 1766)
- 3585 *Heliolithis nubigera* HERRICH-SCHÄFFER, 1851
- 3588 *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)

- 3592 *Elaphria venustula* (HÜBNER, 1790)
3593 *Panemeria tenebrata* (SCOPOLI, 1763)
3602 *Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)
3606 *Hoplodrina octogenaria* (GOEZE, 1781)
3607 *Hoplodrina blanda* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3609 *Hoplodrina respersa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3610 *Hoplodrina ambigua* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3612 *Spodoptera exigua* (HÜBNER, 1808)
3614 *Athetis gluteosa* (TREITSCHKE, 1845)
3616 *Athetis pallustris* (HÜBNER, 1808)
3619 *Rusina ferruginea* (ESPER, 1785)
3620 *Mormo maura* (LINNAEUS, 1758)
3623 *Trachea atriplicis* (LINNAEUS, 1758)
3624 *Euplexia lucipara* (LINNAEUS, 1758)
3625 *Phlogophora meticulosa* (LINNAEUS, 1758)
3627 *Hyppa rectilinea* (ESPER, 1788)
3629 *Actinotia polyodon* (CLERCK, 1759)
3635 *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803)
3636 *Ipimorpha retusa* (LINNAEUS, 1761)
3637 *Ipimorpha subtusa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3638 *Enargia paleacea* (ESPER, 1788)
3642 *Mesogona oxalina* (HÜBNER, 1803)
3645 *Cosmia affinis* (LINNAEUS, 1767)
3646 *Cosmia pyralina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3647 *Cosmia trapezina* (LINNAEUS, 1758)
3650 *Xanthia togata* (ESPER, 1788)
3652 *Xanthia icteritia* (HUFNAGEL, 1766)
3653 *Xanthia gilvago* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3657 *Fissipunctia ypsilon* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3659 *Agrochola circellaris* (HUFNAGEL, 1766)
3660 *Agrochola lota* (CLERCK, 1759)
3661 *Agrochola macilenta* (HÜBNER, 1809)
3662 *Agrochola nitida* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3663 *Agrochola helvola* (LINNAEUS, 1758)
3668 *Eupsilia transversa* (HUFNAGEL, 1766)
3670 *Conistra vaccinii* (LINNAEUS, 1761)
3671 *Conistra ligula* (ESPER, 1791)
3672 *Conistra rubiginosa* (SCOPOLI, 1763)
3674 *Conistra rubiginea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3680 *Brachionycha nubeculosa* (ESPER, 1785)
3681 *Brachionycha sphinx* (HUFNAGEL, 1766)
3688 *Lithophane hepatica* (CLERCK, 1759)
3689 *Lithophane omitopus* (HUFNAGEL, 1766)
3692 *Lithophane consocia* (BORKHAUSEN, 1792)
3694 *Xylena vetusta* (HÜBNER, 1813)
3698 *Allophyes oxyacanthae* (LINNAEUS, 1758)
3707 *Antitype chi* (LINNAEUS, 1758)
3715 *Blepharita saturata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER)
3716 *Mniotype adusta* (ESPER, 1790)
3718 *Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766)
3720 *Apamea lithoxylea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3721 *Apamea sublustris* (ESPER, 1788)
3722 *Apamea crenata* (HUFNAGEL, 1766)
3723 *Apamea charactera* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3725 *Apamea remissa* (HÜBNER, 1809)
3727 *Apamea sordens* (HUFNAGEL, 1766)
3729 *Apamea furva* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3735 *Apamea unanims* (HÜBNER, 1809)
3737 *Loscopia scolopacina* (ESPER, 1788)
3738 *Leucapamea ophiogramma* (ESPER, 1793)
3740 *Oligia strigilis* (LINNAEUS, 1758)
3741 *Oligia versicolor* (BORKHAUSEN, 1792)
3742 *Oligia latruncula* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3745 *Mesoligia furuncula* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3747 *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758)
3748 *Mesapamea didyma* (ESPER, 1788)
3755 *Rhizetra lutosa* (HÜBNER, 1803)
3756b *Amphipoea oculea nictitans* (LINNAEUS, 1767)
3757 *Amphipoea fucosa* (FREYER, 1830)
3759 *Hydraecia micacea* (ESPER, 1789)
3762 *Gortyna flavago* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3766 *Celaena leucostigma* (HÜBNER, 1808)
3767 *Nonagria typhae* (THUNBERG, 1784)
3770 *Archanara neurica* (HÜBNER, 1808)
3776 *Chortodes minima* (HAWORTH, 1809)
3779 *Chortodes pygmina* (HAWORTH, 1809)
3782 *Charanyca trigrammica* (HUFNAGEL, 1766)
3790 *Lacanobia w-latinum* (HUFNAGEL, 1766)
3792 *Lacanobia splendens* (HÜBNER, 1808)
3793 *Lacanobia oleracea* (LINNAEUS, 1758)
3794 *Lacanobia thalassina* (HUFNAGEL, 1766)
3796 *Lacanobia suasa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3797 *Hada nana* (HUFNAGEL, 1766)
3805 *Hadena filograna* (ESPER, 1788)
3807 *Hadena magnolia* (BOISDUVAL, 1833)
3811 *Hadena perplexa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3813 *Aneda rivularis* (FABRICIUS, 1775)
3821 *Melanchra persicariae* (LINNAEUS, 1761)
3822 *Caramica pisi* (LINNAEUS, 1758)
3823 *Mamestra brassicae* (LINNAEUS, 1758)
3825 *Polia bombycina* (HUFNAGEL, 1766)
3827 *Polia nebulosa* (HUFNAGEL, 1766)
3831 *Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761)
3832 *Mythimna conigera* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3833 *Mythimna ferrago* (FABRICIUS, 1787)
3834 *Mythimna albipuncta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3835 *Mythimna vitellina* (HÜDNER, 1808)
3836 *Mythimna pudorina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
3837 *Mythimna straminea* (TREITSCHKE, 1825)
3838 *Mythimna impura* (HÜBNER, 1808)
3839 *Mythimna pallens* (LINNAEUS, 1758)
3840 *Mythimna l-album* (LINNAEUS, 1767)
3846 *Orthosia incerta* (HUFNAGEL, 1766)
3847 *Orthosia gothica* (LINNAEUS, 1758)

- 3848 *Orthosia cruda* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3850 *Orthosia opima* (HÜBNER, 1809)
 3851 *Orthosia populeti* (FABRICIUS, 1781)
 3852 *Orthosia cerasi* (FABRICIUS, 1775)
 3853 *Orthosia gracilis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3854 *Orthosia munda* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3855 *Panolis flammea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3858b *Hyssia cavemosa gozmanyi* KOVACS, 1968
 3860 *Tholera cespitis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3861 *Neuronia decimalis* (PODA, 1761)
 3862 *Pachetra sagittigera* (HUFNAGEL, 1766)
 3865 *Axylia putris* (LINNAEUS, 1761)
 3868 *Ochroleura plecta* (LINNAEUS, 1761)
 3870 *Diarsia mendica* (FABRICIUS, 1775)
 3872 *Diarsia brunnea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3873 *Diarsia rubi* (VIEWEG, 1790)
 3875 *Noctua pronuba* (LINNAEUS, 1758)
 3876 *Noctua fimbriata* (SCHREBER, 1759)
 3877 *Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766)
 3878a *Noctua comes* HÜBNER, 1813
 3881 *Noctua janthina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3882 *Noctua interjecta* HÜBNER, 1803
 3885 *Lycophotia porphyrea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3901 *Paradiarsia punicea* (HÜBNER, 1803)
 3902 *Eurois occulta* (LINNAEUS, 1758)
 3914 *Xestia c-nigrum* (LINNAEUS, 1758)
 3915 *Xestia ditrapezium* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3916 *Xestia triangulum* (HUFNAGEL, 1766)
 3918 *Xestia baja* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3919 *Xestia rhomboidea* (ESPER, 1790)
 3923 *Xestia sexstrigata* (HAWORTH, 1809)
 3924 *Xestia xanthographa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3925 *Eugraphe sigma* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3927 *Cerastis rubricosa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3928 *Sora leucographa* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3929 *Naenia typica* (LINNAEUS, 1758)
 3930 *Anaplectoides prasina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3934 *Actebia praecox* (LINNAEUS, 1758)
 3946 *Euxoa obelisca* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
 3955 *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)
 3957 *Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758)
 3960 *Agrotis vestigialis* (HUFNAGEL, 1766)
 3962 *Agrotis cinerea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vorarlberger Naturschau - Forschen und Entdecken](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Huemer Peter

Artikel/Article: [Schmetterlinge \(Lepidoptera\) im Bereich der Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels \(Vorarlberg\): Diversität - Ökologie - Gefährdung. 141-202](#)