

Ueber zwei neue Caprimulgiden aus Brasilien.

Von

August v. Pelzeln.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. November 1865.

Hydropsalis Ypanemae n. sp. (Natterer Nr. 1049).

Hydropsalis H. forcipatae quoad formam et colores similis, sed minor et in mare remige secunda primam fere aequante, et reatricibus duabus mediis brunneo transverse fasciatis, secundam et tertiam longitudine superantibus differt, capite nucha et dorso nigro-brunneis ferrugineo maculatis et fasciatis, stria utrinque supra oculum alba brunneo fasciolata, parte basali plumarum dorsi medii et scapularium vel ultimarum marginibus concoloribus sed fasciis latioribus, nucha fascia lata ferruginea cincta, tectricibus caudae superioribus nigrescentibus, ochraceo transverse striatis, tectricibus alarum majoribus dorsi coloribus imbutis macula magna ferruginea versus finem pogonii externi, remigibus brunneis fasciis interruptis ferrugineis, passim albescentibus, earum prima versus basin pogonii externi ferrugineo — ultimis margine postico lato albido limbatis, tectricibus alarum inferioribus nigrescentibus ochraceo fasciatis, lateribus capitis et pectore inferiore ferrugineis nigro fasciolatis, gula pallide ferruginea, plumis pectoris superioribus apice albescentibus, illis gastraei reliqui ochraceis in ventre superiore et lateribus corporis nigrescente fasciatis, reatricibus mediis duabus griseis brunneo-marmoratis et fasciis transversis nigro-brunneis ornatis, secunda et tertia concoloribus sed absque fasciis

distinctis, quarta parte basali oblique brunnea, ceterum marmorata, remige utrinque extima brunnea, margine lato albo et fasciis irregularibus nonnullis albidis versus basin in pogonio interno, parte apicali griseo-albis brunneo-marmoratis. Longit. total. $19\frac{1}{2}''$, alae $7'' 10'''$, rostri a naribus $3\frac{1}{2}''$ tars. $7'''$. Remigam secunda solummodo $1''$, tertia $8'''$, quarta $2'' 2'''$ brevior quam prima. Longit. rectric. intermed. $5'' 5'''$, secundae $4'' 9'''$, tertiae $5'' 4'''$, quartae $7'' 3'''$ extimae $14\frac{1}{2}''$.

Das einzige von Natterer zu Ypanema im August 1821 gesammelte Exemplar, ein Männchen, stimmt mit *H. forcipata* Nitzsch (= *H. limbatus*, Cassin) in der Färbung vollkommen überein, nur sind die erste, zweite und dritte der mittleren Schwanzfedern auf grauem Grunde braun marmorirt, und die innersten zeigen überdiess noch scharf begrenzte schwarzbraune Querbinden. Der Vogel ist ferner bedeutend kleiner, die zweite Schwinge ist beinahe so lang als die erste¹⁾ und die folgenden sind gleichmässiger abgestuft; einer der wichtigsten Unterschiede liegt aber darin, dass die mittelsten Schwanzfedern die zweite und dritte jederseits an Länge übertreffen.

Hydropsalis pallescens n. sp. (Natterer Nr. 1048).

Hydropsalis H. torquatae (Gmel.) = *H. psalurae* (Temm.) similis sed major et coloribus pallidioribus.

Mas notaeo griseo fasciis transversis brunneis in pileo et nucha angustissimis, in dorso latioribus, pileo maculis nigris longitudinalibus in verticis medio, linea alba a naribus ad oculos ducta, nucha fascia lata pallide ferruginea cincta, alarum tectricibus superioribus et scapularibus griseo et brunneo striatis et maculatis, macula magna albida subterminali et maculis magnis nigris in scapularibus, remigibus brunneis fasciis interruptis pallide ferrugineis, prima basi pogonii externi ferrugineo, ultimis margine postico late albido limbatis, tectricibus alarum inferioribus ochraceo et brunneo fasciatis, lateribus capitis diute ferrugineis, plumarum apicibus late albidis, gastraeo ochraceo (gula excepta) fasciis transversis brunneis instructo, rectricibus duabus intermediis griseis brunneo marmoratis et fasciis brunneis transversalibus irregularibus ornatis, secunda, tertia et

¹⁾ Ein ähnliches Schwingenverhältniss kommt bei den Weibchen nicht aber bei den Männchen von *H. forcipata* vor.

quarta utrinque basi nigro-brunnea, dein alba, versus apicem grisea brunneo marmorata, extimis brunneis versus basin fasciis ochraceis insignitis, margine lato pogonii interni apicibusque albis. Longit. tot. 18", alae 7" 4"', rostri a naribus 2 $\frac{3}{4}$ "', tars. 8"' ; remix secunda longissima, primam 1" superans, tertia 3"', quarta 20 $\frac{1}{2}$ ", quinta 2" 3 $\frac{1}{2}$ "' brevior; longit. rectric. intermed. 6" 8"', secundae 5", tertiae 5" 3"', quartae 6", extimae 12" 6"' 1).

Femina mari similis sed rectricibus exterioribus brunneo-nigris fasciis interruptis ochraceis instructis, versus apicem griseis brunneo marmoratis, extima quartam 1—1 $\frac{1}{2}$ "', mediis secundam 1", tertiam 7—11"' quartam 4—6"' superantibus; in una femina (sine dubio juvenili) rectrices omnes fere aequilongae.

Dieser Ziegenmelker wurde von Natterer früher nur für eine Varietät der *H. psalura* gehalten, später jedoch als verschieden betrachtet mit der Bemerkung, dass er beständig grösser als die genannte Art, und viel blässer, besonders das Band im Nacken blassoherfarb sei.

Natterer sammelte von *H. pallescens* ein Weibchen zu Matogrosso im Oktober 1828, dann ein Männchen und sieben Weibchen zu Forte do Principe im August 1829 und notirte folgendes über dieselben: -

Forte do Principe, 14. August 1829 auf Wegen, nahe am Fort, Nachts bei Mondschein. Weibchen. Iris dunkelbraun, Augenringe blass gelbbraun, Schnabel röthlichbraun, Spitze schwarz, Füsse graubraun in's Röthliche ziehend. Länge 12 $\frac{1}{4}$ "', Breite 1' 7 $\frac{3}{4}$ "', der Schwanz ragt 2" 8"' über die Flügelspitzen.

Weibchen, Länge 11" 4"', Breite 1' 6 $\frac{3}{4}$ "' der Schwanz ragt 2" 5"' über die Flügelspitzen.

15. August in der Nacht auf Wegen um die Festung herum. Weibchen, Länge 11 $\frac{1}{2}$ "', Breite 1' 7 $\frac{3}{4}$ "', der Schwanz ragt 1" 11"' über die Flügel.

Weibchen, Länge 10" 11"', Breite 1' 7" 4"', der Schwanz ragt 1" 10" über die Flügel.

1) Die Differenzen mit den von Natterer angegebenen Maassen erklären sich ohne Zweifel daraus, dass Natterer die Maasse am frischen Vogel nahm, ich aber nur die Federn an dem abgelösten Schweife messen konnte.

Weibchen, Länge $10\frac{1}{4}$ "", Breite $1' 7''$, der Schwanz ragt $13'''$ über die Flügelspitzen.

16. August, altes Männchen, in der Nacht auf Fuchssteigen des bedeckten Weges des Forts, Iris u. s. w. wie am Weibchen. Länge $17\frac{3}{4}$ "", Breite $1' 8'' 2'''$, der Schwanz ragt $8\frac{1}{4}$ " über die Flügel, die äussersten Schwanzfedern $12\frac{1}{4}$ "", die mittelste $6\frac{1}{4}$ "", die auf diese folgende ist $4\frac{3}{4}$ " kürzer.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von

Artikel/Article: [Ueber zwei neue Caprimulgiden aus Brasilien. 984-988](#)