

Diagnosen neuer von E. Baron v. Ransonnet in Vorder-Indien gesammelter Lepidopteren.

Von

Dr. Rudolf Felder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

Rhopalocera.

Fam. Lycaenidae.

Deudorix Epijarbas Boisd. Ceylon bei Galle, 26. Nov. 1864. ♀. Die Varietät mit einfarbiger Oberseite, vollständig mit molukkischen und philippinischen Stücken identisch.

Spindasis Ictis Hewits, var. **ceylanica** Feld.

♂ minor, macula fulva alarum antistarum minore vel nulla, macula anali posticarum sordida et minore, pagina inferiore brunnescente, fasciolis ejus pallidioribus et latioribus maculaque anali posticarum hic etiam multo minore, rotundata et obsoleta.

Das von Hewitson abgebildete Stück der *Ictis* ist ein ♀ und nicht wie er angibt, ein ♂. Hambangtotte auf Ceylon 22. Jänner 1865.

Lycaenesthes lycaenina Feld. n. sp. ♂:

L. lycaenoidi Feld. proxima sed minor, alis posticis extus bene rotundatis, minus dentatis, alis omnibus supra paullo vividioribus, subtus pallide cano-fuscis, anticis pone medium fascia catenulari bifurcata, atomis fundi impleta alteraque submarginali e maculis (superioribus intus

subsagittatis) fusculis albido cinctis, maculis obsoletis in strigam ordinatis ante marginem albidis, posticis ad basin glaucescente atomatis, macula antico-basali ocellari alteraque interna nigricantibus albido cinctis, fasciola postico-basali e maculis duabus alteraque disco cellulari e maculis totidem, tertiae pone medium sitae bis leviter fractae contigua catenularibus maculisque limbalibus bifariis connatis, intus plus minus sagittatis ejusdem coloris, illis anticarum concoloribus, harum marginali inter ramum medianum primum et secundum sita maculam parvam atram, intus rufesceni-
enti-fulvo anguste cinctam ferente. Ceylon, Avisavelle 7. Dec.

Lycaena singalensis Feld. n. sp. ♂.

L. Argioli (L.) forma geographicā, *L. Kollari* Westw. himalayicae proxima sed alae supra striga tantum anteciliari nigrofusca, subtus maculis limbalibus margini magis approximatis, anticae virgulis externis lationibus, posticae punctis grossioribus. Ceylon, Kallupahane 15. Dec. in circa 3000' Höhe. *)

Lycaena Puspa Horsf. var.

A bengalensi forma limbo nigro-fusco alarum anticarum dimidio fere angustiore maculisque antemarginalibus paginae inferioris minoribus diversa. Am Fusse des Adamspick 10. Dec.

Lycaena Karsandra Moore (**Brahmina** Feld.) Ceylon, bei Matura
26. Jänner 1865.

Lycaena Noreia Feld. nov. sp. ♀.

L. Norae Feld. forma geographicā, sed alis anticis margine externo minus convexo, alis supra brunneo-fuscis, anticarum plaga interno-basali subtriangulari, posticarum plagula basali violaceo-caerulea, his maculis marginalibus obscurioribus ordinaria extracaudali excepta, valde obsoletis. Subtus omnibus cano-fuscescentibus, macula disco cellulari (in posticis sat angusta), pone medium fascia catenulari semel fracta, anticarum fasciola antico-basali, truncum medianum haud excedente posticarumque fascia basali e maculis quatuor et intra eam macula antica incompleta fuscis, albido cinctis, a fundi colore impletis, maculis marginalibus (in posticis magis trigonis) fusculis, extracaudali majore binisque analibus minutis posticarum atris exceptis, albido cinctis, in anticis maculis lunatis in posticis sagittatis concoloribus insedentibus, linea marginali fusca et ante-ciliari albida, maculis fuscis ad venarum extima persecta. Ceylon Niuera Ellia, in circa 6000' Höhe. 24. Dec. 1864.

*) Ann. Die Höhenangaben sind in Pariser Fuss.

Fam. Satyridae.

Yphthima Singala Feld. n. sp. ♂.

Paullo major, quam *Y. Lysandra* Hew. (non Cram.) alis anticis apice, posticis angulo anali magis productis, venula discocellulari alarum antistarum obliquiore, cellulae angulo superiore hanc ob rem magis retracto, supra omnibus alis (in specimine nostro) immaculatis, subtus dilute canis, multo densius et aequaliter fusco strigillatis, antistarum ocello angustius iridato, quam in illa specie, postistarum ocellis quinque parvulis tribus inferioribus in eadem directione jacentibus, secundo (infra ramum subcostalem secundum) et quarto (inter ramum medianum primum et secundum) paullo majoribus. Ceylon bei Badulla c. 3000'. 20. Dec.

Fam. Hesperiidae.

Eudamus Spilothyrus Feld. n. sp. ♂.

E. Pulomayae Morre valde affinis, alis tamen latioribus, posticis, ntrorum paullo longioribus, supra omnibus fuscis, cano-olivaceo pilosis et atomatis (praesertim in limbo externo antistarumque interno), maculis marginalibus testaceo-albis linearibus, grossiusculis, aliis ciliaribus albidis insedentibus (in posticis distinctioribus), anticis macula alba ante marginis costalis medium, altera infra eam ad cellulae extimum grossiuscula, extus excisa, duabus medianis ab illa bene separatis, tribus parvis in regione interna (tertia infimae medianae adjecta), una subapicali (e tribus plane connexis) duabusque conjectis submarginalibus extra eam subdiaphanis, albido cinctis, maculis quatuor in limbo postico, obsoletis pallide testaceis, posticis maculis duabus antico-basalibus, aliis discalibus et limbaliibus parvulis in seriebus duabus leviter flexis ejusdem coloris, subtus ut supra sed dilutioribus, antistarum maculis duabus subanalibus albican-tibus, antennarum clava triente basali testaceo-alba, corporis pilositate cano-olivacea, palporum articulo medio vitta laterali alba, ventre albido cingulato. Zwischen Metopallium und Kunur in den Nilgirigebirgen 20. Februar 1865.

Eudamus infernus Feld. n. sp. ♂.

E. Eaco Latr. affinis, clava antennarum crassiore, palporum articulo terminali minutissimo, cellula discoidalali alarum antistarum latiore, alis omnibus supra atro-fuscis, anticis maculis tribus conjectis minutis

pellucidis subapicalibus, subtus omnibus dilutioribus, anticis macula insuper statim pone marginis costalis medium parva ochracea, binisque evanescentibus subanalibus, posticis pone medium maculis bifariis ochraceo-canis ex atomis parcissimis, corpore atro-fusco, orbitis palporumque striga laterali ochraceo-albis. Magnitudo *E. leucoceri* Koll. Ceylon. Südostabhang d. Gebirgsstockes c. 3000'. 16. Dec. Kirinde 20. Jänner 1865.

Hesperia egena Feld. n. sp. ♂.

Sectio propria *H. tesselatae* Hew. affinis, sed alae anticae marum in limbo interno striga squamularum elevatarum distinctae, antennae breviores, clava fere ut in *H. Feisthammeli* Boisd., gracilior tamen longiusque hamata, ramus medianus primus alarum anticarum a basi magis distans et ramus subcostalis primus alarum posticarum basi valde approximatus, angulus analis earum sublobatus.

Statura *H. Mathiae* F., alis supra saturate fuscis, ciliis pallidioribus, anticis maculis duabus minutis medianis diaphanis, subtus omnibus dilutioribus, anticis ochraceo-brunneis indistincte atomatis, basi obscurioribus maculis paullo majoribus, posticis zona discali alteraque limbali angustiore, obsoletissimis ex atomis ochraceo-brunneis, clava antennarum subtus rufescente. Kallupahani 15. Decemb.

Pterygospidea Ransonnetii Feld. n. sp. ♂.

Pt. erosulae Feld. valde affinis, alis latioribus, supra fuscis, anticis striga antemarginali pallidiore male definita, macula cellulari medio coarctata, binis medianis, inferiore harum majore, infra hanc duabus, tribus conjectis elongatulis subapicalibus, punctisque duobus infra eas pellucide albis maculis obsoletis albidis submarginalibus, posticis macula cellulari, fasciae discali venis fuscis octopartitae (uno segmento intra venulam discocellularem) adhaerente nonnullisque parvis obsoletis extra hanc albidis, regione anali glauco atomata, anticis subtus maculis insuper basalibus et discalibus confluentibus glauco-albis, submarginalibus supernis intus fusco limitatis, posticis opalescenti-albis, basi intusque glaucescentibus, margine costali et basi fusco atomatis, maculis bifariis in disco, fuscis, evanescentibus, duabus anticis nigris aliisque grossis plus minus confluens submarginalibus fuscis. Kirinde 19. Jänner 1865.

Heterocera.

Fam. Arctiidae.

Syntomis Schoenherri Boisd.

♂ var. maculis minoribus. Avisavella 7. Decemb., Peradenia bei Kandy 1630, 30. Decemb. Galle 29. November.

ξ

Migoplastis Feld. Nov. Gen.

Leptosomati Boisd. et quidem sectioni *L. Evergista* (Cram.) proxime affine sed discrepans antennis (femininis) paullo latius pectinatis, capite majore, palpis longioribus, abdomine crassiore pedibusque gracilioribus et longioribus.

Migoplastis ceylanica Feld. n. sp. ♀.

L. Evergista Cram. paullo major, alis longioribus, anticis intus minus convexis dilute cano-brunneis, punctis baseos nigris, triente basali fasciaque curvatula discali male terminatis pallidioribus, posticis pallide ochraceis, capite, palpis, antennis, thorace et pedibus cano-brunneis, puncto nigro in vertice, duobus in tegulis collaris, totidem scapularibus, humeralibus et pectoralibus, coxis anticis nigro unimaculatis, abdomine pallide ochraceo, punctis grossis dorsalibus uniseriatis et lateralis biseriatis nigrescentibus. Peradenia bei Kandy.

Digama insulana Feld. n. sp. ♀.

Valde affinis *D. Hearseyanae* Moore, sed alis brevioribus, anticis cum thorace supra pallide cano-brunneis, punctis quatuor costalibus, uno basali, uno cellulari, uno obsoleto discocellulari binisque apud plicam medianam nigris, posticis sicut et abdome item pallidioribus subtus anticis in limbo apicali dilutioribus, margine costali ochraceo, puncto cellulæ fascioaque antico-discali fuscis, posticis punto discali grosso nigro. Peradenia bei Kandy.

Lithosia oblitterans Feld. n. sp. ♀.

L. griseolae Hüb. accedens, sed minor, alis angustioribus, anticarum margine externo obliquiore, earum vena discoidali superiore e

petiolo rami tertii et quarti subcostalis oriente et inferiore libera, ramo mediano secundo et tertio omnium longe petiolatis, corpore toto alisque anticis totis supra canis, his costa ochracea strigaque obsoleta, extrorsum curvata nigricante medio evanescente pone medium, posticis totis utrinque pallide ochraceis, fronte pallide ochraceo atomata, ano et ventre ochraceis. Ceylon Rangbodde (circa 2500'). Ende December.

*) Eine Aufzählung der übrigen gesammelten Lepidoptern erscheint in dem eben unter der Presse befindlichen Werke: Ceylon, Skizzen seiner Bewohner, seines Thier- und Pflanzenlebens etc. von Baron Eug. v Ransonnet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Felder Rudolf

Artikel/Article: [Diagnosen neuer von E. Baron v. Ransonnet in Vorder-Indien gesammelter Lepidopteren. 281-286](#)