

Beitrag

zur

Myriopoden-Kenntniss Oesterreich-Ungarns und Serbiens.

Von

Dr. R. Latzel in Wien.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Juni 1882.)

1. *Glomeris carpathica* n. sp.

*Glabra et nitida, subtiliter impresso-punctata, colore Glomeri connexae C. Koch subsimilis, nigra, segmento primo et ultimo bimaculato, maculis semper bene distinctis, luteis, segmentis ceteris quadrimaculatis, maculis dorsalibus sat parvis, marginem posticum segmenti longo spatio non attingentibus, lateralibus transverse-ovalibus; venter cum pedibus pallide-fuscescens. Oculi utrimque ocellis 8—11 (1 + 7—1 + 10). Segmentum primum sulcis transversis 1—2 integris, saepe praeterea 1—2 abbreviatis instructum. Segmentum secundum sulcis 4—10 tenuibus (i. e. 1—2 integris, ceteris abbreviatis) in lateribus exaratum. Segmenta cetera sulcis 2—6 lateralibus abbreviatis impressa. Segmentum ultimum et feminae et maris non emarginatum. Mas.: Coxae coalitae pedum paris 18. profunde et semicirculariter emarginatae. Pedes copulativi pedibus *Gl. connexae* subsimiles. Longitudo maris 7—10 mm., latit. 4—5.5 mm.; long. feminae 11—15 mm., lat. 5—7 mm.*

Patria: Galiciae et Hungariae superioris montes.

2. *Polydesmus tatranus* n. sp.

P. collari C. Koch similis, sed multo minor atque gracilior, nitidus, brunneus, lateribus segmenti 2., 3., 4., 6., 8., 11., 14. luteis. Vertex sulco profundiore, frons subglabra. Antennae latitudine corporis longiores (3 : 2). Segmentum primum subreniforme, sulco transversali exaratum. Segmenta omnia supra distincte tuberculata, tuberculis vix setigeris, angulis anticis valde rotundatis, posticis obtusis vel parum productis, marginibus lateralibus ubique integris vel subtilissime denticulatis. Pedes copulativi maris sat breves, sat incrassati, formam calceoli imitantes, bidentati, dente minore proximo crinito. Longit. 11—15 mm., latit. 1.5—2 mm.

Patria: Galiciae et Hungariae superioris montes.

3. *Craspedosoma carpathicum* n. sp.

Corpus valde deplanatum, polydesmoideum (Megalosoma Fedrizzi), antice et postice paululum angustatum, brunneum. Antennae pertenues, latitudine corporis multo longiores (16:1). Oculi triangulares vel subtrapezoidi, ocellorum numerus utrimque 23—27. Segmenta praeter 4 ultima lateribus valde productis, angulis posticis subobtusis, omnia utrimque setis ternis sat subtilibus instructa. Pedes longi atque tenues, in maribus paria 48, in feminis 50. Mas.: Margines ventrales segmenti septimi in dentes binos longos, sat tenues incisi. Pedes copulativi anteriores sat magni, in forcices duos parallelos vel brachia transformati, posteriores parvi, forcipiformes, distantes; hic femur internum dente sat parvo, ibi femur externum dente longissimo, modice curvato armatum. Longit. 15—20 mm., lat. 2—2.2 mm.

Patria: Galiciae et Hungariae superioris montes.

4. *Lysiopetalum fasciatum* n. sp.

Subcylindricum, paululum compressum, postice manifeste acuminatum, nigro-fuscum, dorso fascia ochracea vel fulva longitudinali ornatum. Caput maris fronte semicirculariter impressa. Antennae longae et tenues. Oculi triangulares, ocellorum numerus utrimque 45. Numerus segmentorum 42. Praeter 5—6 anteriora et ultimum segmenta omnia supra manifeste longitudinaliter sulcata, spatiis interjectis subdepressis, postice angustatis alternatimque abbreviatis et setigeris. Foramina repugnatoria manifesta, initio sulci sita. Pedum paria maris 74, feminae 75. Pedes sat longi et tenues. Pedes copulativi maris nigrescentes, spinosissimi et ramosi, apice cochleiformes, ramis binis externis valde distantibus, laminis intermediis evanidis. Long. 30—34 mm., lat. 2.5—2.8 mm., altit. 2.8—3 mm.

Patria: Hungaria meridion.-australis et Serbia.

5. *Julus strictus* n. sp.

Subtenuis et elongatus, pallidus vel luridus, lateraliter subfusco-punctatus. Vertex sulco tenui, foveis duabus setigeris proximatis. Antennae vix claviformes, graciles. Oculi nulli, imo vero pigmentum nigrum nullum. Numerus segmentorum 60—64. Segmentum primum lateribus productis et breviter sulcatis; segmenta cetera dense et profunde sulcata, margine postico ciliis longis et numerosis. Foramina repugnatoria parva, in segmentis anticis haud procul pone suturam emarginatam, in ceteris procul pone suturam integram sita. Segmentum ultimum longe crinitum, in spinam longam leviter inflexam productum; squama analis obtusa. Pedum numerus 106—117. Pedes longi et tenues. Pedes copulativi maris: Par anterius breve, obtusum, apice pellucente; par posterius anteriore longius eique adjacens, apice dentibus binis validis; flagellum manifestum. Longit. corporis 35—45 mm., lat. 1.7—2 mm.

Patria: Hungaria meridion.-australis et Serbia.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Latzel Robert

Artikel/Article: [Beitrag zur Myriopoden-Kenntniss Oesterreich-Ungarns und Serbiens. 281-282](#)