

Flora von Rottalowitz
und
Umgebung in Mähren,
von
Daniel Sloboda,
evangelischen Pfarrer in Rottalowitz.

Die Flora dieses Bezirkes (Rottalowitz, Brussný, Chomýž, Jankowitz, Žop, Holleschau, Bilawsko, Hlinsko, Prussenowitz, Slawkow, Chwalčow, Bystřitz und das angrenzende Gebirge bis Hořfalkow, Dršťkowa, Wlčkowa, Gross- und Klein-Lukow, Freistadt und Přilep) enthält nach dem folgenden Verzeichnisse 720 Arten, die cultivirten nicht mitgerechnet. Wenn auch vielleicht noch manche Pflanzen vorkommen, welche dem Verfasser entgangen sind, so ergibt sich aus dieser Skizze doch der Vegetationscharacter des Gebietes.

Bei jenen Pflanzen, die in der Nähe von Rottalowitz selbst nicht vorkommen, wurde der Name der betreffenden Ortschaft angegeben.

I. Acotyledones¹⁾

1. Filices.

Polypodium vulgare L. Felsen, Ruine Obrány, Skalný in Rottalowitz.

Pteris aquilina L. ziemlich häufig in Gebüsch, an Waldrändern.

Asplenium Filix femina L. in Wäldern überall.

Asplenium Ruta muraria L. Schlossruine Obrány, Schlossruine Lukow, Felsen Stadtmauer vor Holleschau.

¹⁾ Das Redactionscomité hat die vom Verfasser gewählte Anordnung unverändert gelassen.

Asplenium septentrionale Sw. Rottalowitz Felsen, genannt Skalný, Grapy, široká skala; nicht häufig.

Asplenium Trichomanes Huds. Felsen, häufig.

Phegopteris polypodioidis Fée. schattige Tannenwaldungen, Javorčí, Poschla, Hostein.

Phegopteris Dryopteris Fée. in Gesellschaft mit der vorigen.

Phegopteris Robertiana A. Braun. Holleschau auf der Stadtmauer nächst dem Schlosse.

Aspidium Filix mas L. In Waldungen häufig.

Aspidium spinulosum Sw. schattige Waldungen häufig.

Aspidium aculeatum Doell. Waldbäche, Berg Javornik, Berg Čerňava, Humenec, nicht häufig.

Cystopteris fragilis Bernh. Rottalowitz Felsenkamm Skalný, Grapy, nicht selten.

2. **Ophioglosseæ.**

Botrychium Lunaria Sw. Rottalowitz Wiese „Planisko“, in manchen Jahren häufig.

3. **Lycopodiaceæ.**

Lycopodium Selago L. ober dem Rastokaer Revierhause, Berg Javorčí, Berg Poschla, Kaměnak bei Wlěkowa; häufig aber nicht überall.

Lycopodium clavatum L. Rastokaer Revier, Grúnj, nicht selten.

Lycopodium complanatum L. Ruine Obřany und angrenzende Bergwälder.

4. **Equisetaceæ.**

Equisetum limosum L. nasse Wiesen, häufig.

Equisetum silvaticum L. Rottalowitz unter „Klapinow“, Waldwiese „Botice“.

Equisetum hiemale L. Rudolphsthal nächst dem Teiche unter Obřany.

Equisetum arvense L. häufig, Aecker, Wiesen.

II. **Monocotyledones.**

1. **Cyperaceæ** 4 Gattungen; 26 Arten.

Carex vulpina L. nasse Wiesen, häufig.

„ *muricata* L. Gebüsche, Waldwiesen.

- Carex paniculata* L. nasse Wiesen, Waldwiesen.
„ *brizoides* L. gemein.
„ *leporina* L. an Gräben, Triften, ziemlich häufig.
„ *remota* L. Waldwiesen, Waldbäche.
„ *cespitosa* L. nasse Wiesen.
„ *acuta* L. nasse Waldwiesen.
„ *pilulifera* L. Waldtriften.
„ *tomentosa* L. häufig.
„ *digitata* L. Waldungen, häufig.
„ *panicea* L. Wiesen, gemein.
„ *glauca* Scop. Waldwiesen, ziemlich häufig.
„ *maxima* Scop. Rastokaer Revier (Wiese „Záruby“).
„ *pallescens* L. Wälder, Waldwiesen, häufig.
„ *flava* L. häufig, Waldwiese „Planisko“ u. a. O.
„ *distans* L. Waldwiesen, Triften.
„ *silvatica* Huds. Wälder.
„ *vesicaria* L. Wiesen bei Wlčkowa.
„ *hirta* L. häufig.

Eriophorum latifolium Hoppe, häufig auf nassen Wiesen.

„ *angustifolium* Roth. mit der vorigen.

Scirpus lacustris L. Holleschauer Schlossgarten.

„ *palustris* L. gemein in Gräben, nasse Wiesen.

„ *silvaticus* L. Sümpfe, nasse Wiesen, häufig.

Schoenus compressus L. nasse Wiesen, nicht selten.

2. **Gramineæ.** 32 Gattungen; 56 Arten.

Alopecurus pratensis L. Wiesen, überall.

„ *geniculatus* L. Sümpfe, feuchte Wiesen.

Phleum pratense L. gemein.

β. *nodosum*, trockene Stellen, nicht selten.

Agrostis vulgaris With. gemein.

„ *alba* Schrad. nicht selten in Gebüsch, an Weggrändern.

Apera spica-venti P. de B. unter den Saaten gemein.

Calamagrostis epigeios Roth. in Wäldern, Gebüsch.

„ *silvatica* De C. in Wäldern ober Žop, häufig.

Holcus lanatus L. Triften, Wiesen.

„ *mollis* L. trockene Waldwiesen.

Aira cespitosa L. Wälder, Gebüsch, Wiesen, häufig.

Avena falua L. unter der Saat.

„ *pubescens* L. Wiesen, nicht häufig.

„ *flavescens* L. Wiesen.

„ *caryophylla* Wigg. Hosteinberg gegen Süden, Rottalowitz „Grapy“ stellenweise in Gruppen, nicht alle Jahre.

Koeleria cristata Pers. ziemlich häufig.

Triodia decumbens P. d. B. nicht häufig auf Waldwiesen, Haiden, Rottalowitz, Hostein.

Melica nutans L. häufig.

„ *uniflora* Retz. Gebüsch, Wälder, gemein.

Phragmites communis Trin. feuchte Wiesen, Aecker, Sümpfe; Rottalowitz, Chomyž.

Molinia coerulea Mönch. nasse Wiesen bei Lukow, auch trockene Waldtriften ober Žop.

Glyceria fluitans R. Br. Gräben, Teiche, Bäche.

Briza media L. Wiesen, gemein.

Poa annua L. überall.

„ *trivialis* L. Gebüsch, Waldränder.

„ *pratensis* L. gemein.

„ *nemoralis* L. schattige Wälder, Gebüsch.

„ *compressa* L. trockene Plätze, nicht häufig.

Dactylis glomerata L. gemein.

Festuca duriuscula L. Waldränder, Wiesen.

„ *rubra* L. Triften, Gebüsch, Wegränder.

„ *silvatica* Vill. Hostein, „Javorník“, „Černava“, nicht selten.

„ *pratensis* Huds. Wiesen.

Bromus scealinus L. auf Aeckern, gemein.

„ *mollis*, L. Wiesen, Wegränder, häufig.

„ *asper* Murr. Wälder.

„ *sterilis* L. bei Holleschau.

„ *tectorum* L. trockene Wegränder, Holleschauer Stadtmauer.

Brachypodium pinnatum P. d. B. Waldränder, Gebüsch; Rottalowitz.

Brachypodium silvaticum Roem. Gebüsch; Rottalowitz, Brussný.

- Cynosurus cristatus* L. Wiesen, Triften, gemein.
Agropyrum repens Gärtn. gemein.
 „ *caninum* Gärtn. Gebüsch; Rottalowitz, Holleschau.
Elymus europæus L. Wälder, ziemlich häufig.
Hordeum murinum L. Holleschau, Bystritz, an Mauern.
Lolium perenne L. Wiesen, Wege, Aecker, häufig.
 „ *temulentum* L. unter der Saat, häufig.
Nardus stricta L. trockene Waldwiesen (auch feuchte Wiesen);
 Rottalowitz „Holý vrch“, unterm Hostein, gemein.
Digitaria sanguinalis Scop. auf bebautem Boden, Garten-
 land, Aecker, häufig; Holleschau Bystritz, Chomýž.
 „ *filiformis* Köler. häufig auf Aeckern, Brachfeldern;
 Rottalowitz u. a.
Echinochloë Crus galli L. Aecker, Gräben, häufig; Chomýž,
 Holleschau, Bystritz.
Setaria verticillata P. B. Ackerland, Gärten; Holleschau
 u. s. w.
 „ *viridis* P. B. gemein, Aecker, Stoppelfelder.
 „ *glauca* P. B. gemein.
Phalaris arundinacea L. Grabenränder; Holleschau.
Anthoxanthum odoratum L. gemein.
Andropogon Ischæmum L. Holleschau „Holajka“.

3. **Juncæ.** 2 Gattungen; 8 Arten.

- Juncus effusus* L. Gräben, Teichränder, häufig.
 „ *glaucus* Ehrh. mit dem vorigen „
 „ *conglomeratus* L. daselbst häufig.
 „ *bufonius* L. häufig.
 „ *articulatus* L. sumpfige Wiesen, Lachen.
Luzula albida De C. trockene Waldränder, häufig; Rottalo-
 witz „Hluboká cesta“.
 „ *campestris* De. C. Triften etc., häufig.
 „ *pilosa* Willd. Wälder, überall.

4. **Colchicææ.**

- Colchicum autumnale* L. Wiesen, gemein.

5. **Liliacææ.** 6 Gattungen; 3 Arten.

- Lilium Martagon* L. Bergwiesen, Waldplätze; Berg Javorník;
 Žoper Wälder.

- Anthericum ramosum* L. sonnige Wälder ober Žop.
Ornithogalum umbellatum L. Gebüsch, Wiesen, Hecken;
 Holleschau, Hlinsko u. A.
Gagea arvensis Schult. Aecker; Holleschau, Bystritz.
 „*lutea* Schult. Gebüsch, Wälder; Rottalowitz „Holý vrch“;
 Jankowitz „Hrabina“.
Ornithogalum pyrenaicum L. Brussný, Chomýž unter der
 Saat nicht selten.
Allium oleraceum L. Hecken, Aecker, Gebüsch.
Muscari racemosum Mill. unter der Saat; Brussný, Bystritz u. A.

6. **Smilacæ.** 4 Gattungen; 5 Arten.

- Polygonatum verticillatum* Mönch. Rottalowitzer Gebüsch;
 nicht häufig.
Polygonatum multiflorum Mönch. Rottalowitzer Wiesen,
 häufig.
Convallaria maialis L. Rottalowitzer Gebüsch, Wiese
 „Planisko“, grosse Gruppen.
Smilacina bifolia Desf. Rottalowitzer Berg Javořcí, Berg
 Poschla, „Týček“, häufig.
Paris quadrifolia L. Laub- und Nadelwälder, Bäche, häufig.

7. **Amaryllidæ.**

- Galanthus nivalis* L. Rottalowitzer Wälder „Holý vrch“,
 „u třech kamenů“, häufig.

8. **Iridæ.** 2 Gattungen und Arten.

- Gladiolus imbricatus* L. Rottalowitzer Wiesen, nicht häufig.
Iris sibirica L. Wiesen, Rottalowitz „Jastrábí“, ziemlich selten.

9. **Orchidæ.** 9 Gattungen; 17 Arten.

- Orchis militaris* L. zwischen Hlinsko und Holleschau, Wald-
 ränder, Thiergarten.
 „*ustulata* L. Brussný, Wiesen unterm Hostein, ziem-
 lich selten.
 „*coriophora* L. Rottalowitz „v Potučku“, nicht häufig.
 „*Morio* L. Wiesen, häufig.
 „*sambucina* L. Wiesen, Triften; Rottalowitz „Planisko“,
 „Čecher: gemein.
 „*maculata* L. Wälder, Waldwiesen; „Javorník“, „Ja-
 vořcí“ u. A. häufig.

- Orchis latifolia* L. nasse Wiesen, gemein.
" *globosa* L. trockene Waldwiesen; Rottalowitz „Planisko“, „Dúbek“ häufig.
- Gymnadenia conopsea* R. Br. Waldwiesen; Rottalowitz häufig.
- Habenaria viridis* R. B. (einmal gefunden auf der Waldwiese „Planisko“).
- Platanthera bifolia* Rich. Waldwiesen, Vorhölzer, ziemlich häufig.
- Neottia Nidus avis* Rich. schattige Wälder; Rottalowitz nicht selten.
- Listera ovata* R. Br. Waldwiesen; Rottalowitz häufig.
- Spiranthes autumnalis* Rich. Rottalowitz auf der Wiese beim Pfarrhause, selten; nicht alle Jahre.
- Epipactis palustris* Cr. Rottalowitz „Jastrábí“, „Dúbek“, feuchte Wiesen.
- Epipactis latifolia* All. „Rudolphsthal“ unterm Hostein, Waldwiese „Botice“ häufig.
- Cephalanthera ensifolia* Rich. Rottalowitz Wiese „Planisko“, nicht häufig.
10. **Aroideæ.** 2 Gattungen und Arten.
- Arum maculatum* L. Holleschau Fasangarten; Hlinsko Thiergarten.
- Acorus Calamus* L. Rottalowitz „Daňkové jezero“, Sümpfe unterhalb der evangelischen Kirche.
11. **Typhaceæ.**
- Typha latifolia* L. Jankowitz nordwestlich von der „Hrabina“, Holleschau Schlossgarten.
12. **Juncagineæ.**
- Triglochin palustre* L. Rottalowitz feuchte Wiesen gegen Hostein zu, häufig.
13. **Butomeæ.**
- Butomus umbellatus* L. Wiesen bei Hlinsko.
14. **Alismaceæ.**
- Alisma Plantago* L. Sümpfe, Lachen, häufig.

15. **Potamogetoneæ.** 1 Gattung; 2 Arten.

- Potamogeton crispus* L. Teiche bei Prussenowitz; Bystritzer
Teiche; „Rudolphsthal“.
„ *lucens* daselbst.

16. **Lemneæ.**

- Lemna trisulca* L. Gräben, Teichen, häufig.

III. Dicotyledones.1. **Nymphæaceæ.** 2 Gattungen und Arten.

- Nymphaea alba* L. Bystritz Schlossgarten.
Nuphar luteum Sm. Bystritz, Holleschau Schlossgarten.

2. **Conifereæ.** 3 Gattungen; 5 Arten.

- Pinus silvestris* L. (*Pinus Strobus* im „Rudolphsthal“
unterm Hostein.)
Abies pectinata De C. Waldungen.
„ *excelsa* Lam. Waldungen.
„ *Larix* Lam. Rottalowitz „Javořci“, „Pošchla“.
Juniperus communis L. häufig.
Taxus baccata L. Bystritzer Schlossgarten.

3. **Salicineæ.** 2 Gattungen; 12 Arten.

- Salix fragilis* L. gemein.
„ *alba* L. gemein.
„ *amygdalina* L. häufig.
„ *purpurea* L. gemein.
„ *viminalis* L. häufig.
„ *cinerea* L. nicht selten.
„ *caprea* L. gemein.
„ *aurita* L. hie und da; Jankowitz „Hrabina“.

Populus pyramidalis Roz.

- „ *nigra* L. häufig.
„ *tremula* L. häufig.
„ *alba* L. Anhöhen von Jankowitz.

4. **Betuleæ.** 2 Gattungen; 3 Arten.

- Betula alba* L. gemein.
„ *pubescens* Ehrh. Holleschauer Waldungen ober Žop,
ziemlich selten.
Alnus glutinosa L. gemein.

5. **Quercineæ.** 4 Gattungen; 5 Arten.

- Carpinus Betulus L. gemein.
Corylus Avellana L. häufig.
Quercus pedunculata Ehrh. häufig.
„ Robur L. „Hrabina“.
Fagus silvatica L. gemein.

6. **Ulmeæ.**

- Ulmus campestris L. häufig.

7. **Urticeæ.** 1 Gattung; 2 Arten.

- Urtica urens L. gemein.
„ dioica L. gemein.

8. **Cannabineæ.**

- Humulus Lupulus L. hier und da an Hecken.

9. **Aristolochieæ.**

- Asarum europæum L. Rottalowitz „Holý vrch“; Holleschauer
Fasangarten; Bystritz u. A.

10. **Thymeleæ.**

- Daphne Mezereum L. nicht selten; Rottalowitz „v Potůčku“,
„Humenec“; Jankowitz „Hrabšna“.

11. **Polygoneæ.** 2 Gattungen; 11 Arten.

- Rumex conglomeratus Murr. häufig.
„ crispus L. gemein.
„ Acetosa L. Wiesen.
„ Acetosella L. Aecker, Brachen, Wälder, gemein.
Polygonum amphibium L. Lachen, Sümpfe, Bäche.
„ lapathifolium L. Gräben, Gärten.
„ Persicaria L. Ackerland.
„ Hydropiper L. Dunghaufen, Gräben.
„ aviculare L. gemein.
„ Convolvulus L. Gartenland.
„ dumetorum L. Hecken; Holleschauer Fasangarten.
„ Fagopyrum und tataricum angebaut.

12. **Plantagineæ.** 3 Arten.

- Plantago major L. häufig.
„ media L. gemein.
„ lanceolata L. gemein.

13. **Primulaceæ.** 3 Gattungen; 7 Arten.

Anagallis arvensis L. gemein.

β. coerulea L. seltener, im Gartenboden.

Lysimachia vulgaris L. Gebüsche, Saaten', ziemlich häufig.

 " *Nummularia* L. häufig, Wald, Gartenland.

 " *nemorum* L. feuchte Wälder, ziemlich häufig.

Primula officinalis Jacqu. gemein.

 " *elatior* L. Waldwiesen, Gesträuch, Waldbäche, häufig.

14. **Verbeneæ.**

Verbena officinalis L. häufig.

15. **Labiataë.** 22 Gattungen; 40 Arten.

Mentha aquatica L. Gräben, Bäche, häufig.

 " *arvensis* L. Aecker, Gräben, häufig.

 " *viridis* L. Rottalowitz „Hořansko“.

 " *silvestris* L. gemein an feuchten Orten.

Lycopus europæus L. Waldbäche, Gräben etc., gemein.

Salvia glutinosa L. Rottalowitz „Hluboká cesta“, „Holý vrch“, „Rudolphsthal“, ziemlich häufig.

 " *verticillata* L. gemein, Brachen, Hügel, Wegränder.

 " *pratensis* L. Wiesen, häufig.

Origanum vulgare L. häufig.

Thymus Serpyllum L. gemein.

Calamintha Acinos Clairv. häufig, Brachen, Sandhügel.

Clinopodium vulgare L. gemein.

Nepeta Cataria L. verwildert, Gartenland; Rottalowitz.

Glechoma hederaceum L. häufig, Garten und Ackerland.

Melittis Melissophyllum L. Rottalowitz „Planisko“, Wald-
ränder nicht häufig.

Lamium album L. Gartenland, gemein.

 " *purpureum* L. gemein.

 " *maculatum* L. Hecken, häufig.

 " *amplexicaule* L. Gartenland, gemein.

Galeobdolon luteum L. Wälder, Wiesenränder, nicht selten.

Galeopsis Ladanum L. Aecker, Stoppelfelder, gemein; Bystřitz,
Hollerschau etc.; in Rottalowitz fehlend.

 " *pubescens* Bess. häufig, Aecker, Hecken.

 " *Tetrahit* L. gemein mit vorigem.

- Galeopsis versicolor* Curt. Waldplätze, häufig.
- Stachys alpina* L. Waldungen von Holleschau, Bystritz und Lukov zerstreut.
- „ *silvatica* L. daselbst.
- „ *palustris* L. Aecker, Gebüsch.
- „ *arvensis* L. Ackerland.
- „ *annua* L. Brachfelder, Hlinsko, Bystritz u. s. w.
- Betonica officinalis* L. Wiesen, Triften, Waldplätze.
- Ballota nigra* L. Gebüsch, Hecken; Chomýž, Holleschau, Bystritz u. s. w.
- Leonurus Cardiaca* L. Hecken, Mauer bei Dobrotitz, Holleschau u. a. O.
- Scutellaria galericulata* L. Gräben bei Wlčkowa; Holleschauer Schlossgarten; Rottalowitz „v Potučka“ u. a. O.
- Prunella vulgaris* L. gemein, Wiesen, Ackerland.
- „ *alba* Pall. Rottalowitzer Wiese „Ohrady“ u. a. O.
- „ *grandiflora* L. Triften; Hlinsko beim Thiergarten u. a. O.
- Ajuga reptans* L. gemein.
- „ *genevensis* L. häufig.
- Teucrium Botrys* L. Hlinsko, längs des Thiergartens.
- Marrubium vulgare* L. Holleschau.
16. **Verbasceæ.** 2 Gattungen; 5 Arten.
- Verbascum Thapsus* L. Waldplätze „Poschla, Žop, Holleschau.
- „ *nigrum* L. Zäune, Gesträuch, zerstreut.
- Scrophularia nodosa* L. Wälder, Gebüsch, häufig.
- „ *aquatica* L. Gräben, Bilavsko „Chlum“, u. a. O.
- „ *Scopolii* Hopp. an Hecken selten.
17. **Antirrhineæ.** 3 Gattungen; 5 Arten.
- Antirrhinum Orontium* L. Brachen, Aecker, nicht häufig.
- Linaria vulgaris* L. Miller, gemein.
- „ *spuria* Mill. Gartenland, Rottalowitz, nicht häufig.
- „ *minor* Desf. Ackerränder, Chomýž, Brussný etc.
- Digitalis grandiflora* Lamarck. Rottalowitz „Hluboká cesta“, „Týček“, nicht häufig.

18. **Orobanchæ.** 2 Gattungen und Arten.

Orobanche ramosa L. Aecker; Hanfäcker, nicht häufig; Rottalowitz, Jankowitz u. a. O.

Lathræa squamaria L. Wälder; Rottalowitz „Planisko“, „Holý vrch“.

19. **Veroniceæ.** 14 Arten.

Veronica scutellata L. Holleschau.

„ *Anagallis* L. Gräben.

„ *Beccabunga* L. Gräben, Bäche.

„ *Chamædrys* L. gemein, auf Wiesen.

„ *montana* L. Wälder; Rottalowitz „Humeneč“, „Botice“.

„ *officinalis* L. häufig.

„ *latifolia* L. Hecken bei Žop.

„ *spicata* L. Hügel bei Jankowitz, Hlinsko, nicht häufig.

„ *serpyllifolia* L. feuchte Wiesen, Wälder häufig.

„ *arvensis* L. Aecker, Brachen, ziemlich häufig.

„ *triphyllos* L. Aecker, Rottalowitz, Jankowitz etc.

„ *agrestis* L. Holleschau, hie und da.

„ *Buxbaumii* Tenore, gemein.

„ *hederæfolia* L. häufig, Aecker.

20. **Rhinanthææ.** 4 Gattungen; 9 Arten.

Pedicularis palustris L. Wiesen, Hoštalkowa.

Melampyrum cristatum L. Waldwiesen, häufig.

„ *arvense* L. Aecker, gemein.

„ *nemorosum* L. Waldwiesen, häufig.

„ *pratense* L. Waldwiesen.

Rhinanthus minor Ehrh. Wiesen, gemein

„ *major* Ehrh. Wiesen, unter der Saat.

Euphrasia officinalis L. Wälder, Wiesen, häufig.

„ *Odontites* L. Wiesen, Aecker, etwas seltener.

21. **Solanææ.** 5 Gattungen; 6 Arten.

Solanum nigrum L. Gartenland, Mauern, Holleschau, Bystřitz u. a. O.

„ *Dulcamara* L. Gebüsch, Gräben, Sümpfe; Rottalowitz.

Atropa Belladonna L. Wälder, Hainen; Rottalowitz „Lipova“, „Javorčí“.

Hyoscyamus niger L. Hecken, Dunghaufen, Gartenland.

Lycium barbarum L. Hecken, Holleschau, Bystritz.

Physalis Alkekengi L. Hecken, Dobrotitz.

22. **Boragineæ.** 9 Gattungen; 16 Arten.

Cerithe minor L. Aeckerränder, unter der Saat; Brussný,
Chomýž, Bystritz, gemein.

Echium vulgare L. gemein.

Lithospermum arvense L. Aecker, Brachen, häufig.

Pulmonaria officinalis L. Laubwälder, Gebüsch.

Myosotis palustris With. Gräben, Wiesen, häufig.

„ *silvatica* Hoffm. Wälder, Gehölze, gemein.

„ *intermedia* Link. Gartenland, Aecker, häufig.

„ *hispida* Schlechtend. Zäune, Gebüsch.

„ *versicolor* Pers. Waldränder, Hecken, Brachen,
nicht häufig.

„ *stricta* Link. Triften, Aecker, häufig.

„ *sparsiflora* Mikan. Hecken, Gebüsch, ziemlich selten.

Cynoglossum officinale L. bei Bystritz unterm Hostein;
Hecken bei Žop, häufig.

Anchusa arvensis M. B. Aecker, Saaten.

Nonnea pulla De C. Ackerränder bei Hlinsko, Prussenowitz,
nicht häufig.

Symphytum officinale L. feuchte Wiesen, Bäche, häufig.

„ *tuberosum* L. Wälder, Berg Poschla, Berg
Javorčí.

23. **Convolvulaceæ.** 2 Gattungen; 4 Arten.

Convolvulus arvensis L. unter der Saat, häufig.

„ *sepium* L. Gesträuch, Hecken, ziemlich häufig.

Cuscuta Epilinum Weihe. Im Lein, häufig.

„ *Epithymum* L. Waldwiesen, häufig.

24. **Gentianeæ.** 3 Gattungen; 7 Arten.

Menyanthes trifoliata L. Sümpfe, bereits verschwunden.

Gentiana cruciata L. Rottalowitz „v Potůčku“ selten; bei
Holleschau häufiger, „Lipina“, Thiergarten; Wald-
wiesen bei Žop.

„ *Pneumonanthe* L. Hutweiden bei Chomýž, „Hrabina“.

„ *ciliata* L. Bergwiesen unter Hostein, „Dúbek“.

Gentiana Amarella L. Wiesen häufig.

Erythraea Centaurium Pers. Gehölze, Haiden, häufig.

25. **Apocynæ.**

Vinca minor L. Laubwälder, nicht selten.

26. **Oleaceæ.** 2 Gattungen und 2 Arten.

Ligustrum vulgare L. gemein.

Syringa vulgaris L. verwildert, Hosteinberg.

27. **Fraxineæ.**

Fraxinus excelsior L.

28. **Ericinæ.** 4 Gattungen; 8 Arten.

Vaccinium Myrtyllus L. Waldränder; Hosteinberg östlich;
„Rudolphsthal“, „Dúbek“, „Planisko“, „Jastrábi“ u. a. O.
häufig.

Calluna vulgaris Salisb. Waldwiesen, gemein.

Pyrola rotundifolia L. Wälder, nicht selten.

„ *chlorantha* Sw. Wälder ober Žop, selten.

„ *minor* L. Wälder, „Javořci“, „Poschla“, häufig.

„ *secunda* L. daselbst seltener, gruppenweise.

Monotropa Hypopitys L. Berg Javořci, „Záruby“, feuchte
Nadelwälder.

29. **Campanulaceæ.** 3 Gattungen; 9 Arten.

Jasione montana L. Haiden, Brachen, häufig.

Phyteuma spicatum L. Wälder, Waldwiesen, häufig.

Campanula patula L. Wiesen, gemein.

„ *Rapunculus* L. Gebüsch, nicht selten.

„ *persicifolia* L. Gebüsche, Waldhügel, häufig,
„Týček“.

„ *rapunculoides* L. Aecker, Graspärten, gemein.

„ *Trachelium* L. Gebüsch, Wälder, häufig.

„ *Cervicaria* L. Waldwiesen, nicht selten.

„ *glomerata* L. Wiesen, gemein.

30. **Ambrosiaceæ.** 2 Arten.

Xanthium strumarium L. Wegränder, Strassengräben bei
Holleschau.

Xanthium spinosum L. bei Holleschau früher selten, jetzt
gemein, am Rusavabache.

31. **Compositæ.** 35 Gattungen; 82 Arten.

- Lapsana communis* L. Gartenland, Hecken, gemein.
Cichorium Intibus L. an Wegen, Rainen, gemein.
Leontodon autumnalis L. Wiesen, Waldplätze, häufig.
 " *hastilis* L. Wiesen, gemein.
Picris hieracioides L. Rottalowitz auf dem Kirchhofe; Holleschau „Holajka“, u. a. O.
Tragopogon pratensis L. Wiesen, gemein.
Hypochoeris glabra L. Aecker, Brachen, gemein.
 " *radicata* L. Wiesen, Waldränder, häufig.
 " *maculata* L. Waldwiesen, Hostein, „Dúbek“ u. s. w.
Taraxacum officinale Wigg. gemein.
Phoenicopus muralis Koch. lichte Waldplätze, häufig.
Prenanthes purpurea L. Laubwälder, häufig.
Sonchus oleraceus L. Aecker, Gärten, gemein.
 " *asper* Vill. mit vorigem.
 " *arvensis* L. Aecker, häufig.
Crepis virens Vill. Wiesen, Triften.
 " *tectorum* L. Brachen, gemein.
 " *biennis* L. Wiesen, häufig.
Hieracium Pilosella L. Grasplätze, gemein.
 " *Auricula* L. Wiesen, Grasplätze, häufig.
 " *præaltum* Vill. Triften, Grasplätze, nicht selten.
 " *Bauchini* Schult. Grasplätze, häufig.
 " *collinum* Goch. Waldwiesen, „Javořci“.
 " *murorum* L. Wälder, Haiden, häufig.
 " *boreale* Fries. Laubwälder.
 " *silvaticum* Fl. dan. Wälder, Hauen.
Eupatorium cannabinum L. Waldbäche, Waldwiesen, häufig.
Tussilago Tarfara L. gemein.
 " *alba* L. Waldwiesen „Javořci“, „Lipova“, häufig.
 " *Petasites* L. Waldbäche, häufig.
Bellis perennis L. gemein.
Erigeron acris L. Wiesen, Triften, nicht häufig.
 " *canadensis* L. Hauen, Waldränder, gemein.
Solidago Virga aurea L. waldige Hügel, Haine; Brussný, Chomýž, Slavkov u. s. w.

- Bidens cernua* L. an Gräben, Lachen, häufig.
 „ *tripartita* L. daselbst, gemein.
Inula salicina L. Wiese unter dem Kirchhofe zu Rottalowitz
 gruppenweise.
 „ *britannica* L. gemein.
 „ *hirta* L. Waldhügel, nicht häufig.
Filago germanica L. Aecker, Brachen, gemein.
 „ *arvensis* L. mit vorigem.
Gnaphalium silvaticum L. Wälder, häufig.
 „ *uliginosum* L. in Gräben, nasse Aecker.
 „ *dioicum* L. Haiden, Waldplätze, Waldwiesen, gemein.
Artemisia vulgaris L. Gesträuch, Hecken, häufig.
Tanacetum vulgare L. Gebüsch; nicht selten.
Achillea Millefolium L. Wiesen, Aecker, gemein.
Anthemis tinctoria L. Schlossruine Lukow.
 „ *arvensis* L. Acker, Brachen, gemein.
Matricaria Chamomilla L. Aecker, Gartenland.
Chrysanthemum Leucanthemum L. Wiesen, häufig.
 „ *inodorum* L. Ackerland, Strassengräben,
 ziemlich häufig.
 „ *corymbosum* L. Hlinsko Thiergarten.
Senecio vulgaris L. Gartenland, gemein.
 „ *viscosus* L. Hauen, Wälder, häufig.
 „ *silvaticus* L. Waldplätze, Hauen, häufig.
 „ *Jacobæa* L. Wiesen, Waldplätze, häufig.
 „ *barbaræifolius* Krock. Waldwiesen.
 „ *nemorensis* L. Waldwiesen, häufig.
Cirsium lanceolatum Scop. Wegränder, gemein.
 „ *palustre* Scop. Waldwiesen, Hauen, heerdenweise.
 „ *canum* All. Wiese bei Hlinsko.
 „ *rivulare* Jacq. Wiesen, gemein.
 „ *oleraceum* Scop. sumpfige Wiesen, häufig.
 „ *arvense* Scop. Brachen, Aecker, unter der Saat,
 gemein¹⁾).

¹⁾ *Cirsium eriophorum* Roth, einmal in Drstkowa am Bachufer gefunden.

- Carduus acanthoides* L. an Wegen, gemein.
 „ *crispus* L. Gebüsch, Gräben, häufig; Holleschau
 Fasangarten.
 „ *nutans* L. Holleschau.
Onopordon Acanthium L. Hecken, Mauer in Dobrotitz.
Lappa major Gärtu. Hecken, Zäune.
 „ *minor* De C. mit voriger.
 „ *tomentosa* Lamarck. bei Holleschau.
Carlina acaulis L. Hügel, Triften, häufig bei Rottalowitz.
 „ *vulgaris* L. häufig, mit voriger.
Serratula tinctoria L. Wiesen bei Brussný; „Hrabina“ zwi-
 schen Chomýž und Jankowitz.
Centaurea Cyanus L. gemein.
 „ *Jacea* L. Wiesen, Triften, Gebüsch, häufig.
 „ *phrygia* L. Wiesen, gemein.
 „ *paniculata* L. Ackerränder, Holleschau.
 „ *decipiens* Thuill. Waldrand ober Wlčkowa.
 „ *Scabiosa* L. Hügellehnen; Hlinsko, Slawkow.

32. **Dipsacæ.** 2 Gattungen; 4 Arten.

- Dipsacus silvestris* Mill. an Wegen, Waldrändern, nicht selten.
Scabiosa arvensis L. Brachen, Wälder, zerstreut.
 „ *ochroleuca* L. Hügel, hie und da.
 „ *Succisa* L. feuchte Wiesen, ziemlich häufig.

33. **Valerianææ.** 2 Gattungen; 4 Arten.

- Valeriana officinalis* L. Gebüsch, Wälder, Bachufer, häufig.
 „ *dioica* L. feuchte Wiesen, Hořfalkowa.
Fedia olitoria W. et Gr. Grasgärten, Hecken, häufig.
 „ *dentata* W. et Gr. unter der Saat.

34. **Rubiaceæ.** 3 Gattungen; 14 Arten.

- Galium Cruciatum* Scop. Gebüsch, Bachufer nicht selten.
 „ *vernum* Scop. häufig an Hecken, Waldrändern.
 „ *Aparine* L. Hecken, Gebüsch, häufig.
 „ *palustre* L. Gräben, feuchte Wiesen, Sümpfe; Rottalowitz.
 „ *rotundifolium* L. Wälder „Javořčí“; Poschla u. A.
 „ *boreale* L. Waldwiesen, nicht selten.
 „ *verum* L. Rainen, Hutweiden, gemein.
 „ *Mollugo* L. Hecken, Wege, Wiesen, gemein.

Galium silvaticum L. Wälder, häufig ober Žop.

Asperula Aparine Schot. Waldbäche, Gebüsch; bei Wlčkowa
„Kaměnák.“

„ *odorata* L. Wälder, häufig.

„ *cynanchica* L. sonnige Plätze, Gebüsch häufig; „Hra-
bina“ bei Chomyž.

„ *arvensis* L. Acker bei Jankowitz, selten.

Sherardia arvensis L. gemein.

35. **Viburneæ.** 2 Gattungen; 4 Arten.

Viburnum Opulus L. Gebüsch, hie und da.

Sambucus nigra L. häufig.

„ *racemosa* L. Wälder, Holý vrch“, „Javořci“,
nicht häufig.

„ *Ebulus* L. Wälder, Hecken.

36. **Cucurbitaceæ.**

Bryonia alba L. Hecken, Zäune bei Žop.

37. **Grossulariæ.**

Ribes rubrum L. cultivirt.

„ *nigrum* L. „

„ *Grossularia* „

38. **Loranthæ.**

Viscum album L. häufig.

39. **Evonymæ.**

Evonymus europæus L. Gebüsch, nicht selten.

40. **Euphorbiaceæ.** 2 Gattungen; 9 Arten.

Euphorbia Helioscopia L. Gartenland, häufig.

„ *platyphylla* L. Gräben, Ackerränder, häufig.

„ *dulcis* L. Laubwälder häufig.

„ *amygdaloides* L. Wälder, häufig.

„ *Cyparissias* L. Brachen, Wegränder, häufig.

„ *Esula* L. an Wegen, Gräben, häufig.

„ *exigua* L. Aecker, Gartenland, hie und da.

Mercurialis perennis L. Wälder, häufig; Rottalowitz „Berg
Javořci, Poschla“, Hosteinberg.

„ *annua* L. Gartenland, Holleschau.

41. **Rhamnaceæ.** 2 Arten.

- Rhamnus Frangula* L. Hecken, Wälder, Gebüsch, häufig.
 „ *cathartica* L. Hecken, Gebüsch, seltener.

42. **Papilionaceæ.** 15. Gattungen; 40 Arten.

- Spartium scoparium* L. Wälder ober Přílep u. a. O.
Genista tinctoria L. Wiesen, Hügel, Haiden, häufig.
 „ *germanica* L. Hügel, Haiden, häufig.
Cytisus capitatus Jacq. Wälder, Hügel, nicht sehr häufig.
 „ *nigricans* L. Haiden, hie und da.
Ononis spinosa L. gemein.
Galega officinalis L. Wegränder (bei Střebetice gegen Zahleňic).
Medicago falcata L. Wiesen, Ackerränder, häufig.
 „ *lupulina* L. Wiesen, Aecker, gemein.
Melilotus officinalis Willd. Gebüsch, „Hrabina“ bei Chomýž
 u. a. O.
Trifolium ochroleucum L. Waldwiesen, Gehölz, häufig.
 „ *pratense* L. Wiesen, wild und angebaut.
 „ *alpestre* L. Waldränder, Gebüsch, Hügel, nicht selten.
 „ *rubens* L. Waldwiesen; Rottalowitz Wiesen „Jastrabí“.
 „ *arvense* L. Aecker, gemein.
 „ *fragiferum* L. Gräben, hie und da.
 „ *montanum* L. Waldränder, Hügel, Wiesen, gemein.
 „ *repens* L. Gartenland, Wiesen, gemein.
 „ *hybridum* L. ausgetrocknete Teiche bei Prussenowitz.
 „ *agrarium* L. Wälder, Hügel, hie und da.
 „ *procumbens* L. Wiesen, Aecker, gemein.
 „ *filiforme* L. Wiesen, Aecker, häufig.
Lotus corniculatus L. Wiesen, Wegränder, gemein.
Astragalus glycyphyllos L. Waldwiesen, Wälder, Gebüsch,
 zerstreut.
 „ *Cicer* L. Gestrüpp, Hügel, bei Chomýž, Holleschauer
 Fasangarten.
Coronilla varia L. Wegränder, Triften, häufig.
Vicia dumetorum L. Waldgebüsch, ober Žop u. a. O.
 „ *cassubica* L. Rottalowitz Waldwiese „Planisko“.
 „ *Cracca* L. Gebüsch; unter der Saat, häufig.
 „ *silvatica* L. im Thiergarten bei Hlinsko.

Vicia hirsuta Koch. unter der Saat.

„ *tetrasperma* Koch. unter der Saat, häufig.

„ *sepium* L. Gestrüpp, Waldwiesen, häufig.

„ *sativa* L. auf Aeckern, unter der Saat.

Lathyrus pratensis L. Hecken, Gesträuche, häufig.

„ *silvestris* L. Waldwiesen, Gebüsch, „Planisko“.

„ *tuberosus* L. unter der Saat, häufig.

Orobus vernus L. schattige Gebüsch, nicht selten.

„ *niger* L. Wälder, Vorgehölze, häufig.

43. **Prunaceæ.** 1 Gattung; 3 Arten.

Prunus spinosa L. gemein.

„ *avium* L. Wälder, verwildert.

„ *Padus* L. Holleschauer Fasangarten.

44. **Sanguisorbeæ.** 4 Gattungen und Arten.

Alchemilla vulgaris L. Wiesen, Gartenland, häufig.

Aphanes arvensis L. „Dúbek“ gegen Hostein zu; Brachen,
nicht häufig.

Sanguisorba officinalis L. Wiesen, gemein.

Poterium Sanguisorba L. trockene Hügel, Gebüsch, häufig.

45. **Spiræaceæ.** 1 Gattung; 2 Arten.

Spiræa Filipendula L. Wiesen, gemein.

„ *Aruncus* L. feuchte Wälder; „Rudolphsthal“ beim
Teiche; Rottalowitz „v Potůcku“.

46. **Potentilleæ.** 6 Gattungen; 15 Arten.

Rubus fruticosus L. Hecken, Gebüsch, gemein.

„ *cæsius* L. Hecken, Gebüsch, häufig.

„ *idæus* L. Wälder, Waldhaine, häufig.

Fragaria vesca L. häufig.

„ *elatior* Ehrh. Wälder, häufig.

„ *collina* Ehrh. Haine, Gebüsch, seltener.

Potentilla supina L. Stadt Bystritz beim Pfarrhause.

„ *anserina* L. an Wegen, gemein.

„ *reptans* L. Grasplätze, Wiesen, häufig.

„ *inclinata* Vill. sonnige Hügel, nicht häufig.

„ *argentea* L. an Wegen, häufig.

„ *verna* L. sonnige Hügel, häufig.

Geum urbanum L. Gebüsch, häufig.

Agrimonia Eupatorium L. Grasplätze, Hügel, häufig.

Tormentilla erecta L. Wiesen, Wälder, Hügellehnen, häufig.

47. **Rosaceæ.** 5 Arten.

Rosa alpina L. Rottalowitz „v Potůčku“.

„ *canina* L. gemein.

„ *tomentosa* Sm. Gebüsch, häufig.

„ *rubiginosa* L. Gebüsch, nicht häufig.

„ *gallica* L. Waldgebüsch ober Žop.

48. **Pomaceæ.** 3 Gattungen; 5 Arten.

Cratægus Oxyacantha L. Gebüsch, gemein.

Pyrus communis L. in Wäldern.

„ *Malus* L. in Wäldern.

Sorbus Aucuparia L. hie und da verwildert.

„ *torminalis* Crantz, in Wäldern, „Poschla“, „Javořčí“.

49. **Onagrarieæ.** 3 Gattungen; 9 Arten.

Epilobium angustifolium L. Hauen, Wälder, nicht selten, gruppenweise.

„ *hirsutum* L. Gräben, Gesträuch, gemein.

„ *parviflorum* Schreb. Gräben, häufig.

„ *montanum* L. Gebüsch, Hecken, gemein.

„ *roseum* Schreb. Gräben, Gebirgsbäche, zerstreut.

„ *Dodonæi* Vill. Quellen, nicht häufig.

Oenothera biennis L. Lukover Schlossruine.

Circæa alpina L. schattige Wälder, gemein.

„ *lutetiana* L. Gebirgsbäche häufig.

50. **Salicarieæ.** 2 Arten.

Lythrum Salicaria L. Bäche, Gräben, häufig.

„ *Hyssopifolia* L. Gräben, nicht häufig; Jankowitz, Bystritz.

51. **Araliaceæ.** 2 Gattungen; 3 Arten.

Hedera Helix L. Wälder, häufig.

Cornus sanguinea L. Gesträuch, häufig.

„ *mas* L. Bystritzer Schlossgarten.

52. **Adoxeæ.**

Adoxa moschatellina L. Gräben; Holleschauer Fasangarten, „Holajka“.

53. **Umbelliferæ.** 25 Gattungen; 28 Arten.

Sanicula europæa L. schattige Wälder, häufig.

- Dondia Epipactis* Spr. Laubwälder, Gesträuch; ober Žop, bei Chomýž, Bystřitz u. a. O.
- Astrantia major* L. Waldwiesen, zerstreut; Žop, „Rudolphsthal“, „Černava“ u. a. O.
- Eryngium campestre* L. Wegränder, Holleschau.
- Sium Falcaria* L. Aecker Bystřitz unterm Hostein u. a. O.
- Aegopodium Podagraria* L. Hecken, Acker- und Gartenland, gemein.
- Carum Carvi* L. Wiesen, gemein.
- Pimpinella Saxifraga* L. Hügel, Triften, gemein.
- „ *magna* L. Waldwiesen, Graspärten, häufig.
- Bupleurum rotundifolium* L. Ackerränder, Gräben; Pruszenowitz.
- Oenanthe Phellandrium* Lam. Gräben, Teiche, Bystřitz u. a. O.
- Aethusa Cynapium* L. Gartenland, Aecker, häufig.
- Seseli annuum* L. Hügel; Gross-Lukow; „Hrabina“ bei Chomýž, Hlinsko u. a. O.
- Silaus pratensis* Bess. Wiesen, Chomýž, Brussný u. a. O.
- Selinum Carvifolia* L. Wälder, ober Žop, „Berg Poschla“.
- Angelica silvestris* L. Waldwiesen, Gehölz, häufig.
- Peucedanum Cervaria* Lapeyr. Wiesen Brussný, Slawkow.
- Pastinaca sativa* L. Wiesen, Gebüsche, Wälder, häufig.
- Heracleum Sphondylium* L. Wiesen, häufig.
- Laserpithium prutenicum* L. Waldwiesen, ober Žop, häufig.
- Daucus Carota* L. Wiesen, Ackerränder, gemein.
- Caucalis daucoides* L. unter der Saat; Chomýž, selten.
- Torilis Anthriscus* Gärtn. Hecken, gemein.
- Anthriscus silvestris* Hoffm. Gebüsche, Hecken, häufig.
- Chærophyllum temulum* L. Gebüsche, gemein.
- „ *hirsutum* L. Quellen, feuchte Wiesen, Wälder, zerstreut.
- „ *aromaticum* L. Gebüsche, Bachufer, häufig.
- Scandix Pecten Veneris* L. unter der Saat, Chomýž, Brussný, u. a. O.

54. **Saxifragæ.** 2 Gattungen.

- Saxifraga granulata* L. Hosteinberg unter der Quelle.
- Chrysosplenium alternifolium* L. sumpfige Stellen, gemein.

55. **Crassulaceæ.** 2 Gattungen 4 Arten.

- Sedum Telephium* L. Rottalowitz „Hluboká cesta“, „Týček“.
„ *acre* L. Sandboden, häufig.
„ *sexangulare* L. mit vorigem, gemein.
Sempervivum tectorum L. Mauern, Hausdächer.

56. **Chenopodiaceæ.** 2 Gattungen; 8 Arten.

- Chenopodium album* L. Gartenland, häufig.
„ *hybridum* L. Gartenland, häufig.
„ *polyspermum* L. Gartenland, gemein.
„ *Bonus Henricus* L. gemein.
„ *glaucum* L. Dunghaufen, Gartenland, häufig.
„ *Vulvaria* L. an Mauern, Holleschau.

Atriplex patula L. Gartenland, gemein.

„ *rosea* L. Zäune, Mauern, häufig.

57. **Amarantaceæ.** 2 Arten.

Amarantus Blitum L. Gartenland, Holleschau.

„ *retroflexus* L. Wegränder, Strassengräben, Holleschau u. a. O.

58. **Scleranthææ.**

Scleranthus annuus L. unter der Saat, gemein.

59. **Paronychieæ.** 2 Gattungen.

Spergula arvensis L. Aecker, Brachen, häufig.

Herniaria glabra L. Bachufer, sandige Stellen, häufig; „Raztokabach“ bei Rottalowitz.

60. **Alsineæ.** 7 Gattungen; 14 Arten.

Alsine rubra Wahlenb. sandige Plätze, Brachen, nicht häufig.

Arenaria serpyllifolia L. Aecker, Brachen, gemein.

Mœhringia trinervia Clairv. häufig.

Stellaria nemorum L. Wälder, häufig.

„ *media* Vill. Gartenland, gemein.

„ *Holostea* L. Gesträuch; „Hrabina“ bei Jankowitz u. a. O.

„ *graminea* L. unter der Saat, Wiesen, häufig.

„ *uliginosa* Murr. Waldwiesen, häufig.

Sagina procumbens L. Brachen, Mauer, häufig.

Holosteum umbellatum L. Triften, Aecker, heerdenweise.

Cerastium aquaticum L. feuchte Stellen, Sümpfe, Gebüsche, häufig.

- Cerastium vulgatum* L. Triften, Wiesen, Brachen, häufig.
 „ *glomeratum* Thuill. Grasplätze, Gartenland.
 „ *arvense* L. Ackerränder, gemein.

61. **Sileneæ.** 6 Gattungen; 16 Arten.

- Cucubalus baccifer* L. Hecken; Holleschauer Fasangarten.
Dianthus Carthusianorum L. Triften, Waldhügel, gemein.
 „ *deltoides* L. Wiesen, gemein.
 „ *Armeria* L. Hügel, Waldränder, häufig.
 „ *superbus* L. Waldränder, Brussný, Rottalowitz
 „Čecher“, „Hradilova skála“.
Lychnis diurna Sibth. Wälder, Gebüsch, häufig.
 „ *vespertina* Sibth. Ackerränder, Wiesen, gemein.
 „ *Githago* L. unter der Saat, gemein.
 „ *Flos Cuculi* L. Wiesen, gemein.
 „ *Viscaria* L. Waldwiesen, Hügellehnen, häufig, unterm
 Hostein nordwestlich.

- Silene gallica* L. Aecker, gemein.
 „ *nutans* L. Waldränder, Rottalowitz „Hluboká cesta“,
 häufig.
 „ *inflata* Smith, Triften, gemein.
 „ *noctiflora* L. Aecker, unter der Saat, häufig.

- Saponaria officinalis* L. Gebüsch, Ufergesträuch.
Gypsophila muralis L. Ackerränder; Klein-Lukow, Frei-
 stadtl, Bystritz.

62. **Geraniaceæ.** 2 Gattungen; 9 Arten.

- Geranium silvaticum* L. Waldränder, Waldwiesen, „Planisko“.
 „ *pratense* L. Wiesen, häufig.
 „ *palustre* L. feuchte Waldwiesen, nicht selten.
 „ *sanguineum* L. Gebüsch, Waldwiesen; „Jastrábi“.
 „ *pusillum* L. Ackerland, gemein.
 „ *dissectum* L. Ackerland, häufig.
 „ *columbinum* L. Triften, Hügel, nicht selten.
 „ *Robertianum* L. Gebüsch, Wälder, gemein.
Erodium cicutarium l'Herit. Aecker, häufig.

63. **Lineæ.**

- Linum catharticum* L. Wiesen, häufig.

64. **Oxalidæ.** 2 Arten.
Oxalis Acetosella L. Laub- und Kieferwälder, häufig.
" stricta L. Gartenland.
65. **Malvaceæ.** 2 Gattungen; 3 Arten.
Malva silvestris L. an Wegen, Gräben.
" rotundifolia L. gemein.
Lavatera thuringiaca L. bei Bilawsko; Strassenränder.
66. **Hypericinæ.** 4 Arten.
Hypericum perforatum L. Wege, Hügel, gemein.
" tetrapterum Fries. quellige Wiesen, häufig.
" montanum L. Gehölze, Hügellehnen, häufig.
" hirsutum L. Wälder, häufig.
67. **Tiliaceæ.** 2 Arten.
Tilia parvifolia Ehrh.
" grandifolia Ehrh.
68. **Balsamineæ.**
Impatiens Noli tangere L. gemein in Wäldern.
69. **Acerineæ.** 3 Arten.
Acer campestre L.
" platanoides L.
" Pseudo-Platanus L.
70. **Hippocastaneæ.**
Aesculus Hippocastanum L.
71. **Droseraceæ.**
Parnassia palustris L. feuchte Wiesen, häufig.
72. **Violeæ.** 3 Arten.
Viola tricolor L. Ackerland, häufig.
" canina L. Waldplätze, gemein.
" odorata L. Hecken, Gärten, häufig.
73. **Cistineæ.**
Helianthemum vulgare Gärtn. Hügellehnen, Waldränder
gemein.
74. **Cruciferæ.** 20 Gattungen; 31 Arten.
Thlaspi arvense L. Ackerland, gemein.
Lepidium campestre R. Br. Ackerränder, häufig.
" ruderale L. in Dörfern, Dobroticz u. a. O.
heerdenweise.

- Capsella Bursa pastoris* Mönch. Ackerland, häufig.
Neslia paniculata Desv. Gartenland, gemein.
Raphanus Raphanistrum L. unter der Saat, gemein.
Camelina sativa Cr. Ackerland, Brachen, häufig.
Draba verna L. Ackerränder, gemein.
Farsetia incana R. Br. Hecken, Wegränder, Dobrotitz.
Alyssum calycinum L. Sandboden, Brachen, gemein.
Lunaria rediviva L. schattige Wälder, zerstreut; Rottalowitz.
Nasturtium silvestre R. Br. Acker, Wegränder, gemein.
Barbaræa vulgaris R. Br. Hügellehnen, Aecker, Gräben,
 häufig.
Turritis glabra L. Waldplätze, „Poschla“.
Arabis hirsuta Scop. Waldränder, Hügel.
 „ *alpina* L. Burgruine „Obřany“.
Cardamine Impatiens L. Wälder, gemein.
 „ *silvatica* Link. Wälder, häufig.
 „ *hirsuta* L. Waldplätze.
 „ *pratensis* L. Wiesen, häufig.
 „ *amara* L. Wiesen, Bäche, Quellen, häufig.
Dentaria enneaphyllos L. Wälder, „Holý vrch“ u. a. O.
 „ *bulbifera* L. Wälder, häufig.
Sisymbrium officinale Scop. Mauer, Hecken; Holleschau,
 Chomýž u. a. O.
 „ *Thalianum* Gaud. Ackerland, häufig.
 „ *Alliaria* Scop. Gebüsche, Ackerland, häufig.
Erysimum strictum Fl. d. Wett, bei Jankowitz, Ackerränder.
 „ *cheiranthoides* L. Ackerland, häufig.
 „ *orientale* R. Br. Aecker, Hlinsko, Jankowitz u. a. O.
Diplotaxis muralis Dl. Strassenränder; Holleschau.
Sinapis arvensis L. Aecker; Žop.

75. **Papaveraceæ.** 2 Gattungen; 3 Arten.

- Chelidonium majus* L. Gartenland, häufig.
Papaver Rhœas L. unter der Saat.
 „ *Argemone* L. unter der Saat, Brachen, häufig.

76. **Fumariaceæ.** 2 Gattungen; 3 Arten.

- Corydalis cava* Schweigg. Wälder; „Holý vrch“, heerden-
 weise.

Corydalis solida Sm. Hecken, Gesträuche; Brussný, Chomýž,
Jankowitz, häufig.

Fumaria officinalis L. Aecker, Gartenland, häufig.

77. **Polygaleæ.** 2 Arten.

Polygala vulgaris L. trockene Wiesen, Hügel, häufig.

„ *comosa* Schk. mit voriger häufig.

78. **Berberideæ.**

Berberis vulgaris L. Hecken; Holleschauer Fasangarten;
Burgruine Lukow.

79. **Pæoniaceæ.**

Actæa spicata L. Gesträuche, Waldränder; „Planisko“, „Holý
vrch.“

80. **Ranunculaceæ.** 11 Gattungen; 18 Arten.

Ranunculus Flammula L. feuchte Wiesen, Ackerränder; Slaw-
kow“, „Chomýž“.

„ *auricomus* L. Wiesen, gemein.

„ *acris* L. Wiesen, gemein.

„ *lanuginosus* L. Waldbäche, Waldwiesen. häufig.

„ *repens* L. Wiesen, Ackerland, gemein.

„ *sceleratus* L. Sümpfe, Gräben, häufig.

„ *arvensis* L. unter der Saat, gemein.

Ficaria ranunculoides Mönch. Zäune, Wiesen, Wälder, gemein.

Myosurus minimus L. Aecker; Holleschau.

Adonis æstivalis L. unter der Saat, häufig.

Anemone nemorosa L. Waldränder, Gebüsche, gemein.

„ *ranunculoides* L. Wälder; „Javorčí“.

Thalictrum angustifolium L. Hutweide bei Žop.

Caltha palustris L. Sümpfe, Wiesen, gemein.

Isopyrum thalictroides L. Wälder, Gebüsche; „Hrabina“
u. a. O.

Nigella arvensis L. Aecker bei Tučap u. a. O.

Aquilegia vulgaris L. Wälder; Rottalowitz Wiesen, häufig.

Delphinium Consolida L. Aecker, gemein.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [06](#)

Autor(en)/Author(s): Sloboda Daniel

Artikel/Article: [Flora von Rottalowitz und Umgebung in Mähren 98-124](#)