

Verhandlungen und Mittheilungen

des siebenbürgischen

Vereins für Naturwissenschaften

zu

HERMANNSTADT.

XV. **Juli 1864.** **Nro. 7.**

Inhalt: M. Fuss: Herbarium Normale Transsilvanicum. — J. L. Neugeboren: Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken aus dem Tegelgebilde von Ober-Lapugy (Fortsetzung). — L. Reissenberger: Meteorologische Beobachtungen zu Hermannstadt im Monate Juni 1864.

Herbarium Normale Transsilvanicum.

Centuria III.

(Fortsetzung.)

- 248.** *Tanacetum vulgare L.* — Bgt. n. 1777. — SS. n. 1558. — An Ackerainen, Strassenrändern, Wiesen; häufig. — Hermannstadt Baumgarten; Grossscheuern, Neudorf, Freck Fuss; Reps Baumgarten, Fronius; Feldorf Balavásár Salzer; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Tölgyes Salzer; Thorenburg, Záh Ercsei; Roskány Baumgarten; Broos Unvericht. — Gesammelt bei Freck von M. Fuss.
- 249.** *Lactuca Chaixi Vill.* — *L. sagittata* Bgt. n. 1689. — SS. n. 1705. — Im Gesträuch und lichten Wäldern der Bergregion. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Nagy-Bun, Kronstadt Baumgarten; Hammersdorf, Grossscheuern, Neudorf Fuss; Klausenburg Schur. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Kirchenbusch“ von M. Fuss.
- 250.** *Hieracium Fussianum Schur.* *H. piloselloides* b. *Fussianum* SS. n. 1752. b. — Im Gerölle der Bergabhänge in den Voralpen. — Rothethurmpass Unvericht, Fuss; Michelsberg Fronius, Fuss; Reschinar, Gurariului, Szaszcsor Fuss. — Gesammelt beim Rothenthurmpass von M. Fuss.
- 251.** *Campanula alpina Jacq.* — Bgt. n. 315. — *Marianthemum.* — SS. n. 1832. — Auf den Hochalpen; sehr

häufig. — Burzenländer Alpen Schulergebirge, Piatra mare Baumgarten; Butschetsch Baumgarten, Kotschy, Salzer, Fronius, Hornung, Fuss; Fogarascher und Arpascher Alpen Schur; Kepreriatze, Kerzeschoraer Alpen Butian, Fundu Bulli Fuss; Stiavu verosz im Fundu Valie Domni Fronius, Fuss; Porumbacher Alpe Albote, Negoi Fuss; Frecker Alpe Burkatsch Sigerus; Tschörte Fuss; Szuru Sigerus, Fronius, Fuss; Heltauer Alpe Dialu Stirpú Fuss; Rodnaer Alpen Wurfu Jetzului, Niegrulilasze Baumgarten, Kuhhorn Schur, Salzer, Fuss, Lurz, Herzog; Szolnoker Alpe Czibles Bielz. — Gesammelt auf der Kerzeschoraer Alpe Butian von M. Fuss.

- 252.** *Thymus comosus* *Heuff.* — *T. transilvanicus* SS. n. 2209. Im Gerölle und in Felsenritzen der Berg- und Voralpenregion; häufig. — Michelsberg Griesebach & Schenk, Fronius, Sigerus, Fuss; Giresau Fronius; Tallmesch Unvericht, Fuss; Portschescht, Rothethurmpass, Zood Fuss; Reschinar Unvericht, Fuss; Gurariului, Orlat, Szászcsor Fuss; Feredő-Gyogy Unvericht; Rodnaer Alpe Kuhhorn, Kronstadt, Tömös Schur. Gesammelt bei Michelsberg von M. Fuss.
- 253.** *Melissa Acinos* *Benth.* — *Thymus* — Bgt. n. 1210. — *Acinos thymoides* SS. n. 2224. — Auf bebautem Boden und Bergplätzen; häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Borszék Salzer; Broos Unvericht; Hammersdorf Sigerus, Fuss, Rekert; Stolzenburg, Grossscheuern, Tallmesch Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.
- 254.** *Ajuga Chamaepitys* *Schreb.* — Bgt. n. 1148. — *Chamaepitys arvensis* SS. n. 2286. — Auf bebautem Boden und Bergplätzen; nicht überall, — liebt Mergel- und Kalkboden. — Leschkirch, Alzen, Untergesesz Baumgarten; Salzburg Baumgarten, Fuss; Giesshübel Sigerus; Grossscheuern, Reussmarkt, Tövis Fuss; Karlsburg Rekert; Thörenburg Erseï, Unvericht; Schässburg Baumgarten, Fronius; Reps, Tepei, Bogärtelke, Bâts Baumgarten; Medwisch Salzer; Felső-Torja, Tartlau (bei Kronstadt) Schur; Udvarhely Szabo; Marktschelken Fuss. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 255.** *Teucrium montanum* *L.* — Bgt. 1154. — SS. n. 2287. — An sonnigen trocknen Bergabhängen; häufig. — Broos Unvericht; Karlsburg Rekert; Thörenburg Baumgarten; M.-Csán Erseï; Kolos, Klausenburg, Tepei Baumgarten; Schässburg Fronius; Kronstadt Baum-

- garten, Fuss; Marktschelken, Grossscheuern, Rothberg Fuss; Tallmesch Sigerus, Unvericht, Fuss; Szászcsor Fuss. Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 256.** *Teucrium Chamaedrys L.* — Bgt. n. 1153. — SS. n. 2288. — Zwischen Gesträuch; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Reen Emerich; Thorenburg, Gerend Ercsei; Broos Unvericht; Hammersdorf Unvericht, Rekert; Neudorf, Resinar, Michelsberg Fuss; Udvarhely Szabo. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.
- 257.** *Lithospermum purpureo-coeruleum L.* — Bgt. n. 235. — SS. n. 1971. — Zwischen Gesträuch an sonnigen Bergabhängen, Weinberghecken; häufig. — Hammersdorf Baumgarten, Sigerus, Fuss; Grossscheuern Fuss; Heltau, Alzen, Schönberg, Mergeln, Birthalm Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Medwisch Salzer; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Szamos-Ujvár Fuss; Thorenburger Comitatus Ercsei; Broos Unvericht; Reussmarkt Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Wepersthal“ von M. Fuss.
- 258.** *Euphrasia micrantha Richb.?* — SS. n. 2156. — Auf den Alpen, oberhalb der Baumregion. — Büdös, Fogarascher Alpen Schur; Kerzeschoraer Alpen im Valiedoamnthal, Frecker Alpen Avriscel, Tschorte Fuss. — Gesammelt auf der Frecker Alpe Tschorte von M. Fuss.
- 259.** *Digitalis grandiflora All.* — SS. n. 2044. — D. ambigua Bgt. n. 1271. — In Wäldern und Gesträuch der Berg- und Voralpenregion: häufig. — Broos Unvericht; Poplaka, Heltau Sigerus; Michelsberg Unvericht; Giötzembruch, Hermannstadt, Neudorf, Rothethurmpass, Giresau, Frecker Alpe Avriscel Fuss; Tallmesch Unvericht; Fogarascher Alpen Schur; Schässburg Fronius; Gerend, Lupsa Ercsei; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Strimbe, Borszék Salzer. — Gesammelt bei Michelsberg von Unvericht.
- 260.** *Plantago lanceolata L.* — Bgt. n. 179. — SS. n. 2348. — An Wegen, auf bergigen Grasplätzen; sehr häufig. — Mühlbach, Hermannstadt, Salzburg, Grossscheuern Fuss; Hammersdorf Rekert, Fuss; Schässburg Fronius; Udvarhely Szabo; Thorenburg Schur, Unvericht; Reen Emerich; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.
- 261.** *Soldanella montana W.* — Bgt. n. 277. — SS. n. 2329. In der Voralpenregion; häufig. — Muntscheler Voralpen Unvericht; Zooder Alpe Präsche Fuss; Giötzembruch Baumgarten, Fuss; Reschinar, Frecker Alpe

- Szuru Baumgarten; Burkatsch Fuss; Kerzeschoraer Voralpen C. Fuss, Lindner; Mirie Fronius; Arpascher Alpen Schur, Fuss; Fogarascher Alpen Göbbel; Uj-Sinka Baumgarten; Szalárder Thal Nagy; Rodnaer Alpe Koronyisch Rekert. — Gesammelt auf der Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“ von M. Fuss.
- 262.** *Swertia perennis* L. (non Bgt.) — Fuss Mant. n. 2611. — SS. n. 1915. — Auf Torfboden; selten. — Borszék Baumgarten, Schur; Salzer, André Fuss; Dregoiaszé Fuss; Klausenburg Schur. — Gesammelt bei Borszék von M. Fuss. — Die Pflanze, welche Bgt. n. 401 aufgeführt wird, ist nicht die Linnéische *S. perennis*, sondern eine neue Art, welche in der Mantissa unter dem Namen *S. alpestris* Bgt. beschrieben wurde.
- 263.** *Fraxinus Ornus* L. — Bgt. n. 82. — *Ornus europaea* SS. n. 1872. — In den Wäldern des südwestlichen Siebenbürgens. — Hunyader Comitatus Sigerus; Limpert Unvericht, Deva, Maros-Némethi, Solymos, Wurfu Kozolya Baumgarten; Karlsburg Rekert; Koppänder Kluft Ercsei; Thorenburger Kluft Baumgarten; Lotriorathal Bielz; Boitza, Rotherthumpass, Gebirgszug Prehodischtie Fuss. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 264.** *Bupleurum rotundifolium* L. — Bgt. n. 517. — SS. n. 1168. — Auf bebautem Boden; nicht selten. — Broos Unvericht; Karlsburg Rekert; Mühlbach Fuss; Hermannstadt Baumgarten; Grossscheuern, Stolzenburg, Reussen Fuss; Leschkirch, Mergeln, Grossschenk, Reps Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Udvarhely Szabo; Neumarkt Baumgarten; Mezöség Ercsei; Reen Emerich; Bistritz Baumgarten, Herzog. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 265.** *Peucedanum longifolium* W. K. — SS. n. 1207. — Auf trocknen Bergabhängen. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert; einziger bis jetzt bekannter Standort.
- 266.** *Peucedanum alsaticum* L. — Bgt. n. 472. — *Pterose-linum*. — SS. n. 1212. — Auf Wiesen der Bergregion; nicht häufig. — Reps Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Mezöség, Kolos Baumgarten; Thorenburg Unvericht; Karlsburg Rekert. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 267.** *Rhamnus catharticus* L. — Bgt. n. 361. — SS. n. 823. Im Gesträuch der Bergregion; sehr häufig. — Broos Unvericht; Urbigen Bock; Hermannstadt Sigerus; Grossscheuern, Neudorf, Hammersdorf, Marktschelken Fuss; BIRTHÄLM, Medwisch Salzer; Mergeln Baum-

garten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Kronstadt Lurz; Felső-Torja, Búdös, Csik, Öcsém, Kereszthegy Schur; Thorenburger Comitat Ercsei; Thorenburger Kluft Baumgarten. — Gesammelt bei Hamersdorf in den Weinberghecken von M. Fuss.

268. *Trifolium badium* Schreb. — SS. n. 692. — Auf den höchsten Alpen; nicht häufig. — Kalkpflanze. — Arpascher Alpen Schur, André; Podritschel Fuss; Kerzschoraer Alpe Stiavu verosz im Fundu Valiedoamni Fuss. — Gesammelt auf der Kerzschoraer Alpe Stiavu veross von M. Fuss. — Nach meiner Ueberzeugung gehört Baumgarten's *T. spadiceum* hieher, nur kann ich nicht sagen, dass dieselbe „in partis montanis alpinis que vulgatissime sei. In „pratis montanis“ kömmt sie wohl gar nicht vor, sondern ist wahre Hochalpenpflanze; aber auch hier ist, — was auch die wenigen angeführten Standorte bezeichnen — von „vulgatissime“ keine Rede. — Auch gegen den Passus seiner Beschreibung „caule ... repente radicanteque“ muss ich Protest erheben; die „caules“ sind wohl häufig „basi procumbentes“ aber von Kriechen und Wurzeltreiben ist keine Rede; *T. spadiceum* wäre also noch aus Siebenbürgen nachzuweisen.
269. *Vicia grandiflora* Scop. — SS. n. 777. — *V. sordida* Bgt. n. 1508. — Auf Wiesen; häufig im südwestlichen Landestheile. — Mezöség Baumgarten; Broos Unvericht; Benzénz Fuss; Karlsbug Rekert. — Gesammelt bei Karlsburg auf der „Bischofswiese“ von Rekert.
- 270 *Lathyrus sativus* L. — Bgt. n. 1492. — SS. n. 792. — Auf bebautem Boden; hin und wieder angebaut; vix spontaneus! — Gross-Enyed Baumgarten; Dedács Unvericht; Karlsburg Rekert; Grossscheuern Fuss. Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
271. *Lathyrus Nissolia* L. — Bgt. n. 1491. — SS. n. 791. — Auf bebautem Boden, vorzüglich auf Haferfeldern; häufig. — Broos Unvericht; Karlsburg Rekert; Hermannstadt Sigerus, Fuss; Grossscheuern, Michelsberg; Zood, Giresau Fuss; Leschkirch, Reps, Seiburg, Fogarasch Baumgarten; Udvarhely Szabo; Klausenburg Baumgarten; Reen Emerich. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
272. *Orobus albus* L. f. — SS. n. 813. — *O. tenuifolius* Bgt. n. 1485. — Auf Bergwiesen. — Karlsburg Rekert; Thorenburg Baumgarten, Unvericht; Klausenburg Schur; Mergeln, Reps, Lövéte, Retjesat, Omu, Lapadna, Rotunda Baumgarten. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.

- 273.** *Hedysarum obscurum* L. Bgt. n. 1556. — SS. n. 753. — An Felsen der Hochalpen; Kalkpflanze. — Arpascher Alpen Schur; Podritschel Fuss; Törzburger Alpe Butschetsch Baumgarten, Fuss; Rodnaer Alpen Wurfu Jetzului, Dscheammeanie Baumgarten; Koronyisch Schur. — Gesammelt auf der Törzburger Alpe Butschetsch „Galbinare“ von M. Fuss.
- 274.** *Chrysosplenium alternifolium* L. — Bgt. n. 274. — SS. n. 1128 — An feuchten Stellen der Wälder in der Berg- und Voralpenregion; sehr häufig. — Broos Unvericht; Michelsberg Sigerus, Fuss; Giötzembruch, Zooder Alpe Präsche, Giresau, Oberschebesch Fuss; Kronstadt Lurz; Medwisch Salzer; Schässburg Baumgarten, Fronius; Thorenburg, Vécs Ercsei; Görényer Glashütte Emerich; Bistritz Herzog; Borszék Salzer. — Gesammelt bei Giresau in der „Hill“ von M. Fuss.
- 275.** *Lepigonum marinum* Walbg.? — *L. marginatum* SS. n. 549. — *Arenaria* — Bgt. n. 838. — Auf Salzboden; sehr häufig. — Salzburg Baumgarten, Sigerus, Fuss; Paráđ Baumgarten, Fronius, Fuss; Klausenburg, Kolos Baumgarten; Szamosfalva Bielz; Thorenburg Ercsei, Unvericht; Reps, Jánosfalva, Homorod-Szt.-Pál, Homorod-Szt.-Péter Baumgarten. Gesammelt bei Thorenburg von Unvericht. — Ich wage kein decisives Urtheil über die Pflanze; und habe daher den Namen Baumgarten's beibehalten, denn seine *Arenaria marina* ist gewiss *Lepigonum marinum* Whlb. = *L. marginatum* DC. Dafür sprechen die „folia semicylindrica“, der „calyx capsula dimidio brevior“, und die „semina marginata“ und das Synonym *Arenaria marginata* DC. — Andererseits stört aber wieder die Angabe: „petalis e purpureo-sanguineis“ — was nach Rch b. zu *L. medium* gehören würde, da er dem *L. marginatum* „petala alba“ zuschreibt.

Wenn ich nach der vorliegenden Pflanze mein Urtheil abgeben soll, so glaube ich, dass wir *Lepigonum medium* Whlb. und nicht *L. marginatum* Whlb. vor uns haben, denn

1. sehe ich die „semina“ nicht „scariosa circumalata“ sondern „aptera“ —
2. sind die Petala unserer Pflanze nicht alba sondern roth —
3. ist die „capsula“ zwar länger als der „calyx“, aber bei weitem nicht, wie Rch b. beschreibt: „Capsula maxima *Arenaria macrocarpae*“.

Doceant viri docti!

- 276.** *Chenopodium Botrys L.* — Bgt. n. 429. — SS. n. 2391. — Auf Schutt und bebautem Boden; häufig. — Broos Unvericht; Hermannstadt Sigerus; Grossscheuern, Hammersdorf, Giresau Fuss; Kineen in der Walachei Fuss; Szombat Sigerus; Schässburg, Oláhfalú Fronius; Thorenburger Comitat Ercsei; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Broos von Unvericht.
- 277.** *Potentilla supina L.* Bgt. n. 994. — SS. n. 898. — Auf sumpfigen Wiesen, in Strassengraben und Lacken; nicht selten. — Broos Unvericht; Karlsburg Rekert; Schellenberg Sigerus; Hermannstadt, Neudorf, Giresau Fuss; Naszod, Bistritz Sigerus. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 278.** *Potentilla opaca L.* — Bgt. n. 1002. — SS. n. 919. — Auf trocken, sonnigen Bergplätzen; sehr häufig. — Broos Unvericht; Hermannstadt Reissenberger, Fuss, Rekert; Grossscheuern André, Fuss; Neudorf, Rothberg, Duermen, Hammersdorf, Michelsberg, Giresau Fuss; Medwisch Salzer; Schässburg Baumgarten, Fronius; Reys, Kronstadt Baumgarten; Klausenburg Schur; Bistritz Herzog; Rodna Schur. Gesammelt bei Hermannstadt von Rekert.
- 279.** *Circaea alpina L.* — Bgt. n. 76. — SS. n. 1002. — Auf feuchten Stellen der Voralpen und Alpen; nicht selten. — Muntscheler Alpen Unvericht; Rothenthurmpass Sigerus; Zooder Alpe Präschbe Fuss; Frecker Alpe Szuru Baumgarten; Spatia Tatarului, Kerzeschoraer Alpe Butian Fuss; Arpascher und Fogarascher Alpen Schur; Kronstädter Alpe Schulergebirge Baumgarten; Tusnád, Búdös Schur; Lövéte, Hargitta Baumgarten; Balaner Alpe Öcsém Schur; Borszék Salzer; Rodnaer Alpen Baumgarten; Szalárdér Thal Nagy. Gesammelt auf der Zooder Alpe Präschbe von M. Fuss.
- 280.** *Peplis Portula L.* — Bgt. n. 587. — SS. n. 1020. — Auf überschwemmtem Boden. — Broos Unvericht; Hermannstadt, Gurariului Fuss; Salzburg Baumgarten, Sigerus Fuss; Freck, Lövéte, Barot Baumgarten; Thorenburg Baumgarten, Ercsei; Klausenburg Szt.-Gothárd, Pujon Janka. — Gesammelt bei Salzburg von M. Fuss.
- 281.** *Polygala amara L.?* — Bgt. n. 1462. — SS. n. 387. — Auf Bergwiesen bis in die Alpen. — Broos Unvericht; Hermannstadt Fuss; Tallmesch Unvericht; Medwisch Salzer; Kronstadt Sigerus; Törzburger Alpe Butschetsch Fuss; Zernester Alpe Königstein Kotschy; Drogu Baumgarten; Balaner Alpe Öcsém Schur;

- Rodnaer Alpe Koronyisch Schur, Rekert, Baumgarten; Piatra Arsze Bielz; Thorenburg Ercsei. — Gesammelt bei Hermannstadt am „Schiewes“ von M. Fuss.
- 282.** *Prunus Chamaecerasus Jacq.* — *Cerasus* — SS. n. 854. — *Cerasus pumila* Bgt. n. 939. — Am Rande der Weinberge; stellenweise häufig. — Broos Unvericht; Hammersdorf Sigerus, Unvericht, Fuss; Grossscheuern, Neudorf, Rothberg Fuss; Schässburg Baumgarten, Fronius; Nagy-Bun, Reps Baumgarten; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss.
- 283.** *Bunias orientalis L.* — Bgt. n. 1290. — *Laelia* — SS. n. 332. — Auf schattigen Grasplätzen; häufig. — Broos Unvericht; Hermannstadt Baumgarten; Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf Fuss; Burgberg, Alzen Baumgarten; Mergeln Fuss; Medwisch Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Denddorf, Dunesdorf, Kreisch, Gross-Alisch, Pruden, Kronstadt Baumgarten; Bistritz Baumgarten, Herzog; Klausenburg Baumgarten; Thoroczko, Thorenburg Ercsei. — Gesammelt bei Grossscheuern „bei der Mühle“ von M. Fuss.
- 284.** *Cardamine pratensis L.* — Bgt. n. 1399. — SS. n. 209. — Auf sumpfigen Wiesen; gemein. — Broos Unvericht; Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf, Giresau Fuss; Schässburg Fronius; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Klausenburg Janka. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Fleischerwiese“ von M. Fuss. — Die Pflanze ist entschieden die *C. pratensis* der Siebenbürger Autoren; ob aber auch die Pflanze Deutschlands muss ich sehr zweifeln; denn Koch sagt „fiores lilacini, raro albi“ und Reichenbach „fiores magni, persicini, albidopallentes“. Die Farbe unsrer Pflanze ist aber rein weiss, und man kann 10,000 Exemplare in die Hand nehmen, bis man eines findet, welches unten einen sehr blass-rosenrothen Schimmer hat. Auch die var. *γ. Hayneana Welw.* bei Richb. kann unsere Pflanze nicht sein, denn diese soll sich von der Stammform durch „floribus minoribus albis“ unterscheiden; unsere Pflanze ist nicht im geringsten klein-, sondern gerade ausgezeichnet grossblüthig. — *Docent viri docti!*
- 285.** *Erysimum perfoliatum Crtz.* — *E. austriacum* Bgt. n. 1371. p. p. — *Conringia orientalis* SS. n. 232. — Auf bebautem Boden; nicht häufig. — Broos Unvericht; Karlsburg Rekert; Reussmarkt, Stolzenburg Fuss; Grossscheuern Schur, Fuss. — Gesammelt bei Karls-

burg von Rekert. — Da Bgt. *E. perfoliatum* und *E. austriacum* nicht unterschieden hat, so müssen seine Standorte aufs Neue konstatiert werden. — Ich kann jedoch nicht verschweigen, dass es mir auch bei dieser, wie bei vielen anderen unserer Pflanzen geht; die Diagnosen wollen nicht recht passen.

286. *Corydalis pumila* *Rehb.* — SS. n. 160. — Zwischen Gesträuch. — Einziger bis noch bekannter Standort, Hermannstadt auf der Brukenthal'schen Wiese; gesammelt von M. Fuss. — *Soliola incisa* dicit Koch; saepe numero — ut videra est in planta nostra — integra, immo integerrima sunt.
287. *Viola alpina* *L.* — Bgt. n. 383. — SS. n. 375. — Auf den Hochalpen auf Kalk; nicht selten. — Frecker Alpe Szuru Baumgarten; Tschorte Fuss; Kerzeschoraer Alpen Fundu Valie Doamni, Fundu Bulli Fuss; Butian, Arpascher Alpen, Fogarascher Alpen Schur; Pisku Lauti, Wurfu Lutzului, Burzenländer Alpe Piatra mare Baumgarten; Csukás Kotschy; Törzburger Alpe Butschetsch Baumgarten, Kotschy, Salzer, Fronius, Fuss; Zernester Alpe Königstein Kotschy; Kronstädter Alpe Schulergebirge Fronius; Balaner Alpe Öcsém Schur; Rodnaer Alpe Dscheammeanie Szolnoker Alpe Arszu, Czibles Baumgarten; Thorenburger Alpen Ercsei. — Gesammelt auf der Kerzeschoraer Alpe Fundu Valie Doamni von M. Fuss.
288. *Helianthemum vineale* *Pers.* — Bgt. n. 1029. — SS. n. 341. — Auf Steingerölle in den Voralpen und Alpen; nicht selten. — Tallmesch Unvericht, Fuss; Hermannstädter Alpen Pliesche, Szuru, Foti (?), Strunga Drakului, Fogarascher Alpe Pisku Lauti, Kronstadt, Burzenländer Alpen Schulergebirge, Piatra mare, Piroshka, Butschetsch, Piatra Laptie, Bistritzer Alpe Pietrossu Baumgarten. Gesammelt bei Tallmesch oberhalb der Weingärten von M. Fuss.
289. *Thalictrum flexuosum* *Brnh.* — SS. n. 13. — Auf sonnigen, trocknen Bergplätzen; nicht selten. — Broos Unvericht; Mühlbach Fuss; Hermannstadt Schur; Grossscheuern, Neudorf Fuss; Hammersdorf Griesebach et Schenk, André, Rekert; Kronstadt, Keckekö, Billak, Thorenburg, Mezöség Schur; Klausenburg André, Schur. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.
290. *Pulsatilla vulgaris* *Mill.* — Bgt. n. 1075. — SS. n. 35. — An sonnigen Bergabhängen; gemein. — Hermannstadt Reissenberger; Hammersdorf Grossscheuern, Du-

- men, Rothberg, Tallmesch Fuss; Mergeln, BIRTHÄLM Baumgarten; Medwisch Salzer; Schässburg Fronius; Reps, Kronstadt Baumgarten; Udvarhely Szabo; Reen Emerich; Klausenburg Schur; Mezöség Janka. — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss. — Wenn die Abbildung im Reichenbach richtig ist, kann unsre Pflanze nicht *P. vulgaris* sein.
- 291.** *Euphorbia Gerardiana Jacq.* — Bgt. n. 915. — SS. n. 2501. — Auf trocknen Bergabhängen; nicht gemein. — Hammersdorf Sigerus; Marktschelken, Bulkesch Fuss; Blasendorf, Kokelburg Baumgarten. — Gesammelt bei Marktschelken von M. Fuss.
- 292.** *Acer tataricum L.* — SS. n. 601. — *A. cordifolium* Bgt. n. 697. — In Wäldern; nicht gemein. — Broos Unverricht; Karlsburg Rekert; Giesshübel Sigerus; Salzburg Sigerus, Fuss; BIRTHÄLM, Medwisch Salzer; Schässburg, Bachnen Baumgarten; Thorenburg Ercsei. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
- 293.** *Malva silvestris L.* — Bgt. n. 1436. — SS. n. 577. — Auf Schutt, Misthaufen, an Zäunen; überall. — Broos Unverricht; Neudorf, Grossscheuern, Giresau Fuss; Schässburg Fronius; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Thorenburger Comitat Ercsei. — Gesammelt bei Giresau von M. Fuss.
- 294.** *Geranium phaeum L.* — Bgt. n. 1415. — SS. n. 605. — Unter Gesträuch und in Wäldern der Berg- und Voralpenregion; gemein. — Broos Unverricht; Heltau Sigerus; Giötzembrich, Giresau, Grossscheuern Fuss; Medwisch Salzer; Schässburg Baumgarten, Fronius; Reps Baumgarten; Zerneschter Alpe Königstein Kotschy; Kronstadt Fuss; Udvarhely Szabo; Reen Emerich; Bistritz Herzog; Thorenburg Ercsei. — Gesammelt auf der Michelsberger Voralpe Giötzembrich von M. Fuss.
- 295.** *Oxalis Acetosella L.* — Bgt. n. 862. — SS. n. 627. — Zwischen Gesträuch in der Berg- und Voralpenregion. — Hermannstadt, Grossscheuern, Giötzembrich, Giresau, Oberschebesch Fuss; Medwisch Salzer; Schässburg Fronius; Görgenyer Glashütte Emerich; Bistritz Herzog; Borszék Salzer. — Gesammelt bei Giresau in der „Hill“ von M. Fuss.
- 296.** *Cherleria sedoides L.* — Bgt. n. 850. — SS. n. 484. — Auf den Triften der Hochalpen. — Arpascher Alpen Schur; Fogarascher Alpen Schur, Kladni; Skerischora Kotschy; Törzburger Alpe Butschetsch Salzer, André, Fronius, Fuss; schwarze Bistritzthal Er-

csei. — Gesammelt auf der Törzburger Alpe Butschetsch von M. Fuss.

297. *Vaccaria pyramidata* *Rchb.* — Bgt. n. 782. — SS. n. 429. — Auf bebautem Boden. — Karlsburg Rekert; Billak Schur; Thorenburg Bielz; Felső-Váradja Janka; Reps, Also-Rákos Baumgarten; Petersberg (bei Kronstadt) Schur. — Gesammelt bei Karlsburg von Rekert.
298. *Evonymus verrucosus* *Scop.* — Bgt. n. 368. — SS. n. 821. — Im Gesträuch der Bergregion; sehr häufig. — Broos Unvericht; Hammersdorf Baumgarten, Sigerus, Fuss; Neudorf Fuss; Rothberg Baumgarten, Fuss; Duermen Baumgarten; Grossscheuern, Tallmesch Fuss; Falkenstein bei Riuzadului Fuss; Mergeln Baumgarten; Medwisch Salzer; Schässburg Baumgarten, Fronius, Fuss; Reps Fuss; Tepei, Ürmös-Tepei Baumgarten; Kronstadt Baumgarten, Fuss, Lurz; Felső-Torja, Kereszthey, Öcsém Schur; Bistritz Baumgarten, Herzog; Szt.-Iván, Mike, Szt.-László Ercesei; Kecskö Schur. — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss.
299. *Tilia parvifolia* *Ehrh.* — Bgt. n. 1035. — SS. n. 583. — In den Wäldern der Bergregion; häufig. — Broos Unvericht; Hermannstadt Reissenberger, Fuss; Grossscheuern, Neudorf, Giresau Tallmesch Fuss; Medwisch Salzer; Schässburg Fronius; Fogarascher Voralpen Schur; Kronstadt Lurz; Felső-Torja, Büdös, Kereszthey Schur; Kásva Emerich; Bistritz Herzog; Nagy-Kapus, Gyerő-Vásárhely (im Klausenburger Comitát) Bielz; Kecskö Schur. — Gesammelt bei Hermannstadt von M. Fuss.
300. *Linum tenuifolium* *L.* — Bgt. n. 579. — SS. n. 563. — An trocknen, sonnigen Berglehnen. — Broos Unvericht; Mühlbach, Grossscheuern, Neudorf Fuss; Stolzenburg Baumgarten, Lerchenfeld; Mergeln Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Szt.-Domokos, Balaner Alpe Öcsém, Klausenburger Schur; Bánffy-Hunyad Baumgarten; Thorenburger Kluff, Billak Schur. — Gesammelt bei Neudorf am „Beachelsrech“ von M. Fuss.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transsilvanieum. 117-127](#)