



Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Tirol

Herausgegeben von der Tiroler Vogelwarte, Innsbruck

Nr. 2/1984

ausgegeben September 1986

Zur Vogelwelt im geplanten Osttiroler Anteil des
Nationalparks Hohe Tauern

Cees Mesker & Franz Goller

Waehrend im Lienzer Talboden in diesem Jahrhundert
regelmaessig ornithologische Beobachtungen gemacht wurden
(z B. DALLA TORRE & ANZINGER 1896/97, KUEHTREIBER 1952,
HEINRICHER 1973), muessen die Taeler Osttirols als
avifaunistisch schlecht durchforscht gelten Gerade im
Hochgebirgsbereich, also auch im geplanten Osttiroler
Anteil des Nationalparks Hohe Tauern, fehlen konkrete Daten
weitgehend. Erste Mitteilungen und Hinweise zum Vogelzug
sind sehr vielversprechend (DATHE 1944, HEINRICHER &
NIEDERWOLFSGRUBER 1981 Ringfunde in GOLLER & GSTADER 1983)
Es soll daher mit einer ersten Mitteilung unserer
Beobachtungen aus diesem Bereich ein kleiner Beitrag zur
Faunistik Osttirols geleistet werden. Gleichzeitig soll
diese Dokumentation Ansatzpunkte zur weiteren Erforschung
der Vogelwelt, deren Oekologie und Indikatorfunktion im
geplanten Nationalparkgebiet liefern. Beobachtet wurde seit
1977 waehrend ueber das Jahr verteilter Aufenthalte vor
allem im Virgental mit Seitentaelern, weiters im Matreier
Tauerntal und im Kalser Dorfertal Einige von diesen
Beobachtungen wurden in hollaendisch publiziert, auch diese
Daten werden hier angefuehrt (MESKER & PREESMAN 1983 und
1985)

Spezieller Teil

Stockente (*Anas platyrhynchos*)
29.3.83 bei Matri, 7 6 83 bei Virgen (Gries), 14.2.84 bei
Hinterbichl jeweils ein Paar; eine Brut im Virgental scheint
wahrscheinlich und ist aus der Sicht der Vertikalverbreitung
interessant.

Sperber (*Accipiter nisus*)

30.6.81 Gradenhof; 14.11.81, 15.6.82 und 22.2.84 an verschiedenen Stellen in Bobojach; 8.6.84 1 Ex. oberhalb von Bichl.

Habicht (*Accipiter gentilis*)

6.6.79 Maurertal; 4.11.81 Niedermauern; 1.4.83 Bergeralm; 25.3.82 und 24.2.84 bei Bobojach.

Mausebussard (*Buteo buteo*)

1.2.79 2 Ex. bei Mitteldorf balzend; 3.11.81 Zedlacher Paradies; 28.3.82 Berg; 4.4.83 Wallhorn; 1.8.82 und 24.2.84 2 Ex. nahe Bobojach; 8.6.84 2 Ex. in den Sajat Maehdern.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Regelmaessig oberhalb Bobojach beobachtet; 10.6.79 und 3.11.81 Maurertal; regelmaessig auch im Umbaltal festgestellt; 30.3.82 bei Mitteldorf; 6.6.83 Raineralm; 12.6.83 Virgen; 13.6.83 Innergschloess 2 Ex.; 24.2.84 Nilljochhuetten 1 Paar; 13. und 20.7.83 Kalser Dorfertal 2 Ex.; HEINRICHER (1973) schaezt etwa 3 Brutpaare fuer Osttirol, diese Zahl duerfte allein im behandelten Gebiet erreicht werden.

Gaensegeier (*Gyps fulvus*)

Juli 1980 1 Ex. im Kalser Dorfertal.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Die Beobachtungen vom 6.6.79 und 1.8.82 lassen auf ein Brutvorkommen im Virgental schliessen (Praegratner Dorfertal und Stoanalm).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Regelmaessig im Maurer- und im Umbaltal beobachtet; im Juli 83 im Kalser Dorfertal mindestens 2 Paare; 8.6.84 1 Ex. ueber den Sajat Maehdern.

Alpensneehuhn (*Lagopus mutus*)

8.6.83 Wallhorn Maehder 4 Ex. in 2500 m; 30.7.80 Praegratner Dorfertal (Johannishuetten) 15 Ex., darunter Jungvoegel.

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

29.5.83 Wallhorn 1 Weibchen.

Steinhuhn (*Alectoris graeca*)

8.6.84 Sajatmaehder 1 Paar (1700 m)

Flussuferlaeufer (*Actitis hypoleucos*)

1.8.82 1 Ex. an der Isel bei Bobojach; 3.8.82 bei Niedermauern; 1.6.83 am Spielplatz bei Mitteldorf; 7.6.83 und Fruehjahr 84 jeweils 1 Paar bei Niedermauern (1200 m) brutverdaechtig.

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

4.11.81 bei Niedermauern 1 Ex.

Hohltaube (*Columba oenas*)

3.11.81 bei Obermauern (1200 m) 1 Ex.; 29.9.80 Bobojach 1 Ex. Diese beiden Beobachtungen stellen die neuesten Nachweise dieser Art aus Osttirol dar (vgl. HEINRICHER 1973). Vor allem die spaete Herbstbeobachtung in dieser Hoeohenlage ist bemerkenswert (GLUTZ v. BLOTZHEIM & BAUER 1980)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

1.8.82 und 31.5.83 bis 4 Ex. bei Obermauern; 10.7.83 2 Ex. bei Kalser Tauernhaus.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

29.5.83 2 Ex. bei Matrei.

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 8.6.83 Gries; 9.6.83 Wallhorn Maehder (ueber 2000 m); 13.6.83 Innergschloess; 13.7.82 1 Ex. auf Nestsuche bei Pebell Alm; 11.7.83 Umbaltal 1 Weibchen der braunen Phase; 13.7.83 1 Ex. Kalser Dorfertal; 8.6.84 1 Ex. oberhalb Bichl.

Uhu (*Bubo bubo*)

3.3.82 bei Stroeden (1450 m) rufend.

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

8.8.77 1 Ex. rufend bei Niedermauern.

Mauersegler (*Apus apus*)

Regelmaessig in Siedlungen beobachtet, haeufig fliegen Mauersegler auch in Gipfelbereiche.

Alpensegler (*Apus melba*)

3.8.82 und 14.6.83 bei Bobojach; 15.6.83 ueber den Sajat Maehdern fliegend; 5.8.82 Stoanalm; im Umbaltal im Mai und Juli 1-2 Paare an derselben Felswand beobachtet (1982 und 83); 13. und 20 7 83 5 Ex. in der Dabaklamm bei Kals mehrfach Spalten anfliegend (1650 m), es duerfte sich hier um einen regelmaessig besetzten Brutplatz handeln (vgl. HUBER & MEIER 1960).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

30.12.78 Wald oberhalb Bobojach.

Gruenspecht (*Picus viridis*)

April 76 2 Ex. an Bruthoehle bei Bobojach; 4.3.82 Stein; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 1.6.83 Mitteldorf; 15.6.83 1 Maennchen bei Bichl.

Grauspecht (*Picus canus*)

4.3.83 1 Ex. in 1400 m bei Bobojach rufend; 12.7.82 oberhalb Lucknerhaus 1 Ex.; 18.5.83 und 11.7.83 im Umbaltal in 1500 m; 8.6.84 1 Ex. oberhalb Bichl (1650 m).

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

3.11.82 Zedlach; 3.8.82 Stein; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 9.6.83 Welzelach.

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

2.7.83 Stockachalm; 25.7.80 Praegraten Schattseite diesj. Ex.

Wendehals (*Jynx torquilla*)

28.5.83 Bodenalm 2 Ex. rufend; 29.5.83 Wald Bobojach; fuer die Vertikalverbreitung duerfte Aehnliches gelten wie im Tiroler Gailtal (vgl. GOLLER 1984). HEINRICHER (1973) erwaehnt diese Art im Iseltal nur bis Huben.

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 28.5.83 Matrei Singflug; 8.6.83 Gries; 13.8.83 Innergschloess (1700 m); 8.6.84 bei Mitteldorf 1 futtertragendes Ex., bei Obermauern singend. An den trockenen Suedhaengen fehlt diese Art offenbar.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

In allen Doerfern verbreitet; 13.7.82 bei Stroeden (1500 m) kaum fluegge Jungvoegel; 1.8.82 Jungvoegel im Nest in Bobojach.

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

Juni 81 und 83 1 beflogenes Nest, 1.8.82 5 Ex. bei Strassentunnel Bobojach; 13.6.83 Pebell Alm; 16.7.81 Umbaltal 2 Ex.; 15.6.83 und 8.6.84 2 Ex. ueber den Sajat Maehdern; 13. und 20.7.83 mindestens 3 beflogene Nester in der Dabaklamm.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

In allen Siedlungen verbreitet, jedoch sollte auf die Hoehenverbreitung geachtet werden. Juni 1980 mindestens 10 Nester in Bobojach; 16.7.81 mehrere Nester in Berg; 29.8.82 Jungvoegel bei Stein; 13.6.83 Innergschloess.

In den Ostalpen kaum bekannt sind Felsenkolonien der Mehlschwalbe. Im Umbaltal in ca. 1700 m besteht seit mindestens 10 Jahren (RETTNER, muendlich) eine Kolonie, die in den Jahren 1980-83 aus ca. 50 Ex. bestand. Anfang Juli bauten die Tiere noch an ihren halbfertigen Nestern in ueberhaengenden Felshoehlen, jedoch brachen die Nester zum Teil von der nassen Felswand wieder herab.

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

An sonnseitigen Waldraendern im Virgental allgemein verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 6 Ex.; Juli 1981, 82 und 83 2 Ex. im Umbaltal; 13. und 20.7.83 2 Ex. im Kalser Dorfertal.

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

Regelmaessig in den Bergmaehdern bis ueber 2200 m verbreitet;
12.7.82 unterhalb der Glorerhuette 2 Ex. futtertragend.

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Im Siedlungsbereich allgemein verbreitet; 16.7.81 1 Ex.
futtertragend im Umbaltal (Pebell Alm); 13.7.83 1 Ex. am
Kalser Tauernhaus (1650 m); 8.6.84 1 Ex. auf den Sajat
Maehdern (1700 m).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

An den Gewaessern allgemein verbreitet; Junvoegel am
9.6.83 bei Gries.

Schafstelze (*Motacilla flava*)

8.6.83 an der Isel bei Gries.

Neuntoeter (*Lanius collurio*)

1.8.82 bei Bobojach mehrere Jungvoegel von Weibchen
gefuettert; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 5 Paare;
30.5.83 im Umbaltal in 1900 m; 6.6.83 Mullitztal 4 Ex. mit
Jungvoegeln.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Brutvogel vom Talbereich bis in die Gruenerlenregion (ca.
2100 m), Umbaltal, Dorfertal, Luckner Haus, Tauerntal.

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

6.6.79 Maurertal (2000 m); 2.1.83 Stein bei Scheune (1400 m);
8.6.83 Wallhorn Maehder 5 Ex.; 1.8.83 Jungvoegel bei der
Johannishuette; 13.7.82 futtertragend bei der Clarahuette;
12.7.82 singend bei der Glorerhuette; 19.9.82
Hochschoberhuette.

Sumpfrohrsaeuger (*Acrocephalus palustris*)

28.5.83 und 8.6.84 bei Matrei 2 Ex. singend.

Gelbspoetter (*Hippolais icterina*)

29.8.82 1 Ex. bei
Obermauern (1400 m); 28.5.83 und 8.6.84 1 Ex. bei Matrei
singend.

Dorngrasmuecke (*Sylvia communis*)

26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 27.5.83 bei
Bobojach; 8.6.83 bei Welzelach.

Gartengrasmuecke (*Sylvia borin*)

26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 9.6.83 Gries;
19.5.83 Pebell Alm; 13.7.82 Umbaltal in der Gruenerlenregion
(1900 m) 1 singendes Ex.

Moenchsgrasmuecke (*Sylvia atricapilla*)

Allgemein verbreitet, im Umbaltal mehrfach in der
Gruenerlenregion bis ueber 2000 m.

Klappergrasmuecke (*Sylvia curruca*)

Bis zur Baumgrenze und in der Krummholzregion verbreitet;
26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 5 singende Ex.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

1980 und 1981 Ende Mai bei Matrei und Virgen 1 singendes Ex.;
2.8.83 1 Ex. bei Bobojach.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Bis zur Baumgrenze regelmaessig verbreitet; 26.5.83 zwischen
Bobojach und Rabenstein 13 singende Ex.; 6.6.83 Mullitztal 6
Ex.

Waldlaubsaenger (*Phylloscopus sibilatrix*)

26.5.83 1 Ex. bei Obermauern (1300 m)

Berglaubsaenger (*Phylloscopus bonelli*)

26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 10 Ex.; 30.5.83
Stroeden 1 Ex.; 15.6.83 und 8.6.84 oberhalb Bichl 3 Ex.
singend (1650 m); Juli 1982 und 83 im Umbaltal bis 1700 m.

Wintergoldhaehnchen (*Regulus regulus*)

4.11.83 3 Ex. bei Gries; 30.5.83 Pebell Alm; 13.6.83 Nest
in Fichte in Innergschloess.

Sommergoldhaehnchen (*Regulus ignicapillus*)

29.8.82 Obermauern; beide *Regulus*-Arten duerften im
Virgental nur in geringer Dichte vertreten sein, da lichte
Laerchenwaelder vorherrschen.

Grauschnaepper (*Muscicapa striata*)

1.8.82 Praegraten
Sonnseite; 25. und 27.5.83 Bobojach; 6.6.83 Mullitztal;
8.6.83 Welzelach; 14.6.83 Praegraten (an der Isel) 2 Ex.;
8.6.84 mindestens 2 Paare im Laerchenwald oberhalb Bichl
(1650 m)

Trauerschnaepper (*Ficedula hypoleuca*)

29.8.82 1 Ex. bei Bobojach.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

27.5.83 1 Paar bei Matrei; 13.5.83 Umbaltal (1700 m); 9.6.83
Welzelach (Jungvoegel); 8.6.83 Gries; 12.6.83 Praegraten;
14.6.83 Bichl; 13.6.83 4 Ex. in Innergschloess.

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

28.7.80 1 Ex. bei Praegraten an der Isel.

Steinroetel (*Monticola saxatilis*)

15.6. und 17.6.83 in ca. 1700 m ein Paar Junge fuetternd in
den Sajat Maehdern, im Juni 1984 ebendort festgestellt.

Steinschmaetzer (*Oenanthe oenanthe*)

8.6.83 Wallhorn Maehder 4 Ex. 2300 m; 13.8.83

Innergsgschloess; 15.6.83 Sajat Maehder 5 Ex. mit Jungvoegeln; ebendort am 8.6.84 mindestens 10 Paare, 1 Weibchen mit Polsterungsmaterial zu Nest fliegend; im Maurertal und Umbaltal ebenso regelmaessig beobachtet; 12.7.82 2 Ex. in Kals auf einer Maehwiese; unterhalb der Glorerhuette 1 heftig warnendes Ex.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)
Alljaehrlich in Bobojach im Juni Nestlinge, bereits am 28.3.82 1 Ex. in Bobojach; in allen Siedlungen und ebenfalls in Blockhalden und Bergwiesen oberhalb der Baumgrenze bruetend; bis 2500 m bei der Hochschoberhuette; 8.6.84 Nestlinge in der Dabaklamm; 13.7.83 Altvoegel fuettern am Kalser Tauernhaus; 11.7.83 bei Clarahuette kaum fluegge Jungvoegel, mindestens 5 Paare im Umbaltal.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)
8.6.83 Welzelach.

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)
Bis in die Krummholzregion verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 11 singende Ex.

Amsel (*Turdus merula*)
4.11.81 Niedermauern; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 10 Ex.; 2.6.83 Gries; 13.6.83 Innergsgschloess 2 Ex.; 24.2.84 im Dorf Bobojach; 16.7.81 Pebell Alm; 13.7.82 Umbaltal 1 Paar in 1700 m; 8.6.84 bei Matrei 3 singende Ex., bei Virgen 2 Ex., bei Bichl in Siedlung und oberhalb in Laerchenwald (1650 m)

Ringamsel (*Turdus torquatus*)
10.6.79 Jungvoegel in Bobojach; bis an die Baumgrenze verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 3 Ex.; 10.6.79 Wallhorn Maehder 10 Ex.; 20.7.83 Kalser Dorfertal futtertragend.

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)
25.3.82 Bobojach; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 3 Ex.; 27.5.83 bei Bobojach Jungvoegel; 30.5.83 Pebell Alm 1500 m; 6.6.83 Mullitztal; 13.6.83 Innergsgschloess; 13.7.83 Kalser Dorfertal 4 Ex. in 1760 m; 8.6.84 im Laerchenwald oberhalb von Bichl (1600-1700 m) mindestens 10 Paare, zum Teil futtertragend; 8.6.84 bei Matrei futtertragend.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)
8.11.81 hunderte Ex. bei Matrei und Obermauern.

Singdrossel (*Turdus philomelos*)
In den Waldgebieten regelmaessig, aber im Virgental wohl nur in geringer Dichte verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 2 Ex.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 2 Ex.;
27.5.83 bei Bobojach Jungvoegel; 11.7.83 Umbaltal 2 diesj.
Ex.; 13.7.82 Umbaltal 1 futtertragendes Ex.

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

3.11.81 ca. 10 Ex. bei Zedlach; 25.3.82 Wald bei Bobojach;
30.7.82 an der Isel bei Bobojach; 26.5.83 zwischen Bobojach
und Rabenstein 4 Ex.; 1.6.83 Jungvoegel bei Mitteldorf;
8.6.84 1 Paar im Laerchenwald oberhalb von Bichl (1650 m)

Tannenmeise (*Parus ater*)

Haeufigste Meisenart; 26.5.83 zwischen Bobojach und
Rabenstein 17 Ex.

Kohlmeise (*Parus major*)

Im Siedlungsbereich allgemein verbreitet, in lichten
Laerchenwaeldern bis 1650 m festgestellt; 26.5.83 zwischen
Bobojach und Rabenstein 5 Ex.; 13.7.82 diesj. Ex. bei
Praegraten; 16.7.81 kaum fluegge Jungvoegel in Berg.

Weidenmeise (*Parus montanus*)

Allgemein verbreitet; 6.6.83 Jungvoegel im Mullitztal;
26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 2 Ex.

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

4.11.81 bei Niedermauern.

Kleiber (*Sitta europaea*)

3.11.81 Zedlacher Paradies; 29.8.82 Obermauern (1500 m);
30.7.82 Bobojach Sonnseite.

Mauerlaeufer (*Tichodroma muraria*)

6.6.79 Maurertal (1700 m); 29.7.83 Praegratner Dorfertal;
Juli 1982 und 83 1 Paar an der Bruthoehle im Umbaltal
(1900 m); 12.7.83 futtertragendes Paar nahe der Clarahuette
(2300 m); 20.7.83 1 Paar in der Dabaklamm.

Waldbaumlaeufer (*Certhia familiaris*)

Allgemein verbreitet, aber in Laerchenwaeldern nicht in
grosser Dichte vorkommend; 2.6.83 Jungvoegel am
Gradenberg (1800 m).

Zaunkoenig (*Troglodytes troglodytes*)

Bis in die Krummholzregion verbreitet (2200 m); 26.5.83
zwischen Bobojach und Rabenstein 3 Ex.; 4.11.81 bei
Niedermauern; 13.7.82 8 Ex. von Pebell Alm zu Clarahuette;
13.7.83 4 Ex. im Kalser Dorfertal.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

An der Isel und den Seitenbaechen allgemein verbreitet;
12.6.80 Nest im Maurertal (1450 m); 30.5.83 Jungvoegel in
Stroeden (1400 m); 30.5.83 3 Nester im Umbaltal bis 1700 m;

5.6.83 Jungvoegel bei Praegraten; 6.6.83 Jungvoegel bei Gries; 8.6.83 bei Welzelach; 12.6.83 Nest an der Isel bei Bobojach; 8.6.84 fuetternde Altvoegel im Kalser Dorfertal und fluegge Jungvoegel bei Matrei; 19.9.82 1 Ex. nahe der Hochschober Huette (2200 m)

Zippammer (*Emberiza cia*)

29.2.84 1 Ex. in Bobojach; dies ist der Zweitnachweis fuer Osttirol; (Erstnachweis aus dem Tiroler Gailtal - GOLLER unveroeffentl.).

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

In den Wiesen der Taeler verbreitet bis ca. 1600 m; zwischen Bobojach und Rabenstein 7 Ex. am 26.5.83.

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

Haeufiger Brutvogel; 16.7.82 Nest mit Jungvoegeln im Umbaltal (1800 m)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

1.8.82 3 Ex. bei Bobojach; 7.6.83 Jungvoegel bei Gries; 12.7.82 bei Obermauern singend; 8.6.84 1 Ex. bei Matrei.

Zeisig (*Carduelis spinus*)

Im Nadelwaldbereich verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 25 Ex.; 16.7.81 diesj. Ex. im Umbaltal; 19.9.82 1 Paar in 2300 m bei der Hochschoberhuette; 20.7.83 ca. 50 Ex. im Kalser Dorfertal.

Gruenling (*Carduelis chloris*)

Bis ca. 1650 m (Bichl, Kalser Dorfertal) beobachtet.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

10.6.79 bei Bobojach; 3.8.82 bei Praegraten; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 14.6.83 Stein 4 Ex.; 8.6.84 1 Paar am Waldrand bei Bichl; 11.7.83 bei Pebell Alm.

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

Allgemein verbreitet bis an die Baumgrenze; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 4 Ex.; 19.9.82 2 Ex. in 2200 m bei der Hochschoberhuette; 20.7.83 ca. 100 Ex. im Kalser Dorfertal.

Haenfling (*Acanthis cannabina*)

1.8.82 Praegraten; 26.5.83 Obermauern; 8.6.83 Gries; 12.6.83 Bobojach 1 Paar; 16.7.81 Berg 1 Paar; 8.6.84 2 Paare in den Sajat Maehdern (1700 m).

Girlitz (*Serinus serinus*)

1.8.82 und 5.6.83 Praegraten; 8.6.83 Welzelach; 8.6.83 Gries; 12.7.83 Kalser Dorfertal 1 Ex.

Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*)

15.6.83 Praegraten Schattseite - Beobachtungen dieser Art sind aus Osttirol erst sehr wenige bekannt geworden.

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

In Nadelwaeldern allgemein verbreitet.

Feldsperling (*Passer montanus*)

30.3.82 Bobojach; 7.6.83 Gries.

Hausesperling (*Passer domesticus*)

Auf die Horizontal- und Vertikalverbreitung des Hausesperlings in den einzelnen Weilern und Gehoefen sollte in Zukunft vermehrt geachtet werden, auch das Auftreten von Italiensperlingen (*P. d. italiae*) ist moeglich (vgl. HEINRICHER & NIEDERWOLFSGRUBER 1981)

Schneefink (*Montifringilla nivalis*)

1.2.79 30 Ex. in Praegraten an Futterhaeuschen; 8.6.83 bei der Eisseehuette (2500 m); 22.6.83 Bergersee; 12.7.82 2 Ex. unterhalb der Glorerhuette; 11.7.83 2 Ex. bei der Clarahuette.

Star (*Sturnus vulgaris*)

Bis ca. 1700 m verbreitet; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 16 Ex.; 16.7.81 diesj. Ex. bei Berg; 8.6.84 Mitteldorf ca. 20 Jungstare; bei Virgen ebenfalls diesj., oberhalb Bichl (1550-1750 m) ca. 20 Ex., davon mehrere Paare futtertragend.

Pirol (*Oriolus oriolus*)

28.5.83 1 Ex. bei Matri an der Isel.

Eichelhaeher (*Garrulus glandarius*)

3.4.82 Bobojach; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 2 Ex.; 20.7.83 1 Ex. im Kalser Dorfertal.

Tannenhaeher (*Nucifraga caryocatactes*)

22.6.81 Obermauern; 2.11.81 Bobojach; 5.8.82 Virgen; 26.5.83 zwischen Bobojach und Rabenstein 3 Ex.; 12. und 20.7.83 2 Ex. im Kalser Dorfertal.

Elster (*Pica pica*)

15.4.82 bei Matri; soll im April 1982 auch in Bobojach beobachtet worden sein; die Elster zaehlt noch immer zu den gefaehrdeten Arten in Osttirol.

Alpenkraehe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Ende August 1977 3 Ex. beim Defreggerhaus; diese Beobachtung stellt einen Erstnachweis fuer Osttirol dar (vgl. HEINRICHER 1973)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

In allen Gipfelregionen anzutreffen; im Winter hunderte in Matri, ca. 40 Ex. in Virgen; 11.7.83 ca. 70 Ex. an mehreren

Stellen im Umbaltal, davon mehrere Jungvoegel bettelnd
(2400 m)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

In den Felsregionen verbreitet; Balzfluege im Februar
und Maerz wiederholt im Virgental beobachtet.

Rabekraehe (*Corvus corone corone*)

Im Siedlungs- und Wiesenbereich verbreitet, auf die
Hoeihenverbreitung sollte jedoch vermehrt geachtet werden;
offenbar fuehren Nahrungsfluege in Hoeihen ueber 2000 m.

Nebelkraehe (*Corvus corone cornix*)

28.3.82 1 Ex. bei Matrei; Mischlinge der beiden Rassen 1981,
82 und 83 an der Isel bei Matrei beobachtet.

Zusammenfassung

Die Artenliste aus dem geplanten Nationalparkanteil in
Osttirol ist eine erste zusammenfassende Darstellung aus
dieser Region. Neben einigen beachtlichen Beobachtungen
(Alpenkraehe - Erstnachweis, Steinhuhn, Waldschneepfe,
Hohltaube, etc.) konnten jedoch einige zu erwartende Arten
bisher noch nicht nachgewiesen werden, z.B. Wespenbussard
(*Pernis apivorus*), Rauhfusskauz (*Aegolius funereus*),
Auerhuhn (*Tetrao urogallus*). Ausserdem sollte in Zukunft
mehr auf Brutnachweise und die Vertikalverbreitung einzelner
Arten geachtet werden.

Literatur

- BEZZEL, E. & H. REMOLD (1958): Ornithologische Beobachtungen im
Gebiet der Hohen Tauern. - *Egretta* 1:6-10.
- DALLA TORRE, K. W. & F. ANZINGER (1896/97): Die Voegel von Tirol
und Vorarlberg. - *Mitt. orn. Ges. Wien* 20:2-5, 61-68, 102-107,
131-143; 21:5-12, 30-38, 61-71, 91-140 und *Erg. Nr.*:1-36.
- DATHE, H. (1944) Einige ornithologische Notizen aus Osttirol.
Ber. Ver. Schles. Orn. 29:35-38.
- GLUTZ v. BLOTZHEIM, U. N. & K. BAUER (1980): Handbuch der Voegel
Mitteleuropas. - Wiesbaden, 1148 pp.
- GOLLER, F. (1984): Zur Hoeihenverbreitung und Oekologie einiger
Vogelarten im Tiroler Gailtal (Osttirol). - *Vogelkundl. Ber.*
Inf. aus Tirol 1/1984:13-24.
- GOLLER, F. & W. GSTADER (1983): Ringfunde aus Tirol. -
Vogelkundl. Ber. Inf. aus Tirol 1/1983:1-24.
- HEINRICHER, A. (1973): Die Vogelarten Osttirols. - *Car. II*
83:583-599.
- HEINRICHER, A. & F. NIEDERWOLFSGRUBER (1981): Zur Vogelwelt
Osttirols. - *Monticola* 4:129-146.
- HUBER, J. & H. MEIER (1960): Ueber das Vorkommen des
Alpenseglers in Osttirol. - *Egretta* 3:16-17

- KOFLER, A. (1968): Kalser Vogel fuer die biologische Station in Salzburg. - Ostt. Bote v. 1. Februar 1968, p.8.
- KUEHTREIBER, J. (1952): Die Vogelwelt der Lienzer Gegend. - Schlern-Schriften 98:225-243.
- MESKER, C. & L.C. PREESMAN (1983): Waarnemingen uit Oost-Tirol gevraagd. - Het Vogeljaar 31:25-28.
- MESKER, C. & L.C. PREESMAN (1985): Nederlandse vogelaars ontdekken nieuwe soorten voor Oost-Tirol. - Het Vogeljaar 33:76-79.
- NEUBAUR, F. (1954): Ein Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) in den Hohen Tauern. - Orn. Mitt. 6:164.
- STROECKL, U. (1978): Samtkopfgrasmuecke in Osttirol. - Egretta 21:27-28.

Anschrift der Verfasser: C.M. Irisstraat 13, 's-Gravendeel, Niederlande; F.G. A-9941 Kartitsch 73.

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Tiroler Vogelwarte,
Obmann Dr. Franz Niederwolfsgruber, A-6020 Innsbruck,
Pontlatzer Str. 49
Schriftleiter: Franz Goller, A-9941 Kartitsch
Konto: Sparkasse Innsbruck-Hall 0000-038745 (BLZ 20500)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Tirol](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [1984_2](#)

Autor(en)/Author(s): Mesker Cees, Goller Franz

Artikel/Article: [Zur Vogelwelt im geplanten Osttiroler Anteil des Nationalparks Hohe Tauern 1-12](#)