download unter www.biologiezentrum.at
schwarzen Schildfleck, welcher licht getheilt ist; die Körperfarbe ist dunkelrothbraun, der Rücken hat auf jedem Segmente weissliche Flecken mit je zwei Paar schwarzen Punkten, wovon das hintere weit auseinander gerückt ist; auch in den Seiten sind solche Punkte, worin lange lichte Haare stehen; Afterschild und Klauen sind dunkelbraun. Uebrigens variiren die Raupen im Tone der Farbe nicht selten.

Die schlanke Puppe ist nach hinten verdünnt, der Kopf bräunlich dunkelgrau, welche Farbe sich bis über den Thorax zieht; Augenstellen dunkel, dazwischen die Stirnspitze. Von der Rückseite ist die Farbe des Leibes beingelb, die Rückenfleckenreihe und seitlich die bogenförmigen Zeichnungen dunkler, ober dem Kremaster steht eine lange dicht bewimperte etwas aufwärts stehende Spitze. Die Flügelscheiden licht, grünlich, der vortretende Theil der Fussscheiden, welche $3^1/_2$ Segmente freilassen, bräunlich, vor dem behaarten Kremaster stehen bauchwärts zwei Spitzen. Je älter die Puppe, desto mehr bräunlichgrau marmorirt.

Bücher-Anzeigen.

a) Von Jul. Lederer.

Annales de la Société entomol. de France. Paris 1862. 1. Trimestre. Mit 5 Tafeln.

Marseul de (p. 1). Supplément à la monographie des Histérides.

Chevrolat Aug. (p. 49). Description des Clytides du Brésil. 39 Arten. Neu: *Cyllena designata, falsa, consimilis, anacantha, patruelis, minuta, Neoclytus, Burmeisteri, ypsilon, Mecometopus, centurio, accensus, placens, Mniszechi, insignis, Tillomorpha corticina, Apalocera* (n. g.) *Waltli, Mygalobas* (n. g.) *ferrugineus.*

Schaum Dr. H. (p. 68). *Damaster Fortunei* Ad. Auf Taf. 1 abgebildet.

Saulcy Felic. de (p. 69). *Megarthrus Bellevoyei* (n. sp.) aus Metz.

Aubé (Dr. p. 71). *Ischnoglossa depressipennis, Telmatophilus brevicollis, Luperus Garieli* aus Frankreich, *Nanophyes nigritarsis* aus Sicilien.

Gautier des Cottes (p. 75). *Paederomorphus* (n. g. bei *Paederus*), *pedoncularius* aus Tarsus (Karamanien), *Paederus minutus* aus Turin, *P. ventricosus* aus Piemont, *Clytus Bellieri* aus Corsica.

Reiche L. (p. 79). Notes synonymiques sur divers coléoptères.

Fauvel A. (p. 81). Aléochariens nouveaux ou peu connus et description de larves de Phytosus et Leptusa. Neue Arten: *Leptusa rupestris*

download unter www.biologiezentrum.at

(*Delphinus*), *Aleochara algarum* und *Al. Godelinaisi* von der französischen Küste.

Coquerel et Mondière. Note sur des larves de diptères devéloppées dans des tumeurs d' apparence furunculeuse au Sénégal.

Coquerel Ch. (p. 105). Larves de Coléoptères de Madagascar.

Bigot J. (p. 109). Diptères nouveaux de la Corse. (*Apistomyia elegans*, *Bombylius mus*, *Phthiria notata*, *Paragus sexarcuatus*, *Hypoderma Bellieri*.)

Haliday A. H. (p. 115). *Philomides* (n. g.) *paphius* aus Cypern und *Chirolophus* (n. g.) *eques* aus Algerien, beides neue Hymenopteren aus der Familie der Chalciden.

Sichel Dr. (p. 118). Observations hymenoptèrologiques.

Signoret V. (p. 123). Hemiptères nouveaux de Cochinchine (*Aphoena Paulinia*, *Cyrene Westwoodi*, *Phylliphanta marginalis*, *Rasahus apicalis*, *Sicanus atrocoeruleus*, *Euryles Dohrni*, *Pelatocheirus vicinus*).

Bellier de la Chavignerie (p. 126). *Hemerophila barcinonaria*, *Camptogramma uniformaria*, *Acidalia dorycniata*; alle drei neue Arten aus Barcelona und auf Taf. 1. abgebildet; die erstere = *Boarmia sabinaria* V. *correptaria* Zeller.

Lucas H. (p. 130). Note sur la Perisphaera glomeriformis.

Dufour Léon (p. 131). Notices entomologiques (über einige Larven etc.).

Laboulbène Dr. (p. 149). Sur les stigmates de la larve du Nosodendron fasciculare.

Girard Maur. (p. 153). Expériences sur la fonction des ailes chez les insectes.

Amyot (p. 136). Sur la production des fils des Araignées.

Percis Ed. (p. 173). Histoire des insectes du pin maritime. Supplement aux coléoptères et rectifications.

Im Bulletin (p. I—XVI) finden sich verschiedene kleinere Notizen, die wir füglich übergehen können.

Dubois Ch. F. Les lépidoptères de la Belgique, leurs chenilles et leurs chrysalides. Bruxelles, Leipzig, Gand 1862.

Seit unserer letzten Anzeige (p. 203 dieses Bandes) sind wieder 8 Lieferungen (19—26) erschienen, die auf 24 Tafeln eben so viele Arten in allen Ständen dargestellt enthalten.

Hinsichtlich der Pränumerations-Bedingungen verweisen wir auf unsere letzte Nummer.

Bulletin de la Société impér. des Naturalistes de Moscou. 1861. Nr. 4.

Chaudoir Baron (p. 335). Révision des espèces qui rentrent dans l' ancien genre Panagaeus.

download unter www.biologiezentrum.at

Etudes entomologiques. Redigées par Victor de Motschulsky. 11. Année. Dresde 1861.

Nach einer 14 Seiten langen nicht allzu zarten Polemik mit den Berliner Entomologen gibt Herr v. Motschulsky seine Ansichten über die Systematik der Coleopteren und beschreibt mehrere neue Arten. Auf erstere haben wir hier nicht näher einzugehen; die letzteren sind: *Tachypus semilucidus* (Japan), *Tachyura (Tachys) brunnicollis* (Nordamer.), *rufula* (Panama), *Tachys flavicollis* (Panama), *aeneipennis* (Nordamer.), *lugubris* (Panama), *subfasciata* (Marseille), *tantilla* (Panama), *Lymastis* (Tachys), *niloticus* (Aegypten), *pullutus* (Ostind.), *Tachymenis* (Tachys), *reflexicollis* und *marginicollis* (Nordam.), *umbrosa* (Ostind.), *Polyderis* (Tachys), *aequinoctialis* (Panama), *testaceolimbata* und *glabrella* (Nordam.), *breviuscula* (Panama), *andalusica* (Andal., Algerien), *tenella* (Ostind.), *minuscula* (Panama), *Elaphropus gracilis* Ostind.), *Trechisibus* (Trechide) *aeneus* (Chile), *Cnides* (Trechide) *rostratus* (Panama), *Anophthalmus longicornis* (Krain), *striatus*, *Ménétriésii* und *ventricosus* (aus der Mammouthshöhle in Nordamerika), *costulatus*, *cordicollis*, *rostratus*, *trechioides*, *robustus* und *oblongus* (aus Krain), *Eucerus sublimbatus* (Holl. Guayna), *Lachnothorax (Lachnophorus) biguttatus* (Ostind.), *Arsinoë trimaculata* (Cap), *Lebidia (Lebia) violaceipennis* (Südfrankr.), *chloriventris* (Algerien), *pilosella* (Spanien, Frankr.), *Drymatus* (Dromiide) *tessellatus* (Cap), *Crepidostoma* (Brachinide) *rufescens* (Cap).

Schriften der königl. physik. ökon. Gesellschaft zu Königsberg. 2. Jahrg. 1. u. 2. Abth. 1862.

In den Abhandlungen gibt Brischke eine Aufzählung der Hymenopteren der Provinz Preussen und zwar im 1. Hefte die Ichneumonen, im 2. die Sphegiden, Sapygiden, Scoliaden, Mutilliden, Chrysiden, Vespiden, Eumeniden, Formicarien.

In den Sitzungsberichten begegnen wir auf p. 5 einer Mittheilung Prof. Körnicke's über *Bruchus rufimanus*, welcher an *Vicia faba* verwüstend auftrat, auf p. 9 einem Artikel Caspary's über die früheren Stände von *Microdon mutabilis* (die Puppe an der inneren Rindenseite von Eichenstubben) und *Haemonia equiseti* (die Larve in einem Teiche bei Rauschen an *Myriophyllum* und *Potamogeton* gefunden).

Stettiner Entomologische Zeitung. 1862. 3. u. 4. Quartal.

Das 3. Heft enthält:

Stål Carl (p. 289). *Hemiptera mexicana* (Fortsetzung). Neu sind: *Capanaeus auriculatus*, *rubronotatus*, *Vates*, *tetricus*, *odiosus*, *spurcus*, *Piezogaster scutellaris*, *Mamurius mopsus*, *Nematopus lepidus*, *Theognis lineosus*, *Narnia femorata*, *Scamurius jurgiosus*, *dilectus*, *Hypselonotus lineatus*, *punctiventris*, *Collatia* (n. g.) *emarginata*, *Anasa conspersa*, *maculipes*, *Capaneodes*, *spiniceps*, *notatipennis*, *litigiosa*, *lugens*, *Cimolus* (n. g.) *vitticeps*, *Margus impudens*, *inornatus*, *Madura perfida*, *Harmostes*

download unter www.biologiezentrum.at

nebulosus, *Jadera lateralis*, *Lygaeus elatus*, *truculentus*, *trux*, *ruficeps*, *circumlitus*, *rubriger*, *thoracicus*, *vittiscutis*, *pallidocinctus*, *brevicollis*, *tullus*, *lividipennis*, *Servillei*, *Plociomera piligera*, *litigiosa*, *oblonga*, *Myodocha giraffa*, *Theraneis cliens*, *Dysdercus albidiventris*, *mimus*, *Resthenia plagigera*, *luteigera*, *picticollis*, *ornaticollis*, *Högbergi*, *bivittis*, *latipennis*, *vittifrons*, *vitticeps*, *Brachycoleus alacer*, *nigriger*, *ornatulus*, *Calogoris jurgiosus*, *fasciativentris*, *Henicocnemis albitarsis*, *Lygus Sallei*, *Megacoelum rubrinerve*, *Valdasus famularis*, *Garganus* (n. g.) *albidivittis*, *Fulvius* (n. g.) *anthocorides*, *Eccritotarsus generosus*, *eucosmus*, *pallidirostris*, *mundulus*, *Tingis fusigera*, *decens*, *Monanthia patricia*. In Noten werden noch beschrieben: *Theognis fasciolatus* aus Neu-Granada, *Margus graptosternus* (ebendaher), *Madura fuscoclavata* (Rio), *longicornis* (Venezuela), *Corduba macra* (Sierra Leone), *Jadera pectoralis* (Brasil.), *Haemus oculus cancri*, *Resthenia rubrovittata* (Nordam.), auch werden für bekannte Arten einige neue Gattungen errichtet.

Sehneider Dr. W. G. (p. 325). *Coleoptera* aus Finnmarken, dabei neu: *Euryusa Wockei*.

Staudinger Dr. O (p. 341). Die Arten der Lepidopterengattung *Ino* Leach. Natürlich mit obligaten Ausfällen auf mich, die keiner Erwiederung werth sind. Wahrscheinlich ist Staudinger selbst längst anderer Meinung geworden über das, was er da zusammengeschrieben.

Heyden C. von (p. 360). Fragmente aus meinen entom. Tagebüchern. Enthalten die ersten Stände von *Gelech. acuminatella*, *Gracilaria hemidactylella*, *fidella*, *limosella*, *Kollariella*, *Mompha divisella*, *Stephensia Brunnichiella*, *Elachista Raschkeella*, *Tischeria dodonaea*, *Bucculatrix cidarella*, *Nepticula fragariella*, *Freyella*.

Schultz (p. 367). *Caradrina Milleri* n. sp. aus Misdroy an der Ostsee; auf Taf. 1 abgebildet und nach der Abbildung der ♂ von *cubicularis* kaum zu unterscheiden, das ♀ bläulicher.

Prittwitz O. v. (p. 369). Nachricht über Sepp's Schmetterlingswerk.

Rathke H. (p. 389). Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten. (Fortsetzung von 1861, 3. Heft.)

Osten Sacken (p. 409). Entomologische Notizen. (*Necrophorus americanus*, *Leucania extranea*, *Conotrachelus nenuphar* etc. Ein Käfer: *Megaderes bifasciatus* soll eine besondere Vorliebe für Druckerschwärze haben und gierig die Buchstaben von den Anschlagzetteln fressen. Vielleicht frisst er auch Denunciationen, Neujahrsgrobheiten u. dgl. Dann wäre er einer gewissen eben so tactvollen als verständigen Redaction zu empfehlen.

Im 4. Hefte finden wir:

Sieboldt C. Th. v. (p. 417). Ueber *Parthenogenesis*.

Stål C. (p. 437). *Hemiptera mexicana* (Fortsetzung). Neue Arten: *Depodius crenulatus*, *emarginatus*, *Hesus* (n. g.) *annuliger*. *Artagerus histricus*, *Mezira moesta*. *litigiosa*, *ovata*, *Phymata annulipes*, *Macrocephalus incisus*, *cliens*, *lepidus*, *Falleni*, *Saica fuscipes*, *tibialis*, *Bactrodes spinulosus*, *Gnathobleda litigiosa*. *Sinea integra*, *coronata*, *sanguisuga*, *raptoria*, *defecta*,

download unter www.biologiezentrum.at

Ascra tabida, *Repipta fuscipes*, *taurus*, *nigronotata*, *tuberculigera*, *subinermis*, *plagiaticollis*, *octospina*, *Hiranetes sanguiniventris*, *Milyas zebra*, *Notocyrtus dromedarius*, *Zelius grassans*, *nugax*, *minus*, *umbratilis*, *ambulans*, *exsanguis*, *janus*, *litigiosus*, *ruficeps*, *tetracanthus*, *Apiomerus elatus*, *subpiceus*, *moestus*, *nigripes*, *Hammatocerus luctuosus*, *Rhiginia crudelis*, *Macrops histrionicus*, *Leogorrus venator*, *Nalata setulosa*, *rudis*, *Thymbreus crocinopterus*, *Pirates guttatipennis*, *Nabis nigriventris*, *Salda ornata*, *Ambrysus* (n. g.) *Signoreti*, *melanopterus*, *pudicus*, *Abedus* (n. g.) *ovatus*, *breviceps*. In Noten Beschreibung von *Pirates arcuiger* n. sp. aus Neu-Granada und Errichtung einiger neuer Gattungen für bekannte Arten.

Cornelius (p, 462). Libellenzüge im Bergischen.

Dietrich K. (p. 466). Zur Systematik der Schmetterlinge. (Nach eigener Angabe befasst sich der Verfasser bereits 2 Jahre mit Lepidopteren; da kann man schon ein Wort mitreden!

Speyer Dr. (p. 480). Zur Vertheidigung*).

---

*) Nur mit Widerwillen und Eckel gehe ich daran, diese Herrn Dr. Speyer tief brandmarkende „Rechtfertigung" zu beleuchten.

Gut, ich habe das Wort Sudelei gebraucht (Herr Speyer sagt es wenigstens), aber wo? In einem **Briefe** vom 8. März 1860! Ist es männlich, ist es ehrlich, ist es wissenschaftlich, vertrauliche Briefe in die Oeffentlichkeit zu ziehen?

Angeblich um den Lügner von sich abzuwälzen, nimmt Herr Dr. Speyer keinen Anstand, als Denunciant aufzutreten. Beneide ihn um diese edle That, wer will, beantworte sich aber Jeder selbst die Frage, ob ich von einem Manne, der mich stets nur „hochgeehrter Freund, werther Freund etc." titulirte, dem ich bei Abfassung seiner Faltercompilation in jeder Beziehung nach Kräften zu Diensten stand, einen solchen Judasdank erwarten konnte! Pfui über ein Individuum, das solche Begriffe von Ehre hat!

Ganz eines Dr. Speyer würdig ist es, mir in seiner „Rechtfertigung" die brieflichen (übrigens wohlbegründeten) „Glossen" seiner Critik über Heinemann vorzuwerfen, dagegen vom Splitter und Balken zu sprechen, wenn ich mich gegen öffentliche Angriffe vertheidige.

Eben so erbärmlich ist es, in unsere Polemik ganz fremde Personen, wie Dr. Schaum und Stainton hineinziehen und mir auf den Hals hetzen zu wollen. Erbärmlich ist es, wo ich meine im IV. Bde. dieser Zeitschrift gebrachte Recension von Guenée's *Uranites* et *Phalénites* vertheidige, unter der Hand eine derartige Escamotage vorzunehmen, dass es sich nicht mehr um diese, sondern um Guenée's *Noctuelites* handelt, die ich nirgends öffentlich besprochen. Erbärmlich ist es, mir briefliche Urtheile über diesen Gegenstand vorzuhalten, erbärmlich, mir eine „Metamorphose des Dr. Schaum in Dr. Gerstäcker" vorzuwerfen, wo eben Dr. Speyer selbst es war, der in der Stett. Ztg. Octbr. p. 164 einen Passus über Dr. Gerstäcker angeführt hatte und es klar ist, dass sich meine Erwiederung auf diesen bezog. Erbärmlich ist es Microlepidopterologen und Coleopterologen da, wo es ihm in den Kram passt, als Gewährsmänner hinzustellen, Autoritäten aber, die seiner Ansicht unbequem, wie Herrich-Schäffer, einerseits trotz meiner wiederholten Erinnerung bei Seite zu lassen, andererseits aber die nämliche Critik (Correspondenzblatt des zool.-min. Vereins 1858—1861) zu citiren, wo man sie eben zu seinen Zwecken gebraucht (vide Speyer: Stett. Ztg. 1860 p. 72). Erbärmlich ist es, solche Scandalsucht zu beurkunden, auf alle wissenschaftlichen Fragen aber die Antwort schuldig zu bleiben.

Gewiss ruft solchem Gebahren jeder rechtlich Denkende mit mir aus tiefster Seele ein pfui Teufel zu! Lederer.

download unter www.biologiezentrum.at

Prittwitz O. v. (p. 481). Die Winterformen und Generationen der schlesischen Falter. (Fortsetzung von 1861, 2. Quartal bis zum Schlusse der Bombyciden.) Zu der Angabe auf p. 511, dass kein Bombycide als Falter überwintere, erlaube ich mir zu bemerken, dass ich einst von *Notod. plumigera* im Februar 2 reine ♂ und 1 ♀ an Häusern gefangen habe. Ob sie als Falter oder als Puppe überwintert, weiss ich freilich nicht, eben so wenig, ob die Art auch in Schlesien vorkommt.

Hagen Dr. (p. 512). Insekten in sicilianischem Bernstein.

Mäcklin Prof. Dr. (p. 514). Synonymie. Berichtigung über *Acropteron.*

Dietrich K. (p. 515). Käfer, die für die Schweizer Fauna neu, 86 Arten.

Berliner Entomologische Zeitschrift 1862. 1. u. 2. Quartal. Mit 2 Tafeln.

Ruthe J. F. (p. 1). Deutsche Braconiden. 3 Stück. (Die Gattung *Meterorus* mit 37 Arten.)

Lederer J. (p. 59). *Celonoptera mirificaria.* Dazu eine Abbildung auf Taf. 1. (Man sehe hierüber meine Notiz auf p. 201 dieser Zeitschrift.)

Heyden C. von (p. 61). Verwandlungsgeschichte von *Trachys minutus* (die Larve minirend in den Blättern rauher Weiden) und *Rhamphus flavicornis* (in den Blättern des wilden Apfelbaumes).

Döbner Prof. (p. 64). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Coleopteren (*Aegos. scabricorne, Opilus domesticus, Lytta vesicatoria, Epilachna 11-maculata.*

Löw Dr. H. (p. 69). Ueber griechische Dipteren (93 Arten).

Derselbe (p. 90). Nachtrag zu den im vorigen Bande beschriebenen afrikanischen Trypetinen.

Kraatz Dr. G. (p. 91). Ueber die Arten der Gattungen *Hyperops Microtelus* und *Dichillus,* dabei *Dichillus subtilis* n. sp. aus Sicilien, *laeviusculus* aus Oran, *nitidus* aus Mesopotamien. Im Anhange wird noch die *Stenosis italica* aus Italien beschrieben.

Schaum H. (p. 100). Ueber die Gattung *Pachycera Eschsch.*

Derselbe (p. 101). Beiträge zur Käferfauna Griechenlands. 7. Stück. Nachträge, verschiedene Berichtigungen und Beschreibung folgender neuer Arten: *Aptinus lugubris*, *Pterost. Tieffenbachii*, *Pt. spartanus*, *Zabrus validus*, *subtilis, reflexus*, *Harpalus polyglyptus*, *Stenosis transversalis*, *Anophthalmus Krueperi, Bembid. grandipenne* und *quadrifossulatum.*

Kraatz Dr. G. (p. 115). *Metacinops rhinomacer* *) und *Auchmeresthes*

---

*) Herr Dr. Kraatz glaubt dazu folgende Einleitung machen zu müssen:

„Unter den Coleopteren von Dr. Krüper befand sich ein Rüsselkäfer, welcher bisher nur in einem Exemplare aufgefunden zu sein scheint (es müssten denn die Wiener und Dresdner Entomologen, denen Herr K. seine Vorräthe vorgelegt, vor mir bereits Stücke

download unter www.biologiezentrum.at

Kiesenwetteri, neue Rüsselkäfer-Gattungen und Arten aus Griechenland, auf Taf. 2 abgebildet.

Derselbe (p. 121). Von Dr. Krüper neu aufgefundene Arten. (*Anthaxia melancholica*, *Malachius graecus*, *tenellus*, *Helops giganteus*, *Stenostola alboscutellata*, *Obrium bicolor*, *Stenoria thoracica*.

Derselbe (p. 127). Ueber *Aeraphilus* Redtb., *Cathartus* Reiche und *Leucohimatium* Rosh. Neue Arten: *Aer. talpa* (Hyères), *fibulatus* (Andalus.), *ferrugineus* (Andalus.).

Kretschmar C. (p. 135). *Plusia excelsa* n. sp. aus Petersburg (ich erhielt einige von Kindermann im Altai unter einer Menge von *Pl. jota* und *bractea* gefangener Stücke und war fast versucht, einen Bastard anzunehmen), *Acidalia corrivalaria* aus Berlin (wird ganz irrig mit *consanguinaria* und *litigiosaria* verglichen, welche Rippe 6 und 7 der Hinterflügel gestielt haben.)

Harold E. v. (p. 138). Beiträge zur Kenntniss einiger coprophager Lamellicornien (Aphodien). 3. Stück. (Fortsetzung von 1861, Heft 1.)

Schaum H. (p. 172). Die Cicindelen der philippinischen Inseln. Bis auf 2 Arten (*Cic. sumatrensis* und *Colliuris acrocolia*) alle neu, als: *Cic. melanopyga*, *conicollis*, *conspicua*, *clara*, V. *suavissima*, *fugax*, *nana*, *macilenta*, *excisa*, *Therates vigilax*. *Tricondyla ventricosa*, *planiceps*, *cavifrons*.

Löw. Dir. Dr. H. (p. 185). Diptera americae septentrionalis indigena. Centuria secunda. (Vide 1861. 3. Quartal.)

Roger Julius (p. 233). Einige neue exotische Ameisen-Gattungen und Arten. *Monacis* (n. g.) *spinicollis* (Brasil.), *bispinosa* (Cayenne, Brasil.), *mucronifera* (Cayenne), *dolonigera* (Südamer.), *Hemioptica* (n. g.) *scissa* (Ostind., Ceylon), *Formica clavigera* (Pennsylvanien), *Acropyga* (n. g.) *acutiventris* (Ceylon?), *Dolichoderus scabridus* (Australien), *Leptogenis falcata*, *Mystrium* (n. g.) *mysticum* (Madagascar), *Ooceraea* (n. g.) *fragosa* (Ceylon), *Labidogenys* (n. g.) *lyroessa* (Ceylon), *Pyramica* (n. g.) *Gundlachi* (Cuba).

---

erhalten haben) und eine ausgezeichnete neue Gattung bildet." Weiters: „Achtet man aber auf den Kopf, was Diejenigen nicht gethan zu haben scheinen, die den merkwürdigen Rüssler übersahen" etc.

Wenn Herr Dr. Kraatz selbst nicht bestimmt weiss, ob wir seinen Rüssler von Krüper erhielten oder nicht, ist es doch jedenfalls aller Logik zuwider, in so bestimmter Weise von „übersehen haben" zu sprechen. Zum Ueberflusse haben aber nebst Anderen Miller und Hampe, die doch auch zu den Wiener Entomologen gehören, von Krüper's Vorräthen gar nichts, das Wiener Museum nicht Alles gesehen (da Krüper nicht Alles bei sich trug), ich und Türk sie auf seinem Zimmer in einer Weise durchmustert, die bei dem beschränktem Raume und stetem Hin- und Herschieben der Menge Schachteln es sehr leicht möglich machte, einige derselben ganz zu übersehen.

Sollten sich nicht auch Käfer ohne derlei Bemerkungen beschreiben lassen?

Lederer.

download unter www.biologiezentrum.at

Derselbe (p. 255). Beiträge zur Kenntniss der Ameisenfauna der Mittelmeerländer. Neue Arten: *Atta dentigera* aus Syrien und Mesopotamien, *Atta gemella* aus Algier und Malorca, *Phacota* (n. g.) *Sichelii* aus Malaga.

Kraatz Dr. G. (p. 263). Beiträge zur europäischen Käferfauna. Enthalten die Beschreibungen von *Pterost. baldensis* Schaum, *Trechus marginalis* Schaum, *Chaetonyx robustus* Schaum, *Myrmedonia Hampei* Kraatz, *Homalota spinicollis* Kr., *Quedius fallaciosus* Kr., *Malachius armifrons* Kr., *brevicornis* Kr., *Anthocomus varitarsis* Kr., *Tychius elephas* Kr., *Novius 10-punctatus* Kr.

Zum Schlusse folgen noch kleinere Mittheilungen verschiedener Art und die Bücherschau. Auch in letzterer nimmt Herr Dr. Speyer Veranlassung (pag. X), sein: Kreuziget ihn, kreuziget ihn über mich zu rufen. Diessmal ist es die „natürliche Reihenfolge," die ihm Veranlassung dazu gibt. Dass aber in dem betreffenden Aufsatze möglichst natürlich zu lesen, dass ich mich gegen eine Auslegung meiner Worte im Speyer'schen Sinne bereits in den Verhandl. des zool.-botan. Vereins (V. Bd. 1855, p. 226) und in meinen Noctuinen (p. VIII) verwahrt habe, das kümmert natürlich Herrn Speyer nichts. Für ihn sind nur vertrauliche briefliche Mittheilungen Gegenstand der Oeffentlichkeit.

b) Von A. Senoner.

Atti della Società italiana di Scienze naturali. Vol. II. Fasc. 3 u. Vol. III. Fasc. 1—4. Milano 1861.

(Vide V. Bd. p. 91—93 diese Zeitschrift, wo auf p. 92 der wiederholte Titel zu streichen.)

(II. p. 286.) — Stirpis Cecidomynarum genera revisa a Prof. Camillo Rondani.

P. 295. Straordinaria apparizione di insetti carnivori in Lombardia von Antonio Villa. Am 15. August 1860 wurden von Villa und Anderen in Desio, Seregno, Monza u. a. O. eine unzählige Menge von *Harpalus griseus* bemerkt, welche Villa als eine Art Emigration von den Ufern des Ticino oder Po, oder auch aus den Apenninen anzusehen glaubt, oder vielleicht in Folge des am vorhergegangenen Tage in der Umgebung von Ferrara stattgefundenen fürchterlichen Sturm in oben genannte Ortschaften verjagt wurden.

III. P. 181. Saggio di osservazioni fenologiche relative ai cimici dell' agro pavese e studii su la flora da essi prediletta, von Pellegrino Strobel.

P. 200. Brevi cenni sopra alcune specie lombarde del genere Chrysopa von Carl v. Tacchetti.

P. 206. Specie europeae generis Phasia von Rondani.

P. 336. In alcune Libellule del Bresciano von C. Tacchetti. Nachtrag zu Erra's Verzeichniss der Brescianer Libelluliden (Atti II. p. 97), in welchem 6 weitere Species aufgeführt werden, als: *Libellula pedemontana*, *affinis* und *scotica*, *Comphus uncatus*, *Cordulegaster bidentatulus* und *Aeschna borealis*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Lederer Julius

Artikel/Article: Bücher-Anzeigen [Teil a]. 332-339