

## Uebersicht der europäischen Arten der Coleopteren-Gattung *Hylobius* Sch.

Von Edm. Reitter in Mödling bei Wien.

- A. Halsschild uneben, mit mehreren Dorsaleindrücken; Schildchen glatt und glänzend, Schenkel kaum oder äusserst schwach gezähnt. Mittel- und Nordeuropa bis Sibirien. *piceus* Deg.
- B. Halsschild gleichmässig gewölbt, ohne Dorsaleindrücke; Schildchen punktirt und behaart, Schenkel deutlich gezähnt.
- 1" Schildchen deutlich dreieckig oder halbrund, normal; Flügeldecken mit abgeschrägten oder abgestumpften Schulterecken.
- 2" Halsschild stark quer; Rüssel fein punktirt, nahezu glatt, Oberseite überall äusserst fein gelbschuppig behaart, die Härchen bilden auf den Flügeldecken vorn unvollständige, hinten deutlichere Querwellen.

Langgestreckt, parallel, nicht vom Aussehen eines *Hylobius*, sondern ganz ähnlich einem *Pissodes*; rothbraun, Fühler und Beine heller gelbroth. Halsschild mit feiner, erhabener Längslinie, Scheibe, namentlich an den Seiten, deutlich gekörnt, die Körnchen auf der Scheibe undeutlicher. Schildchen dicht gelb behaart. Flügeldecken parallel, fast dreimal so lang als breit, oben wenig gewölbt, mit dicht gestellten und dicht punktirten Streifen; diese bis zur Apicalbeule von gleicher Stärke, die Punkte der Streifen durch kettenartig aneinandergereihte Körnchen geziert, die Zwischenräume querrunzelig, kaum breiter als die dicht punktirten Streifen und etwas gewölbter als diese. Schenkel stark gekeult und stark gezähnt. Long. 9mm (rostr. excl.). Von Herrn Professor Dr. Huguenin, dem ich diese auffallende Art dedicire, bei Emmenthal in der Schweiz entdeckt. **Huguenini** n. sp.

- 2' Halsschild fast so lang als breit, Rüssel grob punktirt. Oberseite sehr spärlich behaart, mit oder ohne quergestellte Fleckenbinden.
- 3" Die Seiten der Hinterbrust neben den Episternen derselben punktirt, nicht glatt und glänzend.

- 4'' Käfer sehr gross (L. 20—25 mm), Schenkel schwach gezähnt, die Basis des Hornhakens die Hinterschienenspitze ganz umfassend, halbrund; der neunte Zwischenraum der Punktstreifen aussen an der Spitze erweitert. Griechenland.  
 Flügeldecken ohne Haarflecken **alpheus** Reiche.  
 Flügeldecken mit 2 gelben Fleckenbinden (Morea)  
 v. **fulvopictus** Reitt.
- 4' Käfer kleiner, Schenkel stark gezähnt, der Hornhaken an der Hinterschienenspitze die äussere Basis nicht ganz erreichend, nicht halbrund, sondern stumpfwinkelig; der neunte Zwischenraum der Punktstreifen aussen an der Spitze allmähig verschmälert.
- 5'' Grösser, Halsschild grob und dicht punktirt, die schmalen Zwischenräume auf der Scheibe zu Längsrunzeln verflossen, Flügeldecken mit bis zur Schulterbeule nahezu gleich starken Punktstreifen, Bauch an den Seiten gelbfleckig behaart, Hinterbrust am Hinterrande mit glatter Längsdepression, Beine dunkel. Europa, den Coniferen sehr schädlich. **abietis** L.
- 5' Viel kleiner, Halsschild dicht und stark punktirt, die Punkte rund, nicht längsrunzelig in einander verflossen, Flügeldecken an der Basis mit sehr starken, nach hinten allmähig feiner werdenden Punktstreifen, Bauch ziemlich gleichförmig behaart, Hinterbrust am Hinterrande rundlich eingedrückt, glatt, beim ♂ grubig vertieft und glänzend, Beine braunroth. Nördliches Europa; viel seltener. **pinastri** Gyll.
- 3' Die Seiten der Hinterbrust neben den Episternen der Länge nach glatt und glänzend. Mehr oder weniger braunroth. Mitteleuropa, Kaukasus. **fatuus** Rossi.
- 1' Schildchen sehr klein, fast punktförmig; Flügeldecken an der Basis flach im Bogen ausgerandet, die Schultern nach vorne eckig vortretend. Rostbraun, Fühler und Beine heller. Flügeldecken mit 2 Querreihen gelber Haarflecken. Kaukasus. **verrucipennis** Boh.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Uebersicht der europäischen Arten der Coleopteren-Gattung Hylobius SCH. 97-98](#)