

Ueber die *Crioceris*-Arten aus der Verwandtschaft der *Crioceris merdigera* L. mit rothem oder theilweise rothem Kopfe.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

- 1'' Die Schenkel ganz oder zum Theile roth. Kopf bei normalen Stücken ganz roth. Zwischenräume der Punktreihen auf den Flügeldecken viel breiter als die Punktreihen.
- 2'' Unterseite ganz schwarz, Schenkel an der Basis schwarz, die Knie hell gefärbt; Schläfen hinter den Augen verdickt, einen stumpfen Winkel bildend, Punkte der Reihen auf den Flügeldecken weitläufig stehend, hinten fein, vorne grob. — Kaukasus. — *Cr. cornuta* Fald.

Faldermanni Guér.

- 2' Abdomen an der Spitze hell gefärbt, Schenkel roth, die Knie schwarz.
- 3'' Schläfen hinter den Augen klein, allmählig gerundet verengt, Halsschild fast so lang als breit; Flügeldecken nur mit feinen, vorne gröberen Punktreihen, die Punkte derselben weitläufig gestellt. — Europa. — *Cr. brunnea* F.

merdigera L.

- 3' Schläfen hinter den Augen gross, verdickt, hinten einen stumpfen Winkel bildend, Halsschild stark transversal, am Hinterrande fast breiter als am Vorderrande, Flügeldecken mit tiefen, fast gleichmässigen Punktreihen, die Punkte derselben dichter stehend und vorne nur wenig grösser. Sonst der *merdigera* ähnlich. — Nördl. Mongolei. Von Hans Leder eingesendet.

laticollis n. sp.

- 1' Schenkel und Kopf schwarz, am letzteren nur der Scheitel roth. Zwischenräume der dichten und dicht punktierten Streifen nicht grösser als die Streifen selbst. — In den Alpen. — *Cr. alpina* Redtb.

tibialis Villa.

Anmerkung. *Cr. Koltzei* Wsc., D. 1892, 131 = *Oschanini* Dohrn, St. 1884, 40.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Ueber die Crioceris-Arten aus der Verwandtschaft der *Crioceris merdigera* L. mit rothem oder theilweise rothem Kopfe. 302](#)