

Die palaearktischen Arten der Coleopt.-Gattung *Bangasternus* Gozis (*Coelosthetus* Cap.).

Gegeben von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren).

- 1" Fusskrallen von gleicher Länge.
- 2" Rüssel an der Spitze plötzlich eingeschnürt und verschmälert.
- 3" Lang und schmal, parallel, Flügeld. viel mehr wie doppelt so lang als zusammen breit. — Sicilien, Algier. **siculus** Cap.
- 3' Kürzer und breiter, Flügeldecken an den Seiten etwas gerundet, kaum ganz doppelt so lang als zusammen breit.
- a" Grösser und breiter; Rüssel mit deutlichem, vorn gerinntem Mittelkiel. — (Long. 6—7 mm.) — Auf der ganzen Balkanhalbinsel, Kleinasien und Syrien. **planifrons** Gyll.
- a' Kleiner (5 mm.) und schmaler; Rüssel mit undeutlichem Mittelkiele, vorn mit feiner Rinne. Dem *orientalis* sehr ähnlich; Fühler, Schienen und Tarsen braunroth. Halsschild auch an der Basis etwas gerundet eingezogen, Toment gelblich, auf den Flügeld. mit greiser Marmorirung; Unterseite dicht greis behaart, dichter punktiert, wie geschuppt, die Punkte wie bei den andern Arten pupillirt und jeder mit einem langen, dreispitzigen Haare. — Araxesthal bei Ordubad. **Araxis** n. sp.
- 2' Rüssel an der Spitze nur etwas und schwach verschmälert.
- 4" Grösser (5.5 mm). Hinterwinkel des Halsschildes rechteckig, oder beinahe so. Oberseite mit greiser Behaarung. — Algier, Spanien. **villosus** Cap.
Oberseite mit röthlicher Behaarung, Halsschild mit feiner, punktfreier Längslinie. — Spanien. **v. hispanicus** Cap.
- 4' Klein, (4 mm). Hinterwinkel des Halsschildes sehr stumpf. Südspanien. **Diecki** Cap.
- 1' Fusskrallen von ungleicher Länge.
- 5" Rüssel bis zum Vorderrand der Augen viel länger als breit.
- 6" Rüssel mit starkem Mittelkiel, die Seiten scharf gerandet. Grössere Art. (Long. 5—6 mm). — Im südöstlichen Europa, Kaukasus, Kleinasien. **orientalis** Cap.
- 6' Rüssel mit undeutlichem Mittelkiel, oder ohne solchen, oben flach, die Seiten nicht scharf gerandet. (Long. 4 mm.) — Südfrankreich, Italien. **provincialis** Fairm.
- 5' Rüssel bis zum Vorderrande der Augen nicht länger als breit. Kleinste, schmale Art. (Long. 4 mm.) Araxesthal, Amasia. **Fausti** Reitt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Die palaearktischen Arten der Coleopt.-Gattung Bangasternus GOZIS \(Coelosthetus CAP.\). 257](#)