

Otiorrhynchus Hummleri n. sp. (Troglorrhynchus).

Von K. Flach, in Aschaffenburg.

Angustus, ferrugineus, sat nitidus, sparsim flavo-pilosus. Rostro capite evidenter longiore, pone pterygia dilatata constricto, antice triangulariter impresso, dehinc ruguloso et subtiliter carinato; oculis perparvis vix prominulis nigris; fronte crebre punctata, foveola parva inter oculos; antennae dimidium corporis vix attingentes, articulo 2 primo parum brevior. Thorace latitudini aequilongo, fere ante medium latissimo, lateribus rotundatis, sat crebre grosse pupillatim punctato, interstitiis glabris nitidis. Elytris thorace ter longioribus, fere duplo latioribus, regulariter et fortiter pupillatim punctato-striatis, interstitiis nitidis uniseriatim punctulatis pilosisque. Femoribus parum angulatis, denticulo parvo instructis.

Ma s: metasterno et abdominis segmento primo late impressis.

Corp. long. 5 mm.

Hab. Italia. provincia Ancona: Monte Conero.

Die interessante Art, deren ausführliche Beschreibung an anderer Stelle veröffentlicht wird, besitzt winzige, schwarze Augen, die ganz schwach vorspringen und aus sechs bis acht undeutlichen Ocellen bestehen. Von *planophthalmus* schon durch die Grösse und Bildung der Fühler, von *Phasma* durch gezähnte Schenkel und den Glanz, von *Henoni* durch das Stirngrübchen und den beinahe vor der Mitte verbreiterten Halsschild unterschieden.

Drei Stück von mir aus Laub gesiebt; Hummle r fing neun Stück, die meisten des Abends im Zwi elicht unter trockenem Laub auf dem Boden. Da das Thierchen die Gewohnheit hat, sich an Blattstiele anzuklammern, ist es schwer mit dem Sieb zu erbeuten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Flach Karl L.

Artikel/Article: [Otiorrhynchus Hummleri n.sp. \(Troglorrhynchus\). 245](#)