

Uebersicht der mit *Zonabris variabilis* Pall. zunächst verwandten Coleopteren-Arten.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

(Schwarz, Flügeldecken schwarz, 3 Querbinden auf den letzteren gelb, eine an der Basis, die zweite dicht vor der Mitte, die dritte vor der schwarzen Spitze.)

- 1" Kleiner, die vorletzten Fühlerglieder quer, Kopf sehr fein und dicht, Halsschild noch feiner, gedrängt, kaum sichtbar punktirt.
- 2" Kopf und Halsschild ziemlich lang, zur Spitze allmählig kurz und mehr anliegend behaart. Halsschild nicht oder wenig breiter als lang, vorne kurz glockenförmig eingeschnürt; auf den Flügeldecken herrscht die gelbe Färbung vor, die vorderste schwarze Binde in der Mitte jeder Decke schlitzartig verengt, meist auch daselbst getrennt, die beiden hinteren gelben Binden erreichen den Seitenrand. Long. 8—9.5 mm. — Südrußland (Samara, Poltava, Sarepta), Transkaukasien. **pusilla** Oliv.
- 2' Kopf ziemlich lang, abstehend, Halsschild äußerst kurz, kaum sichtbar, nur die Seiten deutlicher kurz behaart; Flügeldecken mit ganz kurzer, gleichartiger, fast anliegender Behaarung. Halsschild quer, von der Mitte zur Spitze stark glockenförmig verengt. Auf den Flügeldecken herrscht die schwarze Färbung vor; die gelbe Mittelbinde erreicht nicht die Seitenrandkante, sie ist oft auf eine schräge Makel reducirt, die vordere gelbe Binde ist auf 1 oder 2 gelbe Flecken beschränkt, die vorderste schwarze Binde ist nicht getheilt und meist breit, die schwarze Spitzenbinde ist breiter und am Vorderrande schwach gebuchtet. Fühler kurz, viel kürzer als bei der vorigen Art, den Hinterrand des Halsschildes nicht erreichend, zur Spitze kräftig, beim ♂ noch stärker verdickt. Long. 8—10 mm. Südbosnien, Herzegowina (Nevesinje, Ubli etc., häufig.) **bosnica** n. sp.
- 1' Größer, die verletzten Glieder der schlanken Fühler nicht quer, Kopf und Halsschild normal, stark und wenig gedrängt punktirt, Oberseite abstehend, die Flügeldecken zur Spitze allmählig kürzer, geneigt schwarz behaart. Halsschild nicht quer. Long. 10—16 mm. — Südeuropa, Kaukasus. **variabilis** Pallas.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Uebersicht der mit *Zonabis variabilis* PALL. zunächst verwandten Coleopteren-Arten. 230](#)