## Übersicht der Entomogonus-Arten aus der Verwandtschaft des E. Barthelemyi Sol.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Die hieher in Betracht kommenden Arten sind *E. Barthelemyi* Sol., *angulicollis* Muls. (*Haagi* Alld.) und eine neue Art, sämtliche aus Kleinasien und Syrien.<sup>1</sup>)

- 1" Seiten des Halsschildes hinter der Mitte stark lappenförmig verbreitert, dahinter zur Basis stark ausgeschnitten und gleichzeitig neben dem Ausschnitt ungerandet. Halsschild längsstrigos punktiert. Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken ist an der Spitze nicht verschmälert, sondern an dieser etwas abgerundet erweitert und etwas löffelförmig ausgehöhlt. Prosternalfortsatz dreifurchig, die änßeren Marginalfurchen manchmal schwach ausgeprägt. Syrien.

  Barthelemyi Sol.
- 1' Seiten des Halsschildes hinter der Mitte schwächer lappig verbreitert, mit vollständiger Seitenrandung. Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken an der Spitze nicht verbreitert und nicht grübchenförmig ausgehöhlt. Halsschild manchmal mit länglichen Punkten, aber nicht längsstrigos punktiert.
- 2" Seiten des Halsschildes hinter der Mitte kräftig gerundet erweitert, stark gerandet und gleichzeitig dieser Rand ziemlich hoch aufgebogen. Kopf und Halsschild dicht und stark punktiert, die Punkte auf dem Halsschilde stehen meist frei, aber sind partienweise etwas länglich. Basis des Halsschildes leistenartig abgesetzt und davor quer vertieft. Flügeldecken fein punktiert, mit angedeuteten Punktstreifen, ganz wie bei der vorigen Art. Prosternalfortsatz dicht rugulos stark punktiert, fast ungerandet. Schwarz. Das ♀ ist kürzer und breiter gebaut. Long. 12 −18 mm.

Eine neue Art, welche in der Mitte zwischen den zwei bekannten steht. Sie wurde mir von Herr Ad. Gassner (Wien) aus Kleinasien: Taurus, mitgeteilt; Herr Demaison erhielt sie aus Tokat.

Gassneri n. sp.

2' Seiten des Halsschildes dicht hinter der Mitte schwach gerundet erweitert, sehr fein, vollständig gerandet, der Rand nicht aufgebogen- Die ganze Oberseite nur sehr fein punktiert. Die umgeschlagenen Seiten der Flügeldecken gegen die Spitze etwas verschmälert. Prosternalspitze beim of undeutlich, beim Q deutlich dreifurchig. — Anatolien, Caramanien. — E. Haagi Allard. angulicollis Muls.

<sup>1)</sup> Siehe auch Wiener Ent. Ztg. 1903, pg. 18 und 20.

## **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Übersicht der Entomogonus-Arten aus der

Verwandtschaft des E. Barthelemyi SOL. 30