

Description de Diptères nouveaux

Par le Dr J. Villeneuve, de Rambouillet.

Il s'agit de trois espèces nouvelles du Midi de la France, l'une des Pyrénées-Orientales, les deux autres de Provence.

I. *Dioctria claripennis* n. sp.

Dioctr. atricapillae simillima, differt in ♂ alis non obscuris atque thorace cinereo-pollinoso. Femina ignota.

Tellement semblable à *Dioctria atricapilla* qu'à première vue, on pourrait les confondre. Il suffira donc d'indiquer les caractères différentiels, à savoir :

♂. Face d'un noir sombre et mat, le tubercule frontal qui porte les antennes à peine accusé; la face postérieure de la tête couverte d'une pruinosité cendrée à l'exception d'une place dénudée de chaque côté, la teinte passe au blanchâtre le long du bord oculaire sans prendre toutefois l'aspect du large liseré blanc de *D. atricapilla*.

Le thorax couvert, lui aussi, d'une pruinosité blanche très dense avec 4 lignes noires, les 2 médianes étroites et rapprochées, les 2 externes larges et sinueuses.

Ailes entièrement hyalines; cuillerons bordés de poils blancs.

Abdomen plus robuste, d'un noir brillant; l'hypopyge autrement constitué présente, en dessous, au devant de la tubérosité génitale une petite crête transversale hérissée de poils noirs serrés.

Les pattes présentent encore le caractère d'avoir les hanches intermédiaires entièrement d'un noir brillant, sans pruinosité à la base. Patrie: Digne (Basses-Alpes), 2 ♂. Vole en juin.

II. *Chortophila parcepilosa*, n. sp.

Chort. trichodactylae simillima, differt tibiis posticis non ciliatis, hypopygio subtus elongato.

Apparentée à *Chort. trichodactyla* Rond. dont elle a la coloration et la taille ainsi que les métatarses des pattes intermédiaires couverts de soies couchées, celles-ci un peu moins longues. Elle s'en différencie immédiatement, chez le ♂, par les tibias postérieurs dépourvus de ciliation régulière sur leur bord antérieur*), le côté interne**) seulement muni de quelques soies raides inégales — par l'hypo-

*) Innen, dem Körper zugekehrt, apud Stein.

**) Außen, apud Stein.

pyge dont le relief hérissé de fins poils noirs couvre, en dessous, les 2 derniers segments abdominaux et soulève aussi très fortement la lame ventrale du segment qui les précède, en sorte que, vu de profil, l'abdomen apparaît nettement épaissi dans ses $\frac{2}{3}$ postérieurs. Epine costale de l'aile à peu près nulle; fémurs postérieurs nantis sur leur bord inféro-externe d'une rangée de soies courtes dont les 4-5 dernières sont plus longues et plus robustes.

♀ Entièrement d'un gris jaunâtre avec une ligne terne sur le thorax et une bande médiane sombre sur l'abdomen. Bande frontale rouge dans sa moitié antérieure, noire en arrière, avec 2 soies entrecroisées. Longueur: 4.5—5^{mm}.

Patrie: Vernet-les-bains (Pyrénées-Orientales). 2 ♂, une ♀. Vole en juillet.

III. *Acyglossa pollinosa* n. sp.

Véritable *Acyglossa*, ayant la conformation de la tête et des antennes de *A. atramentaria* Meig., sauf pour le péristome beaucoup plus large — ayant également la disposition si caractéristique des nervures de l'aile chez *Acyglossa*, à savoir: côte de l'aile ne dépassant pas ou à peine l'extrémité de la 3^e nervure (caractère déjà signalé par Pokorny); 4^e nervure arquée avant sa terminaison où elle diminue d'épaisseur au point de s'effacer parfois un peu avant le bord de l'aile. Nervures transversales rapprochées, la postérieure absolument droite.

Les lèvres de la trompe dans ce genre ne sont pas nulles ou absentes, comme l'a fait encore remarquer Pokorny et avec raison; rudimentaires, peu développées et placées ordinairement dans le prolongement de la trompe chez *Acygl. atramentaria*, elles sont, au contraire, chez l'espèce plus robuste *Acygl. pollinosa*, plus épaisses et rabattues sur l'extrémité de la pipette qui est aussi plus courte. Il en résulte que le caractère indiqué par le vocable générique n'a qu'une valeur relative et en tous cas de second ordre.

— *Robusta*.

♂. *Nigra, cinereo-pollinosa; capite albo-micante, genis latis, peristomate latiore. Antennae nigrae atrique palpi. Thoracis lineae angustae duae in medio vix perspicuae. Abdomen disco margineque pilis longis omnino cinctum; incisuris, tessellis minimis et vitta media angusta, interrupta, nigris. Hypopygium nigrum, paulum incrassatum, pilosum. Pedes nigri, setosi. Alae hyalinae basi flavidae. Squamae albae, halteribus ferrugineis.*

♀. *Leviter coerulescens*; *frontis vitta media lata, brunnea, setis duabus parvis decussatis; orbitis angustis. Thoracis lineae mediae magis perspicuae. Abdomen apice acutum. Caetera ut in mare.*
Longitudo = 6–6.5^{mm}.

Patria: Croatia, Helvetia, Gallia meridionalis.

Vole en mai.

♂. Noire, couverte d'une pruinosité gris-cendrée plus accentuée sur l'abdomen. Yeux distants, séparés par de fines orbites blanches et une étroite bande frontale noirâtre. Face grise à reflets blancs; péristome ayant à peu près la largeur d'un $\frac{1}{3}$ du diamètre oculaire vertical. Antennes courtes, noires; chète renflé à sa base. Pipette robuste, Palpes noirâtres.

Thorax obscur avec les vestiges de 2 lignes noires médianes, plus visibles en avant. St. = 1 : 1; dc. = 3; pra longue. Scutellum de même coloration, avec 2 longues soies apicales entrecroisées.

Abdomen portant une bande médiane étroite, interrompue aux incisures et formée d'une série de taches triangulaires très allongées.

Hypopygium modérément développé, sans lamelles apparentes.

Pattes robustes, tibiais postérieurs nus en dedans, mais munis en arrière, en dehors et en avant de longues et fortes soies. Ongles et pelotes allongés.

Ailes jaunies faiblement à la base. Epine costale nulle.

Cuillerons blancs, égaux. Balanciers ferrugineux.

♀. D'un gris légèrement bleuâtre sur lequel se détachent mieux les lignes du thorax qui tendent à se confondre en une bande médiane; de chaque côté, une bande large, peu visible, interrompue à la suture. Front presque aussi large que l'épistome, ayant une bande médiane brunâtre munie de 2 petites soies entrecroisées, séparée des yeux par des orbites environ 3 fois plus étroites. Abdomen pointu en arrière, montrant chez tous mes exemplaires, une étroite lamelle assez longue qui se présente comme une sorte de tarière perpendiculaire à l'axe du corps.

Les tarses, grêles chez le ♂, sont plus épais chez la ♀, surtout à leur portion moyenne.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: [Description de Diptères nouveaux. 202-204](#)