download unter www.biologiezentrum.at

Addimenta ad „Fauna colleotterologica Sicula" (Histeridae) a dom. Francesco Vitale, Messina.

Von **K. Labler**, Prag.

In den „Atti della R. Academia Peloritana" 1929, VIII, pp. 107—146 publiziert H. Geom. Fr. Vitale eine „Fauna coleotterologica Sicula, Scaphiidi ed Histeridi". Auf Grund des in meiner Sammlung befindlichen Materials möchte ich hiezu folgendes ergänzend nachtragen.

Hypocaeculus rubripes Er. *a. arenarius* Mars. zit. nur aus Italia: Piemonte (Porta), habe ich auch aus Riccione (leg. Roland).

Saprinus (Baeckmanniolus) dimidiatus Jll. fehlt in obiger Zusammenstellung überhaupt! Bekannte Fundorte*) sind:
Italien: Rom, Pompei, Salerno, Rimini (Roubal), Riccione (Labler), Grado (Bickhard).
Sizilien: Sicilia (Labler), Mondello, Palermo (Flach).

Hister uncostriatus Mars. fehlt ebenfalls.
Palermo (Labler, vid. Reichardt).

---

*) Siehe auch Bickhardt H. „Verbreitung von Sapr. (Pachylopus) dimidiatus Jll." Ent. Bl. 1913, Heft 7/8.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: 49

Autor(en)/Author(s): Labler Karel

Artikel/Article: Addimenta ad "Fauna colleotterologica Sicula" (Histeridae) a dom. Francesco Vitale, Messina 18