## Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(9. Fortsetzung.)

Adspersella Kollar. — 6, Grinzing an Gebüschen gefangen. Raupe auf Dolden.

Silerella Stt. — 7, Grinzing und Kahlenberg an Waldrändern. Raupe auf Dolden.

Ocellana F. — 5, 8, Mauer, Mödling und Bisamberg aus Gebüschen gescheucht.

Alstroemeriana Cl. — 8, 9, in der Wiener Gegend in jungen pflanzenreichen Gebüschen, selten.

Purpurea Hw. — 8, Prater am Schüttelzaun, selten. Raupe auf Daucus Carota.

Liturella Hb. — 7, Mauer im Gemeindewald, aus Hecken gescheucht, Tivoli in Remisen. Raupe auf Hypericum.

Conterminella Z. — 7, 8, Mauer auf der Himmelswiese, aus Gebüschen gescheucht. Raupe in den Endtrieben an Salix Caprea.

Impurella Tr. — 7, auf dem Gahns um Abies excelsa, selten.

Applana F. — 4; 7, 8, an Waldrändern und in Auen um Hecken. Raupe auf Conium, Daucus, Chaerophyllum sylvestre.

Capreolella Z. — 4, 8, auf Berglehnen in der Wiener Gegend.

Angelicella Hb. — 6, 7, Mödling, Eichkogl, Mauer, an Gebüschen.

Cnicella Tr. — 6, 7, in der Wiener Gegend auf Berglehnen um junges Gehölz. Parilella Tr. — 6, Weidling am Bach und Mauer um Birkengebüsch, selten.

Ferulae Z. — 7, Eichkogl in jungen Gebüschen auf Grasplätzen, sehr selten. Raupe auf Doldenpflanzen.

Furvella Tr. — 7, Perchtholsdorf und Giesshübel auf Berglehnen in Gebüschen auf Doldenblüthen. Raupe auf *Dictamnus albus* in zusammengesponnenen Blättern.

Depressella Hb. — 6, 7, auf Berglehnen am Liechtenstein bis Baden. Raupe in den Dolden von *Daucus* und anderen Umbelliferen.

Pimpinellae Z. — 7, 8, Mauer, Bisamberg an Waldrändern im Gebüsch. Raupe in den Dolden von *Pimpinella saxifraga*.

Libanotidella Schl. — 9, auf dem Bisamberg um Weingärten, selten.

Badiella Hb. — 8, Mauer auf Quercus und Pinus.

Cervicella HS. — 4, 5, auf den Berglehnen von Mödling bis Baden vorkommend.

Heracliana De Geer — 6, im Helenenthal und bei Siegenfeld auf Dolden.

Olerella Z. — 7, Mauer im Gemeindewald an freien Stellen, auf Dolden sehr selten.

Albipunctella Hb. — 7, Mauer, Gemeindewald, am Waldrande der Wiesen, von Abies pectinata geklopft. Raupe auf Chaerophyllum.

Douglasella Stt. - 7, auf Eichen-

stämmen am Waldrande auf der Himmelswiese.

Chaerophylli Z. — 7, Lainz, Hütteldorf, Halterthal an Waldrändern auf Dolden. Raupe in den Blüthen von Chaerophyllum bulbosum.

Artemisiae Nick. — 6, bei Baden um Artemisien.

Heydenii Z. — 8, 9, entwickelt aus Raupen, die ich am Schneeberge auf Doldenblüthen gesammelt hatte.

Nervosa Hw. — 6, in Gemüsegärten. Raupe in den Blüthen von Daucus Carota.

Dictamnella Tr. — 8, auf den Berglehnen von Gumpoldskirchen bis Baden. Raupe in den Blüthen von *Dictamnus*.

## Psoricoptera Stt.

Gibbosella Z. — 8, 9, Mauer, Gemeindewald an Quercus, nicht selten. Raupe auf Quercus.

#### Gelechia Z.

Pinguinella Tr. — 6—8, im Prater an italienischen Pappeln häufig. Raupe auf *Populus*; Verpuppung in Rindenritzen.

Nigra Hw. — 6, 7, im Prater an Silberpappelstämmen. Raupe auf Populus alba.

Muscosella Z. — 7, Mauer an Eichenstämmen. Raupe in gerollten Blättern auf *Populus* und *Salix*.

Rhombella Schiff. — 7, in Obstgärten, besonders auf Birnbäumen. Raupe in eingerollten Blättern von Pyrus, Malus und P. communis.

Hippophaëlla Schrk. — 7, bei Gloggnitz am Silberberg, selten, auch auf dem Laaerberg und bei Leobersdorf. Raupe an Hippophaë rhamnoides.

Albicans Hein. — 7, Laaerberg, in den Remisen, selten.

Tephriditella Dup. — 4, 5, Mödling auf kahlen Bergen.

Spurcella HS. — 5, Mödling auf kahlen Berglehnen, auf Gebüschen.

Holosericella HS. — 7, Heuplacke am Schneeberge, sehr selten.

Distinctella Z. — 7, in den Remisen bei Tivoli und am Laaerberg, in Rodaun um Gebüsche und junge *Pinus*. Raupe auf *Genista tinctoria* zwischen zusammengezogenen Blättern.

Scotinella HS. — 6, Mödling bei der Schiesstätte um junge *Pinus*, in den Tivoli-Remisen, selten.

Sororculella Hb. — 6, Tivoli, Mauer und Rodaun um junges Gebüsch, selten. Raupe auf niederen Pflanzen und Salix.

Flavicomella Z. — 4, 5, auf Prunus spinosa, selten. Raupe überwintert in Gespinnsten auf Prunus spinosa.

Velocella Dup. — 5, 6, auf der Boden wiese am Gahns und bei Mauer auf Haidekraut. Raupe auf Callunna und Vaccinium.

Decolorella Z. — 7, Alpeleck und Saugraben am Schneeberg.

Ignorantella HS. — 6, Mödling auf dem Liechtenstein, selten.

Peliella Tr. — 6, im Prater auf Weissdorn und Pflaumbäumen. Raupe auf Crataegus, Prunus spinosa, auch Pomaceen.

Ericetella Hb. — 4—8, überall wo Haidekraut vorkommt. Raupe auf Callunna und Vaccinium.

Infernalis HS. — 7, Schneeberger Alpen, auf dem Alpeleck und der Bodenwiese. Raupe auf Vaccinium Myrtillus.

Lentiginosella Z. — 7, auf Berglehnen, in Remisen bei Tivoli und am Bisamberg. Raupe auf Genista tinctoria und Erythraea Centaurium.

Mulinella Z. — 6, Liechtenstein um Hecken, selten.

Interruptella Hb.— 6, auf dem Bisamberge um Juniperus.

Petasitis Pfaff. — 7, Saugraben und Heuplacke am Schneeberge. Raupe auf *Tussilago* zwischen Blättern.

Malvella Hb. — 7, in Gärten um Malven. Raupe lebt in Samenkapseln der Althea rosea.

Galbanella Z. — 6, im Mauererwald an Baumstämmen.

Continuella Z. — 7, auf dem Alpeleck in Holzschlägen.

Perpetuella HS. — 7, auf der Heuplacke und am Waxrigel um Pinus Mughus.

Solutella Z. — 4, 6, von Mauer bis Vöslau auf den Berglehnen nicht selten.

Longicornis Curt. — 6, Gahns auf der Bodenwiese. Raupe auf Callunna. Elatella HS. — 7, Saugraben, am

Elatella HS. — 7, Saugraben, am Schneeberge auf Steingerölle.

Albifemorella Hofm. — 7, Saugraben am Schneeberge auf Steingerölle und unter Steinen. Raupe auf Rumex, welcher im Steingerölle wächst.

Diffinis Hw. — 6, Rodaun, Gaisberg um junge *Pinus*. Raupe im unteren Theil des Stieles von *Rumex acetosa*.

Electella Z. — 7, Hoheward, Trenkwiese, Alpeleck am Schneeberge auf Abies excelsa.

Scalella Sc. — 5, 8, Mauer an Eichenstämmen und Laubgebüsch. Raupe auf Quercus.

Lugubrella F. — 7, einmal einige Stücke auf der Brandstattwiese am Schneeberge gefangen.

Viduella F. — 7, Waxrigel am Schneeberg zwischen *Pinus Mughus*, sehr

Luctuella Hb. — 7, auf dem Alpeleck einmal zwei Stück auf *Epilobium* gefangen.

Tessella Hb. — 7, überall in der Wiener Gegend auf Berberis vulgaris. Raupe auf Berberis in einem Gespinnste.

Maculatella Hb. — 6, 7, auf den Berglehnen von Tivoli bis über Baden, um Hecken, selten.

Cytisella Tr. — 6, Bisamberg, Mauer, Giesshübel, Eichkogel, aus Sträuchern gescheucht, sehr selten.

#### Brachmia Hein.

Mouffetella Schiff. — 7, Mauer, Richardshof und auf den Alpen auf Abies excelsa. Raupe in versponnenen Blättern von Loniceren.

Nigricostella Dup. — 4, 5, in der Wiener Gegend auf Berglehnen. Raupe auf niederen Pflanzen wie Medicago sativa an den Endblättern.

#### Bryotropha Hein.

Latella HS. — 6, in den Laaerberger Remisen, selten.

Terrella Hb. — 6, 7, überall auf Wiesen, Hutweiden und Bergen, gemein. Raupe auf verschiedenen Grasarten.

Senectella Z. — 6, Mauer und Mödling auf grasreichen Berglehnen. Raupe wohl an niederen Pflanzen.

Minorella Hein. — 6, Mödling auf Berglehnen, 1839 gefangen.

Cinerosella Tgstr. — 7, auf der Bodenwiese auf dem Gahns, selten.

Affinis Dgl. — 6, im Prater am Schüttelzaun, einige Male gefangen.

Umbrosella Z. — 6, auf Berglehnen in der Wiener Gegend. Raupe auf Anthyllis vulneraria in Blüthen und Samen.

Basaltinella Z. — 7, um Steingerölle bei Rodaun und im Saugraben.

#### Lita Tr.

Inustella HS. — 6, auf trockenen Berglehnen bei Mödling, Baden u. s. w.

Psilella HS. — 6, 7, Mauer, bei der Schiesstätte und bei der Himmelswiese um Gesträuch. Raupe auf Artemisia campestris.

Diffluella Hein. — 7, Schneeberger Alpen, im Saugraben und auf der Bodenwiese.

Artemisiella Tr. — 6, überall um Wien, 7 auf den Alpen auf Wiesen. Raupe auf Thymus und Artemisia campestris.

. Atriplicella F. R. — 5, 8, überall um Wien. Raupe in zusammengesponnenen Blättern von Atriplex.

Salinella Z. — 7, Mödling beim schwarzen Thurm, auf *Pinus*.

Obsoletella F. R. — 5, 8, überall auf Atriplex laciniata. Raupe im Stengel dieser Pflanze; Metamorphose bei F. R. abgebildet; von mir 1838 entdeckt.

Tussilaginella Hein. — 7, Eichkogel und Lackerboden, am Schneeberg, um Tussilago. Raupe in den Blättern von Tussilago Farfara minirend.

Murinella HS. — 4, Mauer bei der Schiesstätte, auf Callunna. Raupe auf Callunna.

Rancidella HS. — 6, Berglehnen bei Mödling, Rodaun, selten.

Halonella HS. — 5, Mödling auf Berglehnen um Gebüsch, selten. Raupe auf Artemisia campestris.

Acuminatella Sircom. — 5, im Prater um Disteln in Gebüschen.

Ingloriella Hein. — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Alpeleck.

Hübneri Hw. — 7, Tivoli, in Remisen, auf Quercus, selten.

Maculea Hw. — 7, Tivoli, in Remisen, auf jungen Quercus.

Tricolorella Hw. — 6, 7, im Prater auf Crataegus, bei Mauer um Prunus spinosa. Raupe auf Stellaria Holostea.

Maculiferella Dgl. — 6, 7, Prater, an Zäunen und Baumstämmen.

Junctella Dgl. — 7, Tivoli, in Remisen, um Quercus.

Marmorea Hw. — 4, auf Prunus domestica und Populus.

Albifrontella Hein. — 5, in den Remisen bei Tivoli.

Kiningerella HS. — 6, an Gartenzäunen im Prater, in Altmannsdorf, Liesing und Hütteldorf, sehr selten.

Fischerella Tr. — 7, 8, Mödling, Gumpoldskirchen, Rodaun, um Saponaria officinalis. Raupe auf Saponaria officinalis in zusammengesponnenen Blüthenknospen.

Cauligenella Schmid. — 7, Mauer, um Eichengebüsch bei der Schiessstätte, selten.

Leucomelanella Z. — 7, Rodaun und Prater, auf Crataegus.

Tischeriella Z. — 6, 7, im Prater an Baumstämmen und Zäunen, selten.
Sestertiella HS. — 7, 8, im Prater

an Zäunen, Acer und Crataegus. Raupe auf Acer und Crataegus.

### Teleia Hein.

Vulgella Hb. — 7, in Gärten auf Obstbäumen, in Mauer, Mödling; im Prater, um Prunus spinosa und Crataegus. Raupe auf Obstbäumen und Crataegus

Scriptella Hb. — 6, Prater, Mauer, Tivoli, an Weiden, Weissdorn- und Ahornhecken, sehr selten. Raupe auf Acer, Crataegus und Salix.

Alburnella Z. — 6, 7, Weidling-am-Bach, Mödling, auf Betula.

Sequax Hw. — 6, überall um Wien und auf Alpen um Sträucher. Raupe auf Helianthemum vulgare und anderen niederen Pflanzen in zusammengesponnenen Blättern.

Fugitivella Z. — 6, 7, im Prater, an Zäunen, Ahornen und Ulmen. Raupe auf *Ulmus* und *Acer*, Verpuppung in den Rindenrissen.

Fugacella Z. — 6, 7, Prater, an Zäunen, Ahorn- und Ulmenstämmen. Raupe auf Acer, Populus und Ulmus.

Humeralis Z. — 4—8, Mauer an Quercus und Fagus. Raupe wohl auf Laubhölzern?

Proximella Hb. — 6, im Prater an Zäunen und Pappelstämmen, in Mauer, Weidling - am - Bach, an Birken und Eichen. Raupe auf Betula, Alnus und anderem Laubholz.

Notatella Hb. — 5, Remisen bei Tivoli, bei Mauer, im Prater, um Hecken. Raupe auf Salix.

Triparella Z. — 6, in Remisen bei Tivoli und am Laaerberg, dann bei Mauer im Eichengebüsch. Raupe auf niederen Pflanzen.

Luculella Hb. — 6, im Prater, an Zäunen, Pappeln und Weidenstämmen. Raupe in Moderholz nach Frey, vielleicht in morschen Stämmen von Salix.

Dodecella L. — 6, Mauer, Mödling, auf Pinus, 8 auf Alpen um Pinus Mughus. Raupe in Knospen von Pinus. (Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 9. Fortsetzung. 129-132