

## Ergänzungen und Berichtigungen zu Hoffmann-Klos „Die Schmetterlinge Steiermarks“ (Bd. I-VII, 1914-1923).

Von H. Kiefer, Admont.

(Schluß.)

### III. Band Noctuidae (Fortsetzung).

458. *Hydroecia nictitans* Bkh. a. *erythro stigma-obscura* Tutt.  
1 ♂ St. Oswald bei Oberzeiring 20. IX. (K) rev. Dr. Rebel. Grundfarbe dunkelrotbraun, fast zeichnungslos mit orangegelber (statt weißer) Nieren- und Ringmakel, Zapfenmakel verschwommen.
498. *Caradrina lenta* Tr. Wildon (Schieferer), ist nicht in der Sammlung. (K)
504. *Amphipyra tragopoginis* L. a. *nigrescens* Spul. 1 ♂ aus Graz (Schieferer) hat schwarzgraue Vorderflügel mit lichtem Saumfelde. (K)
509. *Amphipyra cinnamomea* Goeze.  
1 ♂ Hilmteich bei Graz 26. VIII. 1884 (Schieferer) (siehe pag. 131).
529. *Cosmia abluta* Hb. 1 ♀ Rosenberg 24. VII. 1888 a. L. (Schieferer).
551. *Orrhodia erythrocephala* a. *impunctata* Spul.  
1 ♀ Ehrenhausen (Schieferer).
564. *Calocampa vetusta* Hb. a. *albida* Spul.  
1 ♂ Unterzeiring (K), 1 ♀ Graz (Schieferer).
577. *Cucullia thapsiphaga* Tr. fehlt nicht; ♂ ♀ Bärenschütz (Schieferer).
581. *Cucullia umbratica* a. *albida* Spul. Oberzeiring 25. VI. (K) rev. Hoffmann.  
1 ♂ Graz (Schieferer).
582. *Cucullia campanulae* Frr.  
1 ♀ Umgebung von Graz (Schieferer); das ♂ vom Reunerkogel bei Graz (leg. Schieferer) ist *lucifuga* Hb.! (K)  
— *Heliothis cardui* Hb. Gösting bei Graz ♂ ♀ (Schieferer).
594. *Heliothis scutosa* Schiff.  
2 ♂ ♂ aus Graz (leg. Dorfmeister).  
— *Acontiola lascivialis moldavicola* H.S. 1 ♀ 20. VII. Marburg (Schieferer) ist wahrscheinlich verschleppt worden (rev. Dr. Zerny).  
— *Euclidia triquetra* F. Mürzzuschlag 1 ♂ (Schieferer), Styria 1 ♀ (Dorfmeister) (siehe pag. 216).
640. *Catocala sponsa* L. 1 ♂ Styria (Dorfmeister) ist noch Stammform! (K) (siehe pag. 220), a. *fasciata* Spul. stecken auch 1 ♂ 1 ♀ aus Graz von Schieferer in der Sammlung.
643. *Catocala fulminea* a. *xarippe* Butl. 1 ♀ aus Reun (Schieferer).
644. *Catocala conversa* Esp. ist nur in 2 Exemplaren der Form *agamos* Hb. ♂ ♀ vom Hilmwald bei Graz vertreten. (leg. Schieferer) Stammform fehlt!
648. *Toxocampa craccae trans. ad a. immaculata* Stgr. 1 ♂ Styria leg. Dorfmeister.  
Nierenmakel nur schwach dunkel begrenzt, sonst zeichnungslos, auch die Vorderrandsfleckchen fehlen. Alle Flügel nach außen breit bräunlich verdunkelt! (K).
650. *Parascotia fuliginaria* a. *flava* Horm.  
1 ♂ (Trendl), 1 ♀ (Schieferer) beide aus Graz.
674. *Polyploca ridens* F. ♂ ♀ Styria (Dorfmeister).

### IV. Band Geometridae.

713. *Acidalia deversaria* H.S. ein aberratives ♀ aus Graz 22. VIII. (leg. Schieferer) Zeichnung verloschen, nur Mittel- und Fransenpunkte deutlich erkennbar. (K)
721. *Acidalia fumata* Sthp.  
1 ♀ aus der Umgebung von Graz (Schieferer) ist eine bis auf den lichtbraunen, stark gezackten Außenstreifen zeichnungslos-helle Form! (K)

734. *Codonia albiocellaria* Hb. 1 ♀ und weiters 1 ♂ der Form *therinaria* Bastelb. 25. VII. aus Graz (Schieferer).  
 739. *Codonia linearia* Hb. 1 ♂ Umgebung von Graz 8. VIII. (Schieferer) nur 12 mm Vdflg., in Farbe der Stammform, also nicht rötlich bestäubt, daher auch nicht *strabonaria* Z.!?  
 740. *Rhodostrophia vibicaria* Cl.  
 1 ♀ aus Oberzeiring 25. VII. (K) bildet einen starken Uebergang zu a. *fasciata* Rbl.  
 745. *Ortholitha plumbaria* F. a. *extradentata* Prt. 1 ♂ 19. V. Oberzeiring. (K)  
 749. *Ortholitha bipunctaria* a. *gachtaria* Frr.  
 2 ♂ ♂ dunkel bräunlichgrau aus Hartberg und am Bachern (Schieferer).  
 773. *Eucosmia undulata* a. *subfasciata* Reuter.  
 1 ♂ aus Reun (Schieferer) mit deutlicher Mittelbinde. (K)  
 791. *Larentia immanata* a. *thingvallata* Stgr.  
 1 ♂ Mühlau bei Admont (leg. Strobl) ist ab. *marmorata* Hw.  
 ab. *pythonissata* Mill. fehlt!  
 a. *punctumnotata* Hw. Mühlau ♂. (K)  
 802. *Larentia salicata* a. *probaria* H.S. vom Grazer Schloßberg ♂ ♀ (Schieferer) sind sicher noch Stammform! (K)  
 821. *Larentia infidaria* a. *primordiata* Rätz. 1 ♂ vom Bachern (Schieferer) ist kleiner und ganz ohne goldgelbe Bestäubung, daher sicher diese Form! (K) siehe pag. 161!  
 851. *Larentia bifasciata* Hw. (= *unifasciata* Hw.). 1 ♀ aus Turrach und 1 ♀ aus dem Gesäuse (leg. Strobl) fehlen in der Sammlung! (siehe pag. 187).  
 874. *Asthena anseraria* H.S. Graz ♂ ♀ (Schieferer).

#### V. Band Geometridae (Fortsetzung).

879. *Eupithecia pyreneata* Mab. 1 ♂ aus Admont fing ich nicht Ende August, sondern am 28. Juli (K), siehe pag. 92.  
 884. *Eupithecia strobilata* Bkh. 1 ♂ Aigen bei Admont a. Zaun 27. V. 1915 (K) rev. Klos.  
 886. *Eupithecia insigniata* Hb. 1 ♂ Admont 27. IV. (K) rev. Hoffmann. (Das Stück mußte wegen Schimmelbildung entfernt werden.)  
 892. *Eupithecia pimpinellata* Hb. Reun ♂ ♀ (Schieferer). Das ♂ hat eine tiefer graue Grundfarbe und dürfte a. *lantoscata* Mill. sein! (K)  
 897. *Eupithecia absinthiata* Cl.  
 1 ♂ vom Hilmteich und 1 ♀ aus Tobelbad von Schieferer in der Sammlung (siehe pag. 107).  
 899. *Eupithecia denotata* v. *atraria* H.S. 1 ♀ vom Ruckerlberg b. Graz el. 31. V. Dieses Stück wurde von Schieferer unter *castigata* Hb. eingereicht! (K)  
 909. *Eupithecia veratraria* H.S. 2 ♀ ♀ vom Plabutsch (Schieferer).  
 910. *Eupithecia helvetica* v. *arceuthata* Frr. 1 ♂ Rainerkogel (Schieferer).  
 931. *Eupithecia innotata* Hufn.  
 1 ♀ Hilmwald und 1 ♂ der dunkleren a. *fraxinata* Crewe 28. VI. 1889 ebendort (Schieferer).  
 932. *Eupithecia exigua* Stph, Admont 1 ♀ 26. V. (K) rev. Klos.  
 935. *Eupithecia pumilata* a. *tempestivata* Z. 1 ♂ Rainerkogel (Schieferer).  
 941a. *Phibalapteryx corticata* Tr. ♂ ♀ als Fundort von Schieferer „Styria“ angegeben. (K.) siehe pag. 145.  
 942. *Phibalapteryx tersata* a. *tetricata* Gn. ♂ ♀ aus der Umgebung von Graz (Schieferer).  
 946. *Abraxas grossulariata* L. wurde von mir im Ennstale bisher nicht gefunden. Strobls Stück aus Admont (?) fand sich nicht in der Sammlung. (K)  
 948. *Abraxas marginata* a. *pollutaria* Hb. in Admont nicht gefunden! (K)  
 956. *Numeria capreolaria* v. *donzelaria* Dp. ist geflogen, also noch Stammform, die ich bei Admont öfter fand. (K)

#### VI. Band Geometridae (Fortsetzung).

968. *Selenia tetralunaria* Hufn. ♂ ♀ Graz (Schieferer). Beide Stücke sind mehr ledergelb, wie *lunaria* gefärbt. (K)

974. *Angerona prunaria* L.  
a. *pallidaria* Prout. Graz ♂ (Schieferer).  
a. *pickettaria* Prout. Graz ♀ (Schieferer).
992. *Hibernia defoliaria* Cl. 1 ♂ Admont (Strobl) wurde im Oktober! gefangen (vergleiche pag. 29!). (K)
998. *Amphidasis betularia* L. 1 ♀ 15. V. 1898 vom Ruckerberg b. Graz (leg. Schieferer); eine ganz dunkle a. *insularia* Th.-Mieg ist Uebergang zu a. *doubledayaria* Mill. (K)
1001. *Boarmia gemmaria* Brahm.  
1 ♂ aus Johnsbach (Gesäuse) vom 31. VIII. (leg. Strobl) ist eine geflogene *secundaria* Schiff.! (K)
1009. *Boarmia lichenaria* Hufn.  
Von Schieferer befindet sich 1 ♀ aus Mürzzuschlag in der Sammlung; aus Admont kein Stück! (K) (vergl. pag. 45).
- 1012a. *Boarmia bistortata* Goeze.  
1 sehr lichtiges ♀ vom Hilmwald b. Graz 28. VII. (Schieferer) mit nur 13 mm Vdflgl. dürfte wohl diese Art sein! (K) (vergl. pag. 48.)
1027. *Gnophos caelibaria* H.S. Kalbling b. Admont 18. VII. bei 2000 m (leg. Strobl) ist a. *seniliaria* Fuchs! (K)
1029. *Dasydia tenebraria* Esp. vom Natterriegel b. Hall 1 ♂ 26. VII. (leg. Strobl). Bogenstreifen vor dem Saum auf der Unterseite der Flügel schwach angedeutet — bildet einen starken Uebergang zur a. *innuptaria* H.S. (K)
1038. *Ematurga atomaria* L. 12. VI. 1896 Rosenberg bei Graz 1 ♀!! (Schieferer) stark verdüstert, mit gelbgefleckten Fransen *unicoloraria* ähnlich; dürfte der Form *ustaria* Fuchs angehören! (K)

#### VII. Band Nolidae, Syntomidae, Arctidae, Zygaenidae, Cochlidiidae, Psychidae, Sesiidae.

1075. *Nola (Celama) centonalis* Hb.  
Von Schieferer befindet sich 1 ♀ vom Ruckerberg b. Graz in der Sammlung.
1063. *Syntomis phegea* L. ♂ Untersteier, Rohitsch im Juni (K) ist a. *pfluemeri* Wacquant, nur fehlt auf den Vdflgl. statt des Mittelfleckes der untere weiße Fleck in der Reihe. (K);
1084. *Detiopeia pulchella* L. Aus Admont nur 1 ♀ in der Sammlung (leg. Strobl); ich fand den Falter im Laufe von 40 Jahren nicht! (K)
1086. *Miltochrista miniata* Forst. n. a. *agraphata* Kiefer. Eine neue Form unter den von Schieferer seinerzeit in Graz gesammelten Stücken: vollkommen zeichnungslos! sonst in Farbe der Stammform, 1 ♂ 26. VII. 1887 aus Graz. (K)
- 1087a. *Endrosa roscida* Esp. 1 kleines ♂ vom Gumpeneck bei Oeblarn (leg. Strobl) ist nicht diese Art, sondern *irrorella* v. *nickerli* Rbl. (K)
1113. *Zygaena carniolica* a. *hedysari* Hb. Trawiesalpe 1 ♂, Peggau 1 ♂ (Schieferer).
1120. *Cochlidion limacodes* Hufn. a. *ochracea* Seitz. ♂ ♀ Platte (Schieferer).
1127. *Oreopsyche plumifera* O., mein Admonter Stück (♀) war unrichtig bestimmt. (K) (vergleiche pag. 47).
1134. *Rebelia sappho* Mill. 1 ♂ vom 12. VI. 1894 (Schieferer) trägt Fundort Hilmwald bei Graz (?). Bisher nur aus Steinbrück bekannt! (K)
1156. *Sesia vespiformis* L. Strobls Stück aus Radkersburg 20. VII. fehlt in der Sammlung! (K)

Nachschrift. Ein neuer Nachtrag (III.) zur „Falterfauna des steirischen Ennstales“, welcher die Sammeljahre 1914 bis 1936 umfaßt und viele neue Funde bringt, soll demnächst in der „Int. Ent. Zeitschr.“, Frankfurt a. M. veröffentlicht werden. Admont, im Jänner 1938.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [Ergänzungen und Berichtigungen zu Hoffmann-Klos "Die Schmetterlinge Steiermarks" \(Bd. I-VII, 1914-1923\). Schluß. 102-104](#)