

Tinea columbariella Wck.: Taubenfedern, Hühnernester, Schwalbennester, Starennester, Taubenmist, Taubennester.

Tinea pallescentella Stt.: animal. Abfälle, Därme, Felle, Haut, Tierblasen.

Tinea lapella Hb.: Buchfinkennester, Hänflingnester, Hühnernester, Taubennester, Vogelnester.

Tinea semifulvella Hw.: Alte Hosen, Lumpen, Vogelnester, Wolle.

Tineola biselliella Hummel: animal. und vegetab. Abfälle, Baumwolle, Biskuits, Federn, Griefß, Haare, alte Hosen, trock. Insekten, Kasein, Kleie, Leinen, Lumpen, Mehl, Pelzwerk, trock. Schmetterlinge, Seide, alte und neue Stoffe, Weizenmehl, Wolle und Wollstoffe. Einmal in Salz gefunden.

Myrmecozela ochraceella Tgstr.: myrmekophil.

Dysmasia parietariella H. S.: vermorschtes Holz, Schimmel, Wursthäute, Salamiwurst.

Blabophanes imella Hb.: animal. Abfälle, Eulengewölle, Federn, alte Filzschuhe, faul. Holz, Kadaver und Leichen, Lumpen, Schweineborsten.

Blaboph. fenestratella Heyd.: animal. Abfälle, faul. Holz von Erle und Ulme.

Blaboph. ferruginella Hb.: animal. Abfälle, faul. Holz, Hornspäne, Wolle (besonders im Freien).

Blaboph. monachella Hb.: animal. Abfälle, Federn, Haare, faul. Holz, Pelzwerk, Schweineborsten, Vogelnester.

Monopis rusticella Hb.: animal. Abfälle, Federn, Haare, alte Hosen, Kadaver, Lumpen, Pelzwerk, faule Stoffe, Teppiche, Vogelnester.

Nemophora schwarziella Z.: vegetab. Abfälle, trock. Laub, Pflanzenreste, Mulm.

Nem. metaxella Hb.: vegetab. Abfälle, trock. Laub, Pflanzenreste.

Adela viridella Z. und *degeerella* L.: wie vorige.

Dortmund, Tremoniastraße 13, im Oktober 1941.

Seltsame Geometridenfunde.

Von Dr. Heinrich Kolar, Wien (Döbling).

Mag auch die jahrelang andauernde Verdunkelung dem Sammler manche Beschränkung auferlegen, es ist nicht zu leugnen, daß damit auch eine Art Naturschutz verbunden ist, weil viele, sonst durch die Lichtquellen gefährdete Arten geschont und in ihrem Bestand erhalten bleiben. In den Jahren vor der Verdunkelung sind mir zum elektrischen Licht in der Nähe eines Fensters, das in den Hausgarten geht, einige Spannerarten zugeflogen, die erwähnenswert sind. Eines Abends saß ein schneeweißes Spannerchen an der Wand. Zu meinem Erstaunen — es war schon im August — war dies ein ♀ von *Bapta bimaculata* F. in der ab. *bipunctata* Fuchs (9. VIII. 1938). Ob eine zweite Generation dieser Art bekannt ist, weiß ich nicht, in den Handbüchern konnte ich nichts darüber finden. Ein anderesmal saß ein auffallend schwarzer Spanner an der Decke. Es war ein ♂ von *Boarmia gemmaria* Br. in der seltenen ab. *rebeli* Aign. (30. VIII. 1939). Und im August desselben Jahres kam auch ein ♀ der südlichen *Larentia fluvialis* Hb. ans Licht (2. VIII. 1939).