©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Literaturauswahl

KOZHANTSHIKOV, I. V. (1956): Fauna der UdSSR, Psychidae.

LHOMME, L. (1938): Espèces et sous-espèces nouvelles à ajouter au Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique, Serié II. — Rev. Franc. Lep. **9**: 72—87.

LORKOVIC, Z. (1958): Die Merkmale der unvollständigen Speziationsstufe und die Frage der Einführung der Semispecies in die Systematik. — Uppsala Univ. Arskr. **7**: 159—168.

— (1961): Abstufungen der reproduktiven Isolationsmechanismen in der *Erebia-tyndarus*-Gruppe und deren Systematik. — XI. Int. Kongreß Ent. Wien 1960, **I**: 134—142.

MEIER, H. G. (1963): Zur Kenntnis der Gattungen *Pseudobankesia* gen. nov. und *Bankesia* Tutt. — Mitt. Münch. Ent. Ges. **53**: 1—23.

SAUTER, W. (1956): Morphologie und Systematik der schweizerischen *Solenobia*-Arten. — Rev. Suisse Zool. **63**: 451—550.

TUTT, J. W. (1900): A natural history of the British Lepidoptera, Vol. **II**, London

(Ausgegeben am 30. Juni 1971)

Anschrift des Verfassers: A-8720 Knittelfeld, Schillerstraße 29, Steiermark.

Aethes fennicana adelaidae Toll (Lep., Cochylidae) Ein Neufund für Österreich

Von WERNER THOMAS, Ober-Mörlen

Während einer Reise nach Österreich im Jahre 1970 konnte ich ein Dutzend Falter aus der ehemaligen *Lozopera*-Gruppe der Gattung *Aethes* fangen. Das Erscheinen des dritten Bandes der Microlepidoptera Palaearctica, Cochylidae, gab mir Anlaß, diese Gruppe, deren Arten sich äußerlich nicht mit Sicherheit trennen lassen, genitaliter zu untersuchen. Zu meiner Überraschung handelte es sich um nicht weniger als fünf Arten. Die interessanteste ist zweifellos *Aethes fennicana adelaidae* TOLL, die bisher nur aus gebirgigen Teilen Polens bekannt war (RAZOWSKI 1970). Die Nominatform kommt in Skandinavien vor.

Die Fundorte meiner Falter sind Austr. inf., Wolkersdorf 29. VII. 1970, 1 ♀ und Austr. inf., Bisamberg 29. VII. 1970 Lichtfang, 1 ♂.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale gegenüber der nächstverwandten *A. tornella* WALSINGHAM liegen im männlichen Genitalapparat. Die Stachelreihe auf der Valva ist lang, zieht ein Stück der Costa entlang und biegt dann bogenförmig zu ¾ des Caudalrandes ab. Bei *A. tornella* ist die Stachelreihe kürzer und trifft den Caudalrand etwa in der Mitte. Auffallend ist die geringe Größe meiner Falter. Während RAZOWSKI (1970) 16 mm Spannweite angibt, mißt das Männchen 12,5 mm und das Weibchen 10 mm.

Aethes fennicana adelaidae ist sicher schon in Österreich gefunden worden und steckt unerkannt in der einen oder anderen Sammlung. Dieser Beitrag soll dazu anregen, das vorhandene

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Material genitaliter zu überprüfen und durch Neufänge das sicherlich größere Verbreitungsgebiet der Art zu klären. Darüber hinaus sind Untersuchungen über die Biologie, die noch ganz unklar ist, dringend nötig.

Literatur

RAZOWSKI (1970), Microlepidoptera Palaearctica, Band **3**, Cochylidae.
TOLL (1955), Lozopera adelaidae sp. n. aus Polen (Lep., Tortr.). Annls zool., Warsz. **16**: 61—64.

(Ausgegeben am 30. Juni 1971)

Anschrift des Verfassers: Karlstraße 15, D-6352 Ober-Mörlen.

Oberösterreichische Entomologentagungen in Linz.

Es entspricht einer langjährigen Tradition dieser Zeitschrift, über die stets sehr gut, sowohl aus dem Inland wie auch von auswärts, besuchten Linzer Tagungen zu berichten. Durch das leider zeitlich im Rückstand befindliche Erscheinen der Zeitschrift bedingt, soll hier nur die Programmfolge der seit dem letzten Bericht (53. Jg. 1968, S. 60) abgehaltenen Tagungen festgehalten werden, um die Reihe der Berichte nicht zu unterbrechen. Die entomologisch wesentlichen Tatsachen sind bereits anderwärts mitgeteilt worden.

35. Tagung am 9. und 10. November 1968. Vorträge: C. v. DEMELT, Klagenfurt: Sammelexkursion im nordwestlichen Korsika; W. DIERL, München: Nepalreise 1967; H. FOLTIN, Vöcklabruck: Die Schmetterlinge des Ibmer Mooses; K. KUSDAS, Linz: Bemerkenswerte Insektenfunde in Oberösterreich 1968; F. MAINX, Wien: Insekten als Objekte der cytogenetischen Forschung; H. MALICKY, Graz: Die ökologischen Beziehungen der Lycaenidenraupen und -puppen zu Ameisen; H. REISSER, Wien: Eindrücke rund um den XIII. Internationalen Entomologen-Kongreß Moskau 1968; U. ROESLER, Bonn: Notizen über einige Phycitinen (Lep., Pyralidae), die als Schadinsekten auftreten können.

36. Tagung am 8. und 9. November 1969. Vorträge: W. FABER, Wien: Neue Aspekte des Sozialparasitismus bei Ameisen; H. FOLTIN, Vöcklabruck, und W. MITTERNDORFER, Eferding: Interessante Schmetterlinge aus dem Wärmegebiet Kopl-Steinwänd im Aschachtal, Oberösterreich; H. HAMANN, Linz: Biologie einer javanischen Schildlaus (Bekämpfung und Parasiten); F. KASY, Wien: Niederösterreichische Naturschutzgebiete als Refugien bemerkenswerter Lepidopteren (mit Film); E. KREISSL, Graz: Ilgaz-Daglari — Entomologische Untersuchungen im kleinasiatischen Wolkengebirge; K. KUSDAS, Linz: Bemerkenswerte Insektenfunde in Oberösterreich 1969; Z. LORKOVIC, Zagreb: Vergleich der morphologischen und genetisch-reproduktiven Differenzierung südeuropäischer *Pieris napi* L.; E. REICHL, Linz: Probleme bei österreichischen *Procris* F. (Lepidoptera); H. SCHMUTZENHOFER, Wien: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und ihre Auswirkungen auf die Entomo-Fauna bei forstlicher Schädlingsbekämpfung.

37. Tagung am 7. und 8. November 1970. Vorträge: H. ASPÖCK, Wien: Die Erforschung der Neuropteren Europas — Ergebnisse und Probleme; J. GUSENLEITNER, Linz: Insekten und Viren; K. KUSDAS, Linz: Bemerkenswerte Insektenfunde in Oberösterreich 1969—1970; H. MALICKY, Lunz am See: Was wissen wir über die einheimischen Köcherfliegen? G. REISS, Stuttgart: Generationsfolgen bei Zygaenen; U. ROESLER, Bonn: Styropor und andere hochmolekulare Kunststoffe als Fraß-Substanz für *Plodia interpunctella* (HBN.) (Lep., Phycitinae); A. TAUBER, Wien: Die Arten und Rassenkreise der Gattung *Maniola* SCHRK. (Lepid.). Außer Programm fanden noch zwei Filmvorführungen statt: SCHÄFLEIN, Straubing: Über das Leben des Gelbrandkäfers und THEISCHINGER: Entomologisches aus Anatolien.

REISSER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: 54

Autor(en)/Author(s): Thomas Werner

Artikel/Article: Aethes fennicana adelaidae Toll (Lep., Cochylidae). Ein Neufund für Österreich. 145-146