

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1909.

Von **J. Gerhardt.**

- Trechus rubens* Fbr. Auf einer Wiese bei Neisse (Gabr.).
Acupalpus exiguus a. *dubius* Schilsky. Hat nie vertiefte Nat
an der Basis der Decken, gehört also nicht zu *A. luteatus*,
wie früher angenommen wurde.
Micropeplus tesserula. Isergeb. 8 (v. Varendorff).
Bryoporus cernuus Grav. Ellguth 5. (Gb.).
Bryocharis inclinans Grav. An der Wölfel (Gb.).
Tachyporus hypnorum a. *armeniacus* Kol. Bei Neisse in einem
verpilzten Baumstumpf (Gb.).
Atheta luridipennis Mannh. Neisse und *A. arcana* Er. Glatzer
Geb. (Gb.).
Bythinus macropalpus Aubé. Ellguth (Gb.).
Liodes silesiaca Kr. Isergeb. (v. Varend.).
Meligethes ovatus Sturm. Neisse (Gb.).
Cryptophagus quercinus Kr. Neisse (Gb.).
Cis alni Gyll. dto.
Anthrenus verbasi L. Liegnitzer Promenade auf blühenden
Sträuchern n. s., namentlich auf Tamarinde und Jasmin.
6. (G.). Bisher übersehen.
Adrastus limbatus Fbr. Lambsdorfer Schießplatz an Getreide-
ähren hfg. (Gb.).

- Athous mutilatus* Rosenh. Schweinsdorf (Gb.), Altvater (Dr. Marx).
Gastrallus immarginatus Müll. Neisse (Gb.).
Caenocara subglobosa Muls. Neisse (Gb.).
Mantura rustica. Ellguth 5. (Gb.).
-

Nachtrag.

Die hierunter aufgeführten Neuheiten sind zumeist dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands von Schilsky entnommen. Angaben über spezielle Fundorte sind späterer Forschung vorbehalten. Durch »Kf. D.« ist auf sie hingewiesen. Ihre Veröffentlichung konnte leider erst nach Drucklegung meiner III. Auflage des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens erfolgen.

- Cicindela hybrida* a. *bipunctata* Letzn. und a. *virescens* Letzn. (Kf. D.)
Calosoma inquisitor v. *cupreum* Motsch. (Kf. D.)
Carabus coriaceus v. *rugifer* Kr. (Kf. D.) *C. convexus* a. *simplicipennis* Dej. (Kf. D.) *C. Linnei* a. *bescidensis* Rtrr. (Kf. D.)
Badister sodalis v. *dorsiger* Dft. (Kf. D.)
Amara tricuspidata a. *lepidula* Letzn. (Kf. D.)
Stenus Erichsoni v. *Ludyi* Fauv. (Kf. D.)
Quedius maurus v. *pyropterus* Epp. (Kf. D.)
Tachyporus obtusus v. *nitidicollis* Steph. (Kf. D.)
Atemeles paradoxus a. *acuticollis* Wassm. (Kf. D.)
Hygropora cunctans v. *nigripes* Thoms. (Kf. D.)
Liodes dubia v. *subglobosa* Rtrr. (Kf. D.)
Hydraena gracilis v. *obscuripes* Gerh. Schenkel, zuweilen auch die Schienen schwarz.
Dasytes plumbeus v. *nigrofemoratus* Schilsky. (Kf. D.) Besonders unter ♀ n. s. (Gerh.).
Dolichosoma lineare a. *coerulescens* Schilsky (Kf. D.). Auch diese Aberr. ist überall n. s. (Gerh.).
1. *Cis reflexicollis* Abeille. Beskiden (Kf. D.).

- Lycoperdina succincta* a. *fasciata* Fbr. (Kf. D.)
Cynegetis impunctata a. *8-punctata* Schneid. (Kf. D.)
Coccinella 10-punctata a. *thoracica* Schneid. (Kf. D.)
Anthrenus scrophulariae v. *gravidus* Küst. (Kf. D.)
2. *Hypnoidus flavipes* Aubé. Von Reitter an der Ostrawitz gesammelt.
3. *Hapalus analis* Schaum. (Kf. D.)
4. *Abdera 4-fasciata* Curt. Seit 1829 schlesisch.
Evodinus clathratus a. *signatus* Pz. (Kf. D.)
Leptura 6-guttata a. *exclamationis* Fbr. (Kf. D.)
Leptura dubia a. *chamomillae* Fbr. (Kf. D.)
Leptura revestita a. *rubra* Geoffr. (Kf. D.)
5. *Clytanthus ruficornis* Oliv. (Kf. D.)
Clytus tropicus m. *Kelchi* Bach. (Kf. D.)
Cryptocephalus sericeus a. *purpurascens* Weise und a. *violaceus* Weise. (Kf. D.)
Melasoma aenea a. *bicolor* Schilsky. (Kf. D.)
Chalcoides lamina a. *cuprea* Weise. (Kf. D.)
Chrysomela geminata a. *nigra* Weise. (Kf. D.)
Psylliodes picina a. *bicolor* Gerh. Halsschild rot.
Cassida vibex a. *pannonica* Sffr. (Kf. D.)
Polydrosus impar a. *vranicensis* Rtrr. (Kf. D.)
Phyllobius oblongus a. *mandibularis* Gerh. Mandibeln sehr stark vorragend, in der Mitte stark gezähnt, der Zahn grade nach innen gerichtet. Mandibelspitze stark nach innen gekrümmt und scharf zugespitzt.
Alophus triguttatus a. *uniformis* Rtrr. Beskiden. (Kf. D.)
Dorytomus taeniatus v. *rectirostris* Faust. Meist ♀. (Gerh.)
Dorytomus dorsalis a. *Linnei* Faust und a. *nigifrons* Faust. (Kf. D.)
6. *Sibinia fugax* Germ. (Kf. D.)
Nanophyes marmoratus a. *angustiformis* Bach. (Kf. D.)
7. *Apion elongatum* Desbr. Altheide n. s. auf *Genista pilosa*. (Kf. D.)
Apion dispar a. *viridescens* Gerh. Decken grünlich. Liegnitz.
Apion ervi a. ♂ *Schilskyi* Gerh. Fühlerglied 1 oder 1 und 2 gelb, die übrigen schwarz. — Und ♂ a. *nigroclavatum* Gerh. Nur die Keule dunkel. Beide ss. Liegnitz.

8. *Apion intermedium* Epp. Beskiden. (Kf. D.)
Apoderus coryli a. *nigricollis* Esch. (Kf. D.)
Aphodius fimetarius a. *bicolor* Geoffr. (Kf. D.)
Aphodius merdarius a. *icterus* Laich. (Kf. D.)
Geotrupes vernalis a. *obscurus* Muls. (Kf. D.)
9. *Trichius zonatus* Germ. Beskiden s. (Rttr.). Dafür ist
T. *abdominalis* als schlesisch zu kassieren.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [JH_3](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1909 5-8](#)