

## Zu *Anthonomus varians* Payk.

Von J. Gerhardt.

---

In der Knieholzregion der Hochsudeten herrscht die Stammform vor: schwarz, Fühler incl. Keule, Beine, Halsschild und Decken rot, letztere an den Seiten und meist auch an der Nat schwarz. Dagegen waltet in der Ebene die Form mit einfarbig roten Decken — ich nenne sie *rufipennis* — vor. Ihr schließen sich die sehr seltenen Stücke an, die ein ganz schwarzes Halsschild haben, sonst aber der Stammform gleichen; Herr Rektor Kolbe führte sie als *Aberr. suturalis* ein. Ein Uralstück dieser *Aberr.* in meiner Sammlung hat fast einfarbig rote Decken, seine Seiten sowie die Nat sind kaum dunkler und die Beine mit Ausschluß der Hinterschienen gelb. Am meisten weicht die bekannte *Aberr. perforator* Hbst. von der Stammform ab, da sie ganz schwarz ist.

Das Pygidium tritt beim ♂ immer vor und hat eine tiefe, breite Mittelfurche. Beim ♀ ist das Pygidium verdeckt, seine Mittelfurche ist viel dürftiger, seichter und kleiner.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [JH\\_5](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Zu Anthonomus varians Payk. 4](#)