

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1906.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Abkürzungen: Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D.—Neisse. G. = Gerhardt, Oberlehrer a. D.—Liegnitz. R. = Reitter, Paskau. S. = Sokolowsky, Rentner—Liegnitz. Sch. = Schubert, Dr. med.—Hirschberg. Schr. = Schreiber, Lehrer—Neusalz. Sz. = Richard Scholz, Lehrer—Liegnitz. T. = Tischler, Lehrer—Rodeland, Kr. Ohlau. V. = v. Varendorff, Amtsrichter—Guhrau.

- Tachypus pallipes* Dft. Neisse (Gb.).
Trechus micros Hbst. Kottwitz (Gb.).
Amara nitida St. Neisse (Gb.).
Agonum livens Gyll. *ibid.*
Masoreus Wetterhali Gyll. Rodeland unter Stöcken von
Sarothamnus n. s. (T.).
Cymindis cingulata Dej. Ullersdorf im Rabengeb. (G.).
C. macularis Dej. Rodeland n. s. in Eanggräben (T.).
Dromius longiceps Dej. Oderwald b. Neusalz und *D. nigri-*
ventris Thoms. Neusalz unter Nadelstreu (Schr.).
Haliplus fulvicollis Er. Neisse (Gb.).
Deronectes latus Steph. Rodeland (T.). *D. elegans* St. *ibid.*
Hydroporus pubescens Gyll. Quanzendorf mehrfach (Gb.).
H. elongatulus St. Hochwald b. Brieg (Gb.). *H. dor-*
salis F. Neisse, Quanzendorf, Hochwald b. Br. (Gb.).

- Agabus didymus* Ol. Rodeland, in klaren Gräben (T).
A. nebulosus Forster. Neisse und melanarius Aub.
 Riesengeb. (Gb.).
Rhantus notaticollis Aub. Rodeland, im Winter unter
 Moos (T.). *R. consputus* St. Neusalz (Schr.).
Dyticus circumflexus F. Riesengeb. (Klette).
Gyrinus marinus Var. *opacus* Sahlb. Riesengeb. 2 Stck.
 (Klette).
Orectochilus villosus Müll. Neisse z. hfg. (Gb.).
Limnichus sericeus Dft. Neisse (Gb.).
Latelmis opaca Müll. Paskau a. d. Ostrawitza (Reitter).
Heterocerus fossor Ksw. Am Neisseufer hfg. (Gb.).
Autalia rivularis Gr. Beskiden (Gb.).
Bolitochara obliqua Er. Altvater und Beskiden (Gb.).
B. brevicollis Kr. Beskiden (Gb.).
Leptusa puellaris Hamp. Altvatergipfel hfg., Gl. Schnee-
 berg seltener, Wiesenberg i. Rsg. 1 Stck. (Gb.). *L. haemorrhoidalis* Heer. Zuckmantel (Gb.). *L. ruficollis* Er.
 Altvater unter Ahornrinde hfg. (Gb.).
Ischnoglossa prolixa Var. *rufopicea* Kr. Hochwald Kr.
 Brieg (Gb.).
Thamiaraea hospita Märk. Zwischen Erdmannsdorf und
 Hirschberg an Pappelsaft, mit *T. cinnamomea* (G.).
Microglossa pulla Gyll. Neisse und Kottwitz (Gb.).
Aleochara brevipennis Gr. Neisse (Gb.). *A. morion* Gr.
 Neisse und Schweinsdorf (Gb.). *A. lygaea* Kr. Wölfels-
 grund (Gb.). *A. sanguinea* L. Wölfelsgrund und Schweins-
 dorf (Gb.). *A. moerens* Gyll. Riesengeb. (Klette). *A. bi-*
lineata Gyll. und *verna* Say. Wölfelsgrund (Gb.).
Dinarda dentata Gr. Quanzendorf (Gb.).
Lomechusa strumosa Gr. Quanzendorf (Gb.).
Atemeles emarginatus Var. *nigricollis* Kr. Quanzen-
 dorf (Gb.).
Myrmedonia Haworthi Steph. Quanzendorf (Gb.). *M. simi-*
lis Märk. Rodeland (T.).
Ocalea badia Er. Ellguth b. Steinau i. O/S. und *O. rivu-*
laris Mill. Schweinsdorf (Gb.).

- Calodera umbrosa* Er. Jannowitz (Sch.). *C. uliginosa* Er. Kottwitz, *C. riparia* Er. *ibid.* (Gb.). *C. aethiops* Gr. Neisse und Kottwitz (Gb.).
- Falagria nigra* Gr. Neisse (Gb.), Riesengeb. (Klette).
- Tachyusa scitula* Er. Neisse (Gb.). *T. umbratica* Er. Wildgrund am Fuße der Bischofskoppe (Gb.). *T. atra* Gr. Ostrawitz, Altvatergeb., Neisse (Gb.).
- Gnypeta carbonaria* Aub. Wölfelsgrund, Neisse, und *G. ripicola* Ksw. Kottwitz und Neisse (Gb.).
- Atheta languida* Er. Altvatergeb. (Gb.). *A. insecta* Th. und *A. complana* Mnnh. Neisse (Gb.). *A. hygropora* Kr. Kottwitz und Wölfelsgrund aus Wassermoos an Steinen (Gb.). *A. luridipennis* Mannh. (Gb.). *A. alpestris* Heer. Altvatergeb. (Gb.). *A. oblonga* Er. Neisse und Schweinsdorf (Gb.). *A. pagana* Er. Glatzer Geb. (Gb.). *A. microptera* Th. Altvater, Zuckmantel, Quanzendorf (Gb.). *A. hypnorum* Ks. Quanzendorf (Gb.). *A. melanocephala* Heer. Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. incognita* Sharp. Ellguth b. Steinau O/S. (Gb.). *A. Pertyi* Heer. Glatzer Geb. (Gb.). *A. pilicornis* Th. Altvatergeb. (Gb.). *A. nitidicollis* Fairm. Neisse und Quanzendorf (Gb.). *A. pallidicornis* Th. Neisse, Schweinsdorf und Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. coriaria* Kr. *ibid.* (Gb.). *A. cinnamoptera* Th. Glatzer Geb. (Gb.). *A. picipennis* Mnnh. und *atramentaria* Gyll. Neisse (Gb.). *A. cada-verina* Bris. Beskiden und Ziegenhals (Gb.). *A. macrocera* Th. und *nigricornis* Th. Altvatergeb. (Gb.). *A. picipes* Th. Ziegenhals (Gb.). *A. indubia* Sharp. Neisse, Schweinsdorf (Gb.). *A. hodierna* Sharp. Kottwitz und Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. subtilis* Scriba. Neisse, Schweinsdorf, Beskiden (Gb.). *A. liliputana* Bris. Ellguth (Gb.). *A. mortuorum* Th. Weißenrode b. Liegnitz unter Jäte von *Cirsium arvense* mehrfach (G.). *A. palleola* Er. Neisse, Ziegenhals, Quanzendorf (Gb.). *A. indocilis* Heer. Neisse (Gb.). *A. orphana* Er. Quanzendorf, Kottwitz, Neisse, Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. subsinuata* Er. Wölfelsgrund 1 Ex. (Gb.).

- Placusa atrata* Sahlb. Beskiden (Gb.).
Thectura cuspidata Er. Altvatergeb., Neisse (Gb.).
Phloeopora corticalis Gr. Hochwald Kr. Brieg (Gb.).
Oxypoda vittata Märk. Plümkenau O/S. in morscher Eiche (Schr.).
O. rugulosa Kr. Hochwald b. Brieg (Gb.).
O. testacea Er. Beskiden unter Ahornlaub (Gb.).
O. rufescens Kr. Hochwald b. Brieg (Gb.).
Ocyusa incrassata Rey. Beskiden (R.).
O. maura Er. Neisse, Reisigbündel (Gb.).
Gyrophana fasciata Marsh. Neisse und Hochwald b. Brieg (Gb.).
Myllaena infuscata Kr. Neisse (Gb.).
Tachinus bipustulatus T. Rodeland an Pappelsaft (T.).
T. pallipes Gr. Quanzendorf (Gb.).
T. rufipennis Gyll. Paskau (R.).
Conurus immaculatus Steph. Quanzendorf (Gb.).
C. pedicularius v. *lividus* Er. Neisse (Gb.).
C. bipunctatus Grav. Rodeland, in Fichtenmulm (T.).
Bolitobius trimaculatus v. *discophorus* Rey Wölfelsgrund, unter faulem Heu (Gb.).
Megacronus analis E. Ohlau, im Oderwalde unter Laub (T.), Quanzendorf (Gb.).
Mycetoporus punctus Gyll. Beskiden.
M. corpulentus Luze *ibid.* (Gb.).
M. clavicornis Steph. Riesengeb., Schweinsdorf (Gb.).
Velleius dilatatus F. Riesengeb., Nimptsch (Gb.).
Quedius ochropterus Er. Quanzendorf (Gb.).
Q. cintillans Grav. Glatzer Geb. (Gb.).
Staphylinus stercorarius Oliv. Neisse (Gb.).
Philonthus nitidus F. Aupagrund (Sch.).
P. coruscus Grav. Glatzer Geb., Quanzendorf (Gb.).
P. quisquiliarius v. *inquinatus* Steph. Riesengeb. (Gb.).
P. rubripennis Ksw. Glatzer Geb. (Gb.).
P. agilis Gr. Unter Jäte von *Cirsium arvense* b. Liegnitz (G.).
P. fumarius Grav. Kottwitz (Gb.).
P. nigrita Grav. Neisse und Kottwitz (Gb.).
Othius laeviusculus Steph. Neisse (Gb.).
Baptolinus pilicornis Payk. Beskiden (Gb.).

- Xantholinus distans* Rey: Altvater- und Glatzer Geb. (Gb.).
Achenium depressum Grav. Jeltsch bei Hochwasser (T.).
Lathrobium castaneipenne Kol. Beskiden (Gb.). *L. pallidum* Nordm. Kottwitz (Gb.). *L. multipunctatum* Gr. Kottwitz, Quanzendorf (Gb.). *L. picipes* Er. Paskau (R.).
Medon obscurellus Er. Glatzer Geb. (Gb.). *M. ripicola* Kr. Neisse (Gb.).
Sunius immaculatus Steph. Hochwald b. Brieg (Gb.).
Paederus limnophilus Er. Neisse (Dr. Marx).
Stenus fossulatus Er. Glatzer Geb. (Gb.). *S. pusillus* Steph. Neisse (Gb.). *S. bimaculatus* Gyll. Kottwitz, Hochwald b. Brieg (Gb.). *S. silvester* Er. Kottwitz (Gb.). *S. melanarius* Steph. Hirschberg (Schn.). *S. cautus* Er. Kottwitz (Gb.). *S. brunnipes* Steph. Altvatergeb. (Gb.). *S. geniculatus* Grav. Glatzer Geb., Neisse (Gb.).
Euaesthetus laeviusculus Mannh. Kottwitz (Gb.).
Platystetus nitens Sahlb. Kottwitz (Gb.).
Oxytelus rugifrons Hochh. Neisse u. O. *fulvipes* Er. *ibid.* in Mistbeetverpackung (Gb.).
Lesteva longelytrata v. *maura* Er. Quanzendorf (Gb.).
Olophrum piceum Gyll. Rodeland, unter *Calluna* im Winter n. s. (T.).
Acidota crenata F. Rodeland unter *Calluna* (T.).
Arpedium quadrum Grav. Riesengeb. (Klette).
Homalium oxyacanthae Grav. Unter Jäte von *Cirsium arvense* b. Liegnitz auf einem Fahrwege s. hfg. (G. 6).
H. elegans Kr. Beskiden (Gb.). *H. nigrum* Grav. Hochwald b. Brieg, Altvater- und Glatzer Geb. (Gb.).
H. striatum Gr. Neisse (Gb.).
Acrulia inflata Gyll. Beskiden (Gb.).
Megarthus nitidulus Kr. Quanzendorf (Gb.).
Batrisus Delaportei Aub. und *venustus* Rchb. Hochwald b. Brieg (Gb.).
Bryaxis juncorum Leach. Quanzendorf und Hochwald Kr. Brieg (Gb.).
Bythynus clavicornis Pz. Hochwald Kr. Brieg. *B. distinctus* Chaud. Quanzendorf. *B. securiger* Rchb.

- Kottwitz, Quanzendorf. *B. puncticollis* Denny Beskiden (Gb.).
- Euplectus signatus* Rchb. Patschkau, Neisse, Quanzendorf (Gb.).
- Euthia scydmaenoides* Steph. Patschkau, in Mistbeetverpackung (Gb.).
- Scydmaenus denticornis* Müll. Quanzendorf (Gb.).
- Ptomaphagus picipes* F. Beskiden (Gb.). *P. fuscus* Pz. Riesengeb. (Klette). *P. neglectus* Kr. Beskiden. *P. anisotomoides* Spence. Ellguth, Kl.-Schnellendorf (Gb.).
- Colon clavigerum* Hbst. Quanzendorf. *C. affine* St. *ibid.* (Gb.). *C. latum* Kr. Beskiden.
- Parasilpha tristis* Illig. Zuckmantel (Marx).
- Liodes obesa* Schm. Altvatergeb. *L. dubia* Kug. Patschkau (Gb.). *L. pallens* St. Beskiden (Rtt.). *L. hybrida* Er. Riesengeb. (Klette).
- Agathidium varians* Beck. Ellguth. *A. discoideum* Er. Beskiden. *A. marginatum* St. Quanzendorf (Gb.).
- Millidium minutissimum* Web. Kl.-Schnellendorf (Gb.).
- Oligella foveolatum* Allib. Grafsch. Glatz. *P. Spencei* Allib. *ibid.* (Gb.).
- Micrus filicornis* Fairm. Neisser und Glatzer Geb. (Gb.).
- Orthoperus coriaceus* Muls. Kottwitz, Hochwald b. Brieg, Quanzendorf (Gb.).
- Mycetina cruciata* Schall. Sprottauer Forst (Schr.).
- Cryptophagus Schmidtii* Strm. Neisse (Gb.).
- Coenoscelis ferruginea* Sahlb. Waldenburg a. Altv. (Gb.).
- Atomaria alpina* Heer. Grafsch. Glatz (Gb.).
- Carpophilus sexpustulatus* F. Rodeland, unter Eichenrinde (T. 5).
- Nitidula bipunctata* L. Riesengeb. (Klette).
- Meligethes corvinus* Er. Schweinsdorf und Quanzendorf (Gb.). *M. obscurus* Er. Oberf. Panten und Pantener Höhen je 1 Stck. (G.). Erste Fundorte für prß. Schlesien. *M. Kunzei* Er. 3 Stck. im Glatzer Geb. (Gb.).
- Cryptarcha imperialis* F. Neisse (Gb.).
- Rhizoglyphus perforatus* Er. Neisse, Glatzer Geb. (Gb.).

- Nemosoma elongatum* L. Rodeland, zuweilen hfg. (T.).
Monotoma spinicollis Aub. Glatzer Geb. (Gb.).
Dermestes vulpinus F. Neusalz, in einem aus S.-W.-Afrika stammenden Büffelschädel 2 Stck. (Schr.). *D. bicolor* F. Neisse (Gb.).
Platysoma oblongum F. und *lineare* Er. Rodeland (T.).
Gnathoneus rotundatus Kug. Ellguth, Kottwitz (Gb.).
Aphodius plagiatus L. Rodeland (T.). *A. testudinarius* F. Liegnitz, vor Weißenrode (G.).
Hoplia graminicola F. Rodeland (T.).
Gnorimus variabilis L. Sprottauer Forst (Schr.).
Buprestis haemorrhoidalis Hbst. Petersdorf bei Primkenau (Schr.).
Chrysobotrys affinis F. Sprottauer Forst (Schr.).
Agrilus betuleti Ratzb. Neusalz (Schr.). *A. pratensis* Ratzb. *ibid.* *A. graminis* Lap. *ibid.*
Elater Megerlei Lac. Neusalz (Schr.).
Melanotus punctolineatus Pel. Neusalz, von Birkenholz (Schr.).
Athous rufus Deg. Rodeland, n. s. (T.).
Eucinetus haemorrhoidalis Germ. Rodeland, unter Besenginster n. s. (T.).
Anthonomus sanguinolentus F. Rodeland (T. 9).
Necrobia rufipes Deg. An einem afrikanischen Büffelschädel. Neusalz (Schr.).
Hylecoetus dermestoides L. Rodeland (T.).
Gastrallus immarginatus Müll. Rodeland (T.).
Xyletinus ater Pz. Rodeland (T.).
Pseudocistela ceramboides L. und *v. serrata* Chev. an einem Eichenstumpf. Neusalz (Schr.).
Orchesia minor Walk. Sattler b. Hirschberg (Sch.), Primkenau, an einer Eiche (Schr.). *O. fasciata* Payk. *ibid.*
Abdera flexuosa Payk. Im Oderwalde bei Neusalz an einem Weißbuchenschwamme (Schr.).
Xylita laevigata Hellen. Smortave b. Brieg (T.), Beskiden (Pietsch).
Euglenes pygmaeus Deg. Hirschberger Tal (Sch.).

- Pyrochroa pectinicornis* L. Peisterwitz b. Ohlau auf jungen Birken n. s. (T.), Stonsdorf (Sch.).
- Pelecotoma fennica* Payk. Kraika, an Ritzen von Scheunentbalken und -Türen, an alten Bienenstöcken n. s. (T.).
- Meloe coriarius* Br. Rodeland (T.). Var. *rufiventris* Germ. Quanzendorf (Gb.).
- Cleonus segnis* Germ. Guhrau, in einer Sandgrube (Varend.).
- Orthochaetes setiger* Beck. Beskiden (Gb.).
- Trachodes hispidus* L. Sprottauer Forst (Schr.).
- Phytobius granatus* Gyll. Paskau (R.).
- Phloeosinus thujae* Perris. Freistadt (Schr.).
- Pityophthorus Lichtensteini* Ratzb. Beskiden, von trockenen Ästen geklopft (Gb.).
- Xyleborus cryptophagus* Ratzb. Peisterwitz b. Ohlau im Oderwalde unter Lindenrinde zahlreich (T. 8).
- Callidium angustum* Kriechb. Petersdorf bei Primkenau an einem dünnen Fichtenaste (Schr.).
- Clytus arvicola* Oliv. Neusalz, mehrere Stck. an einer Weißbuche (Schr.).
- Donacia fennica* Payk. Kraika (T. 6).
- Cryptocephalus distinguendus* Schneid. Rodeland auf Birken (T.). *C. janthinus* Germ. Zinnoberteich bei Garsuche (T.).
- Chrysomela analis* L. Rodeland n. s. auf Brachen (T.).
- Melosoma collaris* L. Rodeland, auf Pappeln und Weiden n. s. (T.).
- Sermyla halensis* L. Guhrau (V.).
- Aphthona ovata* Foudr. Beskiden (R.).
- Semiadalia 11-notata* Schnd. Quanzendorf und Neisse auf Dolden (Gb.).
- Hyperaspis campestris* Hbst. Riesengeb., Neisse, Schweinsdorf, Quanzendorf, Hochwald Kr. Brieg, Kottwitz (Gb.).
- H. reppensis* Hbst. Neisse (Gb.).
- Scymnus suturalis* var. *limbatus* Steph. Kottwitz (Gb.).
- S. frontalis* var. *4-pustulatus* Hbst. Neisse, Quanzendorf, Riesengeb. (Gb.). *S. Redtenbacheri* Muls. Kottwitz (Gb.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [NF_32](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1906 1-8](#)