

Schalen unserer Muschel sind dünner und leichter; nach hinten verlängert und weniger stumpf abgerundet; es fehlen ihr die bei Cyth. Chione am Vorder- und ganzen Bauchrande bemerklichen Furchen; ihr Hinterfeld ist weniger scharf begränzt, als in der eben genannten Art. Ihre äussersten Baeken sind durch einen perlweissen lappigen Fleck gezeichnet, was jedoch individuell sein mag. In ihrer Zeichnung bietet sie sonst nur die oben bezeichneten Gürtel, aber weder Strahlen, noch Flecken dar.

58. *Venus cancellata* L., Lam.

Var. *testa minore, flava, cingulis remotis, vulva anoque spadiceis, intus alba.*

59. *Corbula an ustulata* Reeve.

Davon nur eine, die rechte Schale und, leider abgerieben.

Diagnosen neuer von Frivaldszky gesammelter Landschnecken.

Von L. Pfeiffer.

1. *Bulimus athensis* Friv.

T. rimato-perforata, oblonga, sursum attenuata, striatula, nitidula, cornea; sutura albo-marginata; anfr. 8—9 plani, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis subaequans; apertura subrhombico-semiovalis; perist. expansum, albo-labiatum, marginibus callo crassiusculo, juxta insertionem marginis dextri in tuberculum transversum producto, junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 20, diam. $6\frac{1}{2}$ mill. Ap. $6\frac{1}{2}$ mill. longa, e. perist. 5 lata.

Habitat in monte Athos (Friv.)

Affinis B. Rossmässleri et pupae.

2. *Bulimus Frivaldszkyi* Pfr.

T. subimperforata, vix rimatula, subcylindrica, sursum attenuata, obtusa, striatula, nitidula, fusco-cornea; sutura

linearis; anfr. 9 subplani, ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis non aequans; apertura obliqua, subsemiovalis; perist. breviter expansum, intus valide albo-labiatum, marginibus sejunctis, dextro repando, columellari reflexo, appresso, basi antrorsum curvato. — Long. 14, diam. $4\frac{1}{2}$ mill. Ap. $4\frac{1}{3}$ mill. longa, intus medio $2\frac{1}{3}$ lata.

Bulimus fuscescens Friv. in sched. Nec Guild.

Habitat prope Brussa Natoliae. (Frig. N. 70.)

3. *Bulimus varnensis* Friv.

T. profunde rimata, fusiformi-oblonga, solida, irregulariter striata, lactea, nitida, apice attenuato, obtusiusculo coerulescenti-cornea; anfr. 10 convexiusculi, ultimus $\frac{3}{10}$ longitudinis subaequans, juxta rimam subcompressus; apertura parva, oblongo-ovalis, intus fuscula; perist. subrectum, acutum, intus albo-labiatum, marginibus callo junctis, columellari dilatato, patente. — Long. 21, diam. $6\frac{1}{3}$ mill. Ap. $6\frac{1}{3}$ mill. longa, medio 4 lata.

Habitat prope Varna Tureiae. (Frig. N. 67.)

Affinis B. taurico, testa medio ventrosa, apertura parvula etc. distinctus.

4. *Bulimus bicallosus* Friv.

T. subperforata, fusiformi-cylindracea, tenuis, subtilissime striatula, diaphana, nitidula, pallide cornea; spira a medio sensim attenuata, obtusa; sutura submarginata; anfr. 10—11 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis paulo superans; columella plica transversa valida dentiformi munita; apertura coaretata, S-formis; perist. expansum, albo-labiatum, marginibus disjunctis, dextro medio unidentato, extus non serobiculato. — Long. 20—21, diam. 5 mill. Ap. 5 mill. longa, c. perist. 4 lata.

Habitat prope Szlivno.

(Schluss im nächsten Blatte.)

Register und Titel wird einer der ersten Nummern des neuen Jahrgangs beigegeben.

Druck und Verlag von Theodor Fischer in Cassel.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1847

Band/Volume: [4_1847](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Diagnosen neuer von Frivaldszky
gesammelter Landschnecken 191-192](#)